



11.2.128





FREDERICO MAGNO VICTORIA, PAX & ARTES  
C. Basso sculpsit H. Schmitt del.

A  
S A M A J E S T É  
P R U S S I E N N E.

S I R E,

*Mon entrée dans une Académie que  
VOTRE MAJESTE' a rendu florissante,*  
a ij

## E P I T R E.

*& le suffrage public dont un Corps si illustre  
 vient d'honorer cet Ouvrage, sont les titres  
 sur lesquels j'ose m'appuyer pour Vous faire  
 hommage de mon travail : j'ai cru que ces  
 titres me suffiroient auprès d'un Prince, qui  
 favorise les Sciences, & qui se plaît même  
 à les cultiver. La Protection que Vous leur  
 accordez, SIRE, est d'autant plus flatteu-  
 se qu'elle est éclairée. Comme VOTRE  
 MAJESTÉ fait animer les talens par  
 son exemple, Elle fait aussi les discerner  
 par ses propres lumières : le vrai mérite  
 l'intéresse, parce qu'Elle en connoît le prix,  
 & qu'Elle contribue trop à la gloire de l'hu-  
 manité, pour ne pas aimer tout ce qui en fait  
 l'honneur. Elle appelle de toutes parts ceux  
 qui se distinguent dans la noble carrière des  
 Lettres : Elle les rassemble autour de son  
 Trône, & pour mettre le comble aux bien-*

E P I T R E.

*faits qu'Elle répand sur eux , Elle y joint une récompense supérieure à toutes les autres, sa faveur & sa bienveillance. Ainsi ce même FREDERIC, qui dans une seule Campagne remporte trois grandes Victoires, soumet un Royaume, & fait la Paix, augmente encore le petit nombre des Monarques Philosophes, des Princes qui ont connu l'amitié, des Conquérans qui ont éclairé leurs peuples, & les ont rendu heureux. Tant de qualités, SIRE, Vous ont à juste titre mérité le nom de GRAND dès les premières années de Votre Règne; Vous l'avez, en même tems reçu de vos Sujets, des Etrangers, & de vos ennemis; & les siècles futurs, d'accord avec le Vôtre, admireront également en Vous le Souverain, le Sage & le Héros.*

*Puis-je me flatter, SIRE, que parmi les acclamations de toute l'Europe, VOTRE*

## E P I T R E.

MAJESTE' entendra ma foible voix , & qu'au milieu de sa gloire Elle ne dédaignera point l'hommage d'un Philosophe ? Si cet hommage ne répond pas à la grandeur de son objet , il a du moins les principales qualités qui peuvent le rendre digne de Vous , il est juste , il est libre , & je ne pouvois le mieux placer , qu'à la tête d'un Livre dont toutes les pages sont consacrées à la vérité.

*Je suis avec le plus profond respect ,*

SIRE,

DE VOTRE MAJESTE' ,

Le très-humble & très-obéissant  
serviteur, D'ALEMBERT.

.....  
\* \* \* \* \*  
.....

## AVERTISSEMENT.


**L**A Dissertation Latine qu'on trouvera dans ce Volume , est celle que j'ai envoyée à l'Académie Royale des Sciences & des Belles Lettres de Berlin. Je l'ai imprimée telle que cette Académie l'a reçûe , sans y rien ajoûter , & sans en rien retrancher ; mais j'ai crû qu'on me permettroit d'insérer dans la Traduction Française que j'en ai faite , différentes additions plus ou moins considérables , relatives à plusieurs conséquences curieuses qu'on peut tirer de ma Théorie. Ces additions sont distinguées du reste de l'Ouvrage par des crochets qui les renferment. J'ai aussi placé dans la Traduction Française , aux endroits convenables , les différens articles du supplément qui termine la pièce Latine. Enfin , quoique chacune des deux Dissertations soit précédée d'une Analyse abrégée de ce qu'elle renferme , cependant comme ces Analyses ne sont destinées qu'à ceux qui sont en état de lire les

## *AVERTISSEMENT.*

Dissertations même, j'ai jugé à propos d'y suppléer en quelque sorte par l'introduction suivante, qui contient une exposition de mes Principes, beaucoup plus étendue, & mise à la portée du plus grand nombre de Lecteurs qu'il m'a été possible.



*INTRODUCTION.*



## INTRODUCTION.

---

**Q**UELQUE inconstant que paroisse le cours des vents, il est cependant assujetti à certaines loix. Les navigateurs observent depuis longtems, que l'air a un mouvement réglé en pleine mer sous la Zône torride; & s'ils remarquent quelques variations dans ce mouvement, c'est principalement proche des côtes, & vers les endroits où l'Océan est resserré par les Terres. On ne peut donc s'empêcher de reconnoître, que parmi les différentes causes des vents, il y en a au moins une dont l'action suit un ordre uniforme & invariable, & dont les effets, lors-même qu'ils semblent le plus irréguliers, ne sont peut-être que modifiés, & pour ainsi dire, déguifés par des causes accidentelles. Ainsi le premier objet qu'un Philosophe doit avoir en vûe, lorsqu'il se propose d'approfondir la Théorie des vents, c'est

d'examiner quelle peut être cette cause générale, & de déterminer, s'il est possible, par le calcul, la quantité, son action & ses effets.

Tous les Physiciens conviennent aujourd'hui que le Flux & Reflux journalier des eaux de la Mer, ne peut être attribué qu'à l'action du Soleil & de la Lune. Quel que soit le principe de cette action, il est incontestable que pour se transmettre jusqu'à l'Océan, elle doit traverser auparavant la masse d'air dont il est environné, & que par conséquent elle doit mouvoir les parties qui composent cette masse. Nous pouvons donc regarder l'action du Soleil & de la Lune, sinon comme l'unique cause des vents, au moins comme une des causes générales que nous cherchons; & une telle supposition est d'autant plus vraisemblable, que les endroits où l'Océan est libre, sont, comme nous venons de le dire, les plus sujets aux vents réguliers.

Il résulte de cette première réflexion, que la force de la Lune pour agiter l'air que nous respirons, & pour en changer la température, peut être beaucoup plus grande que les Philosophes ne paroissent le croire communément. Je ne prétends point adopter sur ce sujet tous les préjugés vul-

gaires : mais l'action de la Lune sur la Mer étant fort supérieure à celle du Soleil, de l'aveu de tous les Savans, on est forcé, ce me semble, d'avouer aussi, que l'action de cette Planete sur notre Athmosphere est très-considérable, & qu'elle doit être mise au nombre des causes capables de produire dans l'air des changemens & des altérations sensibles.

A l'égard de la nature de la force que le Soleil & la Lune exercent, tant sur la Mer que sur l'Atmosphère, & de la quantité précise de cette force, c'est à M. *Newton* que nous en devons la découverte. Ce grand Philosophe après avoir démontré que toutes les Planetes pèsent vers le Soleil, & que la Lune pèse vers la Terre, a fait voir d'une manière invincible, que la gravitation de ces corps ne pouvoit être attribuée à l'impulsion d'aucun Fluide : d'où il a conclu qu'elle étoit réciproque (\*), c'est-à-dire, que non-seulement le Soleil tendoit vers la Terre, mais encore que la Terre & toutes ses parties tendoient à la fois vers le Soleil & la Lune. Or comme ces deux Astres changent continuellement de situation par rapport aux différens points de la Terre, il n'est

---

(\*) Voyez les *Principes Mathématiques*.

pas difficile de concevoir que l'Air & la Mer dont ils attirent les particules , doivent être dans un mouvement continu.

La plupart des Physiciens n'ayant point pensé à cette cause générale des vents , en ont imaginé d'autres. Les uns ont prétendu que l'air qui se meut avec la Terre d'Occident en Orient , devoit sous l'Equateur tourner moins vite que la Terre ; & c'est par-là qu'ils ont expliqué le vent d'Est continu qui souffle entre les Tropiques. Mais cette hypothese est sans aucun fondement : car si la Terre se mouvoit plus vite que la couche d'air qui lui est contiguë , le frottement continu de cette couche contre la surface du globe , rendroit bien-tôt sa vitesse égale à celle de la Terre : par la même raison , la couche voisine de celle-ci en seroit entraînée , & forcée à achever aussi sa rotation dans le même tems : ainsi l'adhérence & le frottement mutuel de toutes les couches obligeroit fort promptement la Terre & son Atmosphere , à faire leur révolution en tems égal autour du même axe , comme si elles ne composoient qu'un seul corps solide (\*).

---

(\*) Cette proposition est démontrée plus au long dans mon *Traité des Fluides*, art. 376-385.

## INTRODUCTION.

v

D'autres Auteurs ont attribué les vents à la chaleur que le Soleil produit dans l'Athmosphère. Selon ces Auteurs, la masse d'air qui est à l'Orient par rapport au Soleil, & que cet Astre a échauffée en passant par-dessus, doit avoir plus de chaleur que la masse d'air Occidentale sur laquelle le Soleil n'a point encore passé : elle doit donc, en se dilatant, pousser vers l'Occident l'air qui la précède, & produire par ce moyen un vent continuel d'Orient en Occident sous la Zône torride. J'avoue que la différente chaleur que le Soleil répand dans les parties de l'Athmosphère, doit y exciter des mouvemens : je veux bien même accorder qu'il en résulte un vent général qui souffle toujours dans le même sens, quoique la preuve qu'on en donne ne me paroisse pas assez évidente pour porter dans l'esprit une lumière parfaite. Mais si on se propose de déterminer la vitesse de ce vent général, & sa direction dans chaque endroit de la Terre, on verra facilement qu'un pareil Problème ne peut être résolu que par un calcul exact. Or les principes nécessaires pour ce calcul nous manquent entièrement, puisque nous ignorons, & la loi suivant laquelle la chaleur agit, & la dilatation qu'elle produit dans

*b iij*

les parties de l'air. Cette dernière raison est plus que suffisante pour nous déterminer à faire ici abstraction de la chaleur Solaire ; car comme il n'est pas possible de calculer avec quelque exactitude les mouvemens qu'elle peut occasionner dans l'Atmosphère , il faut nécessairement reconnoître que la Théorie des vents n'est presque susceptible d'aucun degré de perfection de ce côté-là.

Si nous ne pouvons soumettre au calcul les vents que la chaleur du Soleil fait naître , quoique réguliers & constans en eux-mêmes ; à plus forte raison ne devons-nous point entreprendre de chercher quels dérangemens peuvent exciter dans l'air les variations accidentelles du chaud & du froid , produites , ou par l'élévation des vapeurs & des nuages , ou par d'autres causes inconnues , qui n'ont aucune loi certaine. A l'égard des irrégularités des vents , occasionnées par les montagnes , & par les autres éminences qui se rencontrent sur la surface de la Terre , on ne sauroit disconvenir que ces irrégularités ne suivissent un ordre constant , si les vents n'étoient d'ailleurs produits que par une cause périodique & uniforme. Mais quand on fera attention , soit aux

calculs impraticables dans lesquels une pareille considération doit jeter, soit au peu que l'on connoît de la surface du globe terrestre, en un mot, comme s'expriment les Geomètres, au peu de *données* que l'on a pour résoudre un tel Problème; on reconnoitra sans peine, que les recherches les plus profondes sur cette matiere, doivent aboutir tout au plus à des résultats fort vagues & fort imparfaits. Par conséquent l'objet le plus étendu, & peut-être le seul qu'on puisse espérer de remplir, c'est de déterminer les mouvemens de l'air, dans l'hypothese que la surface du globe soit entièrement réguliere, & que l'agitation de l'Athmosphere provienne de l'attractoin seule de la Lune & du Soleil.

J'avoue qu'après avoir résolu ce Problème, on sera encore bien éloigné de connoître d'une maniere certaine le cours & les loix des vents. Mais la plûpart des questions Physico-Mathématiques, sont si compliquées, qu'il est nécessaire de les envisager d'abord d'une maniere générale & abstraite, pour s'élever ensuite par degrés des cas simples aux composés. Si on a fait jusqu'ici quelques progrès dans l'étude de la nature, c'est à l'observation constante de cette Méthode qu'on en est

redevable. Une Théorie complete sur la matiere que nous traitons, est peut-être l'ouvrage de plusieurs siècles ; & la question dont il s'agit, est le premier pas que l'on doit faire pour y parvenir. De nouvelles connoissances nous mettront en état d'en faire de nouveaux. Tâchons donc d'ouvrir, autant qu'il sera en nous, l'entrée d'une route peu frayée jusqu'ici, & que nous ne devons pas esperer de voir si-tôt aplaniée entièrement.

Pour embrasser à la fois le moins de difficultés qu'il est possible, imaginons d'abord que le Soleil & la Lune soient l'un & l'autre sans mouvement, & que la Terre soit un globe solide en repos, couvert jusqu'à telle hauteur qu'on voudra d'un Fluide homogène, rare & sans ressort, dont la surface soit sphérique ; supposons, de plus, que les parties de ce Fluide pèsent vers le centre du globe, tandis qu'elles sont attirées par le Soleil & par la Lune ; il est certain, que si toutes les parties du Fluide & du globe qu'il couvre, étoient attirées avec une force égale & suivant des directions parallèles, l'action des deux Astres n'auroit d'autre effet que de mouvoir ou de déplacer toute la masse du globe & du Fluide, sans causer d'ailleurs aucun dérangement dans la  
situation

tuation respective de leurs parties. Mais, suivant les loix de l'attraction, les parties de l'Hémisphère supérieur, c'est-à-dire de celui qui est le plus près de l'Astre, sont attirées avec plus de force que le centre du globe; & au contraire les parties de l'Hémisphère inférieur sont attirées avec moins de force: d'où il s'ensuit, que le centre du globe étant mû par l'action du Soleil ou de la Lune, le Fluide qui couvre l'Hémisphère supérieur, & qui est attiré plus fortement, doit tendre à se mouvoir plus vite que le centre, & par conséquent s'élever, avec une force égale à l'excès de la force qui l'attire sur celle qui attire le centre; au contraire, le Fluide de l'Hémisphère inférieur étant moins attiré que le centre du globe, doit se mouvoir moins vite; il doit donc fuir le centre, pour ainsi dire, & s'en éloigner avec une force à peu près égale à celle de l'Hémisphère supérieur. Ainsi le Fluide s'élèvera aux deux points opposés qui sont dans la ligne par où passe le Soleil ou la Lune; toutes les parties accourront, si on peut s'exprimer ainsi, pour s'approcher de ces points, avec d'autant plus de vitesse qu'elles en seront plus proches. Transformons maintenant le Fluide dont il s'agit en notre Athmos-

phere ; il est évident que ce Flux ou ce transport de ses parties produira ce que nous appellons *du vent*.

On peut expliquer par-là , pour le dire en passant , comment l'élevation & l'abaissement des eaux de la Mer se fait aux mêmes instans dans les points opposés d'un même Méridien. Quoique ce Phenomene soit une conséquence nécessaire du systême de M. *Newton* , & que ce grand Geometre l'ait même expressément remarqué , cependant les Cartésiens soutiennent depuis un demi-siècle , que si l'attraction produisoit le Flux & Reflux , les eaux de l'Océan , lorsqu'elles s'élèvent dans notre Hémisphere , devroient s'abaisser dans l'Hémisphere opposé. La preuve simple & facile que je viens de donner du contraire , sans figure & sans calcul , anéantira peut-être enfin pour toujours une objection aussi frivole , qui est pourtant une des principales de cette Secte contre la Théorie de la gravitation universelle.

Les mouvemens de l'air & de l'Océan , au moins ceux qui nous sont sensibles , ne proviennent donc point de l'action totale du Soleil & de la Lune , mais de la différence qu'il y a entre l'action de ces Astres sur le centre de la Terre , &

leur action sur le Fluide tant supérieur qu'inférieur; c'est cette différence que j'appellerai dans toute la suite de ce discours, action *Solaire* ou *Lunaire*. M. *Newton* nous a appris à calculer chacune de ces deux forces, & à les comparer avec la pesanteur. Il a démontré par la Théorie des forces centrifuges, & par la comparaison entre le mouvement annuel de la Terre & son mouvement diurne, que l'action Solaire étoit à la pesanteur, environ comme 1 à 128682000 : à l'égard de l'action Lunaire, il ne l'a pas aussi exactement déterminée, parce qu'elle dépend de la masse de la Lune, qui n'est pas encore suffisamment connue; cependant, fondé sur quelques observations des marées, il suppose l'action Lunaire environ quadruple de celle du Soleil. Si on peut espérer de la connoître plus parfaitement, c'est sans doute en perfectionnant la Théorie du mouvement de la Lune; & je crois qu'il ne sera pas impossible de parvenir à cette découverte par une méthode fort simple, pourvû que les observations qui serviront d'éléments soient assez exactes. Mais ce n'est pas ici le lieu de m'étendre là-dessus (\*).

---

(\*) Voici en peu de mots l'idée de cette méthode. Pour trouver l'orbite apparente que la Lune décrit autour de la Terre, il

Quoiqu'il en soit, lorsqu'on voudra déterminer l'effet de l'action réunie du Soleil & de la Lune, ou sur l'Athmosphère, ou sur tout autre Fluide, dont on imaginera la Terre couverte, il suffira de trouver l'effet qui résulte de l'action seule du Soleil. Car l'effet qui proviendra de l'action seule de la Lune, sera toujours en rapport à peu près constant avec celui qui proviendra de l'action seule du Soleil, c'est-à-dire dans le rapport de l'action Lunaire à l'action Solaire. D'ail-

faut non-seulement avoir égard à l'action de la Terre & du Soleil sur la Lune, il faut encore faire attention à l'action de la Lune sur la Terre; ou, ce qui revient au même, il faut supposer que la Lune, outre l'action que le Soleil exerce sur elle, soit encore tirée vers le centre de la Terre par une masse égale à celles de la Terre & de la Lune, prises ensemble. Donc connoissant par ex. la distance de la Lune apogée ou perigée, & sa vitesse, on pourra facilement exprimer la révolution périodique de la Lune par une formule analytique, dans laquelle il n'entrera d'inconnue que la masse de cet Astre. On égalera ensuite l'expression tirée de cette formule, à celle de la révolution périodique qu'on aura par observation: par-là on connoitra la masse de la Lune. Toute la difficulté est de savoir, si cette masse est assez considérable pour pouvoir être déterminée par une telle méthode. Or je trouve qu'en supposant l'action Lunaire quadruple de l'action Solaire, & l'Orbite de la Lune très-peu Elliptique, la masse de la Lune seroit à celle de la Terre, à peu près comme 1 à 45, & que l'action de la Lune sur la Terre devoit accélérer la révolution périodique de plus d'un jour.

leurs, l'action Solaire étant très-petite par rapport à la pesanteur, elle ne doit changer que très-peu la figure du Fluide; par conséquent l'action de la Lune, considérée indépendamment de celle du Soleil, doit être à peu près la même, soit quand elle est jointe, soit quand elle n'est pas jointe à celle du Soleil. Donc si on cherche d'abord l'effet seul de l'action Solaire, il sera facile ensuite de connoître l'effet de l'action Lunaire, & de déterminer enfin par les principes connus de la Méchanique, l'effet composé qui résultera de l'une & de l'autre. C'est pour cette raison que l'action Solaire sera la seule dont nous parlerons dans la suite de ce discours.

Si le Fluide, que l'action Solaire tend à élever n'étoit pas supposé d'une figure sphérique, il pourroit se faire que cette action n'y produisît aucun mouvement. En effet, combinant l'action Solaire sur chaque point de la surface, avec la force de la pesanteur qui agit vers le centre du globe, on réduira aisément ces deux forces en une seule, dont on aura la direction; & si la figure du Fluide étoit telle, que cette direction fût par-tout perpendiculaire à la surface, on fait par les principes de l'Hydrostatique, que cette surfa-

ce resteroit alors en équilibre. Or comme les parties du Fluide tendent sans cesse à l'état de repos, la figure dont il s'agit, est celle que sa surface extérieure doit chercher à prendre, & pour ainsi dire, affecter : il faut donc s'appliquer d'abord à déterminer cette figure. On trouve par un calcul fort simple, qu'elle doit être à peu près une Ellipse.

La solution de ce Problème, par laquelle je commence mon Ouvrage, & que j'ai rendue très-générale, est le terme où les Geomètres en sont restés jusqu'ici sur cette matiere. Cependant il ne suffit pas dans la recherche présente, de trouver la courbure que la surface du Fluide doit avoir pour rester en repos : il est encore plus important de déterminer comment elle acquiert cette courbure, & suivant quelle loi doivent se mouvoir les parties du Fluide, lorsque l'action Solaire les agite. C'est une question beaucoup plus difficile que la précédente ; aussi personne n'a-t-il encore tenté de la résoudre ; j'ai été obligé pour y parvenir, d'employer une méthode nouvelle, & de me servir d'un principe général dont j'ai montré ailleurs l'étendue & l'usage dans la Dynamique & l'Hydrodynamique.

Pour donner ici une légère idée de ce Principe, & de la manière dont je l'ai appliqué à mon sujet, je remarque, que si dans quelque situation donnée le Fluide n'est pas en équilibre, c'est que l'action Solaire est nécessairement plus grande ou plus petite qu'il ne faut, pour qu'étant combinée avec la pesanteur, elle retienne les parties dans une direction perpendiculaire à la surface. Je partage donc la force ou l'action Solaire totale en deux autres, dont l'une soit capable de produire cet équilibre, & n'ait par conséquent aucun effet, tandis que l'autre partie est employée toute entière à mouvoir le Fluide; par cette méthode, je démontre que le Fluide doit passer successivement, de la figure sphérique qu'il avoit d'abord, à différentes figures Elliptiques, dont l'un des axes s'allonge de plus en plus, tandis que l'autre diminue, &, ce qui est très-remarquable, je trouve que le mouvement soit horizontal, soit vertical des parties du Fluide, peut être comparé à celui d'un pendule qu'on tireroit de son repos pour lui faire décrire de petits arcs circulaires. Or tout le monde sait qu'un pendule, lorsqu'il est arrivé à son point de repos, passe au-delà en vertu de la vitesse qu'il a acquise, pour retomber

ensuite de nouveau : de même aussi , lorsque la surface du Fluide , qui s'éloigne de plus en plus de la courbure circulaire , a acquis la figure qu'elle auroit dû avoir d'abord pour rester en équilibre , elle doit nécessairement passer au-delà de ce terme , & continuer à s'élever d'une quantité à peu près égale à celle dont elle s'est déjà élevée ; après quoi le Fluide retombera & s'abaissera : & si ce Fluide est de l'air , cette espece de Reflux produira un vent contraire à celui qui souffloit d'abord. Pour donner là-dessus un essai de calcul , je fais voir que dans le cas où l'air seroit homogène , & où le Soleil répondroit toujours au même point de l'Equateur , ceux qui habitent sous ce grand cercle , devroient sentir pendant environ 8 heures un vent d'Est , & ensuite un vent d'Ouest pendant le même tems.

Il faut avouer cependant , que comme les oscillations d'un pendule cessent assez promptement , de même aussi ces oscillations de l'air finiroient en fort peu de tems , si le Soleil répondoit toujours au même endroit de la Terre. Mais puisque cet Astre change continuellement de situation par rapport aux différens points de notre globe , son action sur chaque particule de l'air doit

doit varier sans cesse , & par conséquent elle doit produire sans cesse du mouvement dans l'air , aussi-bien que dans l'Océan. Ainsi pour pouvoir mettre l'action Solaire au nombre des causes des vents , il faut nécessairement y joindre le mouvement de la Terre : mais il faut aussi remarquer , que si le mouvement de la Terre influe sur les vents , c'est seulement en ce qu'il change la situation des parties de la Terre par rapport au Soleil. En effet , ni le mouvement annuel de la Terre , ni son mouvement diurne , ne peuvent produire par eux seuls aucun dérangement dans l'Atmosphère : car le mouvement annuel est exactement le même dans toutes les parties de la Terre , il ne fait que transporter le globe terrestre & l'air qui l'environne , comme si le tout ensemble formoit un seul corps solide ; & à l'égard du mouvement diurne , il y a long-tems que toute la masse de l'air a acquis la figure de Sphéroïde applati qu'elle doit avoir en vertu de ce mouvement , & qu'elle a peut-être eu dès son origine.

Il seroit assez facile de déterminer les vents occasionnés par le mouvement vrai ou apparent du Soleil , si pour y parvenir , il ne s'agissoit que de chercher séparément la vitesse & la direction de

chaque particule de l'air : car il suffiroit alors d'employer les méthodes ordinaires pour trouver le mouvement d'un point qui est animé par une force accélératrice donnée. Mais la force accélératrice qui meut chaque particule de l'air n'est pas la même, que si cette particule étoit un point libre & unique. En effet, toutes les particules du Fluide, considérées comme des points isolés & animés par la seule force attractive du Soleil, doivent avoir différentes vitesses suivant la position où elles sont par rapport à cet Astre : il faudroit donc, pour que ces parties pussent former une masse continue, que le Fluide s'élevât en certains endroits & s'abaisât en d'autres. Mais alors les colonnes les plus pesantes venant à agir sur celles qui le seroient moins, produiroient dans le Fluide un nouveau mouvement qui altéreroit son mouvement primitif.

Cependant, la densité de l'air étant fort petite, on peut aisément s'assurer que dans le cas présent, la différence de pesanteur des colonnes seroit presque nulle ; & comme l'effet qui devoit en résulter, pourroit être anéanti par l'adhérence mutuelle des parties de l'air ; j'ai cru qu'il ne seroit pas inutile de résoudre d'abord le Problème

sous ce point de vûe , c'est-à-dire de regarder chaque particule de l'Athmosphere comme un point unique & isolé , en négligeant la différente pesanteur des colonnes. On trouve fort aisément , que dans cette supposition il peut y avoir sous l'Equateur un vent d'Est continuél. Mais ce Phenomene si singulier , devient une conséquence encore plus immédiate des calculs , lorsqu'on envisage la question avec toutes ses circonstances , & qu'on a égard à l'action mutuelle des particules de l'air. On explique alors avec facilité par le secours d'une simple formule Geométrique , non-seulement le vent d'Est de la Zône torride , mais encore les vents d'Ouest des Zônes tempérés , & les violents ouragans , qui selon l'observation des Navigateurs , sont fort fréquents entre les Tropiques à certaines latitudes.

Au reste , quoique dans cette recherche j'aie supposé l'air homogene , ce qui est le cas le plus simple de la question proposée , cependant le Problème est si compliqué même dans ce cas , qu'il m'a paru difficile de le résoudre sans le secours du principe général , dont j'ai parlé plus haut : de plus , les équations analytiques auxquelles je suis arrivé , paroissent de nature à ne pou-

voir être résolues que par des approximations ; mais ces approximations donnent des résultats assez exacts, principalement pour les endroits qui sont, ou proches des Pôles, ou peu éloignés de l'Equateur.

La détermination de la vitesse du vent devient encore plus embarrassante, lorsqu'on suppose l'Athmosphère telle qu'elle est en effet, c'est-à-dire composée de couches qui se compriment les unes les autres par leurs poids, & dont la densité diminue à mesure qu'elles s'éloignent de la Terre. Comme la loi suivant laquelle se fait leur compression, est encore inconnue, j'ai cru devoir déterminer les vents dans le cas général où les densités suivroient une loi quelconque, & j'ai joint à ma solution différentes remarques sur la loi des densités, qui est aujourd'hui le plus généralement admise.

Jusqu'ici j'ai regardé la Terre comme un globe entièrement solide, dont la surface seroit unie, & immédiatement contiguë à l'Athmosphère. Mais l'Académie de Berlin demande expressément par son Programme, l'ordre & le cours des vents, dans le cas où la Terre seroit couverte d'un profond Ocean ; & cette nouvelle condition ajoute

au Problême une difficulté très-considérable : car s'il est permis de négliger l'attraction mutuelle des parties de l'Athmosphère , à cause de leur peu de densité , il faut nécessairement avoir égard à celle que les particules Fluides de l'Océan exercent les unes sur les autres , & sur la masse d'air qui les couvre. D'ailleurs , les eaux de la Mer sont agitées par le Soleil en même-tems que les parties de l'air ; & cette circonstance doit rendre les vents autres qu'ils ne seroient sur une surface solide & inébranlable. Car il est facile de concevoir , que la vitesse d'un Fluide dont le lit change continuellement de pente , doit être fort différente de celle que ce même Fluide auroit , s'il couloit sur un fond stable & immobile. Aussi la seule profondeur des eaux peut-elle changer dans certains cas la direction naturelle du vent , & transformer par ex. le vent général d'Est en un vent d'Ouest , comme il arrive en quelques parages sous la Zône torride même.

Néanmoins , en imaginant que le globe terrestre fût entièrement inondé par l'Océan , j'ai cru devoir donner aux eaux une hauteur assez peu considérable par rapport au rayon de la Terre. Car la masse du globe terrestre , dans l'état où il

est maintenant , est principalement composée de parties solides : or ces parties résistent à l'action du Soleil par leur solidité même qui les empêche de changer de place les unes par rapport aux autres ; & il est évident que dans le cas où la Terre deviendrait entièrement Fluide , le mouvement des eaux & de l'Athmosphère , seroit bien différent de ce qu'il est en effet. C'est pourquoi , si on imagine le globe terrestre entièrement couvert d'eau , il faut au moins le rapprocher le plus qu'il est possible de son état actuel , & supposer par conséquent la profondeur de la Mer assez petite par rapport au rayon de la Terre , quoique toujours très-considérable par rapport à celle des plus grands Fleuves.

Je ne dois pas omettre ici une observation essentielle. Il peut y avoir des cas où le Fluide s'abaisse sous l'Astre qui l'attire , au lieu de s'élever ; on rendra aisément raison de ce paradoxe , si on considère , que le Fluide , étant une fois mis en mouvement , s'élève , non-seulement par l'action de l'Astre , mais encore par la force d'inertie & par l'action mutuelle de ses parties. Or la combinaison de ces forces peut être telle , que le Fluide au lieu de s'élever sous l'Astre même , s'élève

INTRODUCTION. xxiii

à 90 degrés delà , & par conséquent s'abaisse au-dessous de l'Astre.

A cette observation , j'en joindrai une seconde qui n'est pas moins importante. Si la Terre étoit entièrement inondée par les eaux de l'Océan , ces eaux pourroient aussi-bien que l'air , former sous l'Equateur un courant perpétuel , & ce courant seroit vers l'Est ou vers l'Ouest , selon que la profondeur de la Mer seroit plus ou moins grande. Je sai que proche des côtes un tel mouvement doit nécessairement être détruit , & se changer en un mouvement d'oscillation : mais je laisse au Lecteur à juger , si les courans les plus remarquables , sur-tout ceux qu'on observe en pleine Mer , ne pourroient pas être attribués , au moins en partie , à l'action du Soleil & de la Lune , & à la différente hauteur des eaux ; & si les oscillations de la pleine Mer dans le sens horizontal ne seroient pas l'effet de plusieurs courans contraires.

Il me reste à dire un mot de l'influence que le ressort de l'air peut avoir sur les vents. Comme les différentes couches de l'Athmosphère sont capables de dilatation & de compression , & que l'action Solaire doit nécessairement en éle-

ver certaines parties , tandis que d'autres s'abbaissent , il est certain que les différens points d'une même couche seront inégalement pressés , & que cette couche ne conservera pas exactement la même densité ni le même ressort dans toutes ses parties. Mais quand on vient à déterminer la différence des pressions sur les points d'une même couche ; on trouve cette différence si petite , que l'effet qui en résulte , doit être très-peu considérable. Il est donc permis dans toute cette recherche de regarder chacune des couches de l'air , comme non élastique & d'une densité invariable. Aussi les observations du Baromettre nous font-elles connoître , que le poids des différentes colonnes de l'Atmosphère est fort peu altéré par l'action du Soleil & de la Lune.

On demandera sans doute , pourquoi cette action qui élève si fort les eaux de l'Océan , ne produit pas une assez grande variation dans le poids de l'air , pour qu'on s'en apperçoive très-facilement sur le Baromettre ? Nous pourrions en donner plusieurs raisons ; mais la seule différence entre la densité de l'air & celle de l'eau , fournit une explication très-sensible de ce Phenomene. Supposons que l'eau s'élève en pleine Mer à la hauteur

hauteur de 60 pieds : qu'on mette à la place de l'eau , quelque autre Fluide que ce soit , il est certain qu'il devra s'élever à une hauteur à peu près semblable ; car si ce Fluide est plus ou moins dense que l'eau de l'Océan , l'action Solaire qui attire chacune de ses parties , produira aussi dans la masse totale une force plus ou moins grande en même proportion ; par conséquent la vitesse & l'élévation des deux Fluides devront être les mêmes. Ainsi une colonne d'air homogène , d'une densité égale à celui que nous respirons , s'élèveroit à la hauteur de 60 pieds , & sa hauteur varieroit de 120 pieds en un jour , savoir 60 pieds en montant , & 60 en descendant. Or le Mercure étant environ onze mille fois plus pesant que l'air d'ici bas , une différence de 120 pieds dans la hauteur de l'Athmosphère ne doit faire varier le Barometre que d'environ 2 lignes. C'est à peu près la quantité dont on trouve qu'il doit hausser chaque jour sous l'Equateur , dans la supposition que le vent d'Est y fasse 8 pieds par seconde. Mais comme il y a une infinité de causes accidentelles qui font souvent hausser & baisser le Barometre de beaucoup plus de deux lignes en un jour , il n'est pas surprenant que les balance-

mens qui peuvent y être excités par l'action du Soleil & de la Lune , ne soient pas faciles à distinguer : j'exhorte pourtant les Observateurs à s'y rendre attentifs.

Il me semble que le Lecteur doit avoir maintenant une idée générale de mon travail sur la question proposée par l'Académie de Berlin. Si ce travail laisse encore dans la Théorie des vents de l'obscurité & de l'incertitude , c'est au moins avoir fait quelques progrès dans cette matiere , que d'avoir donné les vrais principes dont elle dépend ; principes , qui étant combinés avec les Expériences , nous conduiront sans doute à des connoissances plus fixes & plus certaines sur l'origine , l'ordre & les causes des vents réguliers.

Cette considération m'a engagé à faire aussi quelques recherches sur le mouvement de l'air renfermé entre une chaîne de montagnes , quoique l'Académie de Berlin n'ait pas paru le demander. Je me suis contenté de supposer cette chaîne , ou sur l'Equateur , ou sur un parallèle , ou sur un Méridien , parce que la nature du sujet & les bornes qui m'étoient prescrites , ne m'ont pas permis de m'engager dans un plus grand détail. Entre plusieurs remarques singulières auxquelles

le calcul m'a conduit, j'ai trouvé que l'air, ou en général tout autre Fluide, qui, par une cause quelconque, se mouvroit uniformément & horizontalement entre deux plans verticaux & parallèles, ne devroit pas toujours s'accélérer dans les endroits où son lit viendroit à se rétrécir; mais que suivant le rapport de sa profondeur, avec l'espace qu'il parcourroit dans une seconde, il devroit tantôt s'abaisser en ces endroits, tantôt s'élever; que dans ce dernier cas, il augmenteroit plus sa hauteur en s'élevant qu'il ne perdroit en largeur, & que par conséquent au lieu d'accélérer sa vitesse, il devroit au contraire la ralentir, puisque l'espace par lequel il devroit passer, seroit augmenté réellement au lieu d'être diminué.

Tels sont en abrégé les principes & les points fondamentaux de la Dissertation suivante. Pour les faire connoître plus à fond, il seroit nécessaire d'entrer dans des discussions plus profondes, qui ne pourroient être entendues que des seuls Geomètres. Mais je ne dois pas manquer de répéter en finissant, que si le concours des causes accidentelles peut occasionner dans les vents une infinité de variations, & altérer même quelque-

fois l'action du Soleil & de la Lune jusqu'à la faire méconnoître, l'effet de cette action n'en doit pas moins suivre par lui-même un ordre invariable & constant. Approfondir & calculer cet effet, est l'unique but auquel il soit permis d'atteindre pour le présent, & c'est aussi la seule question que j'aie tâché de résoudre.

*Cras vel atrá  
Nube polum Pater occupato,  
Vel Sole puro ; non tamen irritum  
Quodcumque retrò est efficiet.*

*Extrait des Registres de l'Académie Royale des Sciences,  
du 27 Août 1746.*

**M**ESSIEURS DE MONTIGNY & l'Abbé DE GUA, qui avoient été nommés pour examiner un Ouvrage de M. D'ALEMBERT, intitulé: *Réflexions sur la cause générale des Vents, ou Recherches sur les mouvemens que l'action du Soleil & celle de la Lune peuvent exciter dans l'Atmosphère*, en ayant fait leur rapport, l'Académie a jugé cet Ouvrage digne de l'impression. En foi de quoi j'ai signé le présent Certificat. A Paris, ce 6 Septembre 1746.

GRAND-JEAN DE FOUCHY, *Secrétaire perpétuel  
de l'Académie Royale des Sciences.*

REFLEXIONS

DE L'IMPRIMERIE DE JEAN-BAPTISTE COIGNARD,  
IMPRIMEUR DU ROI.



# REFLEXIONS

SUR

## LA CAUSE GENERALE DES VENTS,

*Dans lesquelles on tâche de résoudre le Problème  
proposé par l'Académie Royale des Sciences  
& des Belles Lettres de Berlin.*

---

### ANALYSE DE L'OUVRAGE.



A question proposée par l'Académie, consistoit à déterminer l'ordre & la loi que le vent devoit suivre, si la Terre étoit environnée de tous côtés par l'Océan; en sorte qu'on pût en tout tems prédire la vitesse & la direction du vent pour chaque endroit.

Pour répondre à cette question, autant que la nature du sujet m'a paru le permettre, j'ai composé la Dissertation suivante, qui peut se diviser en trois Parties.

## ANALYSE DE LA PREMIERE PARTIE

*Qui s'étend depuis l'art. 1 jusqu'à l'art. 39.*

Dans cette premiere Partie, je suppose que la Terre est un globe solide dont la surface est parfaitement unie & couverte d'un air fort rare, homogene, & sans ressort; qui, dans son premier état, ait une figure sphérique. Je suppose, de plus, que tous les points de ce Fluide soient animés par des forces qui soient perpendiculaires à l'axe, & proportionnelles aux distances de ces points à l'axe; & non seulement je détermine la figure que le Fluide doit prendre en vertu de ces forces, mais je détermine encore (art. 12) les oscillations que doit faire le Fluide, pour passer de la figure sphérique qu'il avoit d'abord, à sa nouvelle figure sphéroïdale: oscillations que personne n'a encore enseigné à calculer (\*).

---

[(\*) Il ne sera peut-être pas inutile de rapporter ici ce que dit le célèbre *M. Euler*, sur un sujet qui a quelque rapport à celui-ci, dans son excellent Traité du Flux & Reflux de la Mer, fait en 1740. *Dua sunt res, quæ absolutam ac perfectam totius motûs (Oceani), reddunt summopere difficilem; quarum altera Physicam spectat, atque in ipsâ Fluidorum naturâ consistit, quorum motus difficulter ad calculum revocatur, præcipuè si quæstio sit de amplissimo Oceano, qui aliis in locis elevetur, aliis verò deprimatur...* plus bas il ajoute: *Quod quidem ad difficultatem Physicam attinet, res hoc quidem tempore ferè desperata videtur: quanquam enim ab aliquo tempore, Theoria motûs aquarum ingentia sit affecta incrementis, tamen ea potissimum motum aquarum in vasis & tubis fluentium*

SUR LA CAUSE GENERALE DES VENTS. 3

Je résous ensuite le même Problème, (art. 28) en supposant que le Fluide dont le globe est couvert, est homogène & sans élasticité; mais qu'il est assez dense pour qu'on doive avoir égard à l'Attraction mutuelle de ses parties.

Ces Problèmes résolus, je détermine aisément (art. 33) les oscillations que l'air auroit dû faire en vertu de la rotation diurne de la Terre sur son axe, si la figure de l'air avoit d'abord été sphérique: je détermine de même les oscillations que l'air devoit faire en vertu de l'action du Soleil & de la Lune, si ces deux astres étoient l'un & l'autre en repos: il est vrai, que dans le cas où le Soleil & la Lune seroient supposés immobiles, l'air auroit bien-tôt pris la figure qu'il devoit avoir en vertu de leur action, s'il n'avoit pas eu cette figure dès le commencement, & qu'ainsi les oscillations dont il s'agit, dureroient fort peu, ou même qu'il n'y en auroit peut-être point du tout; cependant il m'a paru qu'il n'étoit pas inutile de m'appliquer à cette recherche, non-seulement parce qu'il en résulte une Théorie curieuse & nouvelle;

---

*respiciunt, neque vix ullum commodum inde ad motum Oceani definiendum derivari potest. Quamobrem in hoc negotio aliud quidquam prastare non licet, nisi ut hypothesis effingendis, quæ à veritate quàm minimè abluant, tota quæstio ad considerationes purè Geometricas & Analyticas revocetur.* Je ne cite ces paroles d'un si grand Géomètre, que pour faire entrevoir en quoi consiste la difficulté du Problème que je me suis proposé; la méthode que j'ai employé pour en trouver la solution, est, si je ne me trompe, générale & nouvelle.]

mais encore , parce que cette Théorie est appuyée sur des principes , dont la plûpart me feront nécessaires dans la suite de cet Ouvrage.

#### ANALYSE DE LA SECONDE PARTIE

*Qui s'étend depuis l'art. 39 jusqu'à l'art. 90.*

Cette seconde Partie est destinée à déterminer le mouvement de l'air en vertu de l'action des deux astres , lorsqu'on les suppose en mouvement. Pour en venir à bout , je suppose d'abord (*art. 39*) que la Terre est un globe solide couvert d'une couche d'air , soit homogène , soit hétérogène , dont les parties ne puissent se nuire réciproquement dans leurs mouvemens , & reçoivent par conséquent de l'action de l'astre , tout le mouvement qu'elles peuvent en recevoir. Dans cette supposition , je détermine la direction & la vitesse du vent pour chaque endroit , & j'explique entr'autres choses , comment il peut se faire qu'il y ait sous l'Equateur un vent d'Est continuel. Ensuite , tout le reste demeurant comme auparavant , je change (*art. 45*) le globe solide en un globe fluide , ou plutôt en un globe solide couvert d'un fluide dense & dont les parties s'attirent , comme l'eau de la mer ; dans cette supposition , je détermine la vitesse du vent , & je fais voir qu'elle est fort différente de celle que le vent devoit avoir sur un globe solide.

Je détermine ensuite la vitesse du vent , (*art. 47*) en supposant que les parties de l'air se nuisent réciproque-

ment dans leurs mouvemens, comme elles se nuisent en effet ; & je cherche d'abord la vitesse que doit avoir l'air, en imaginant qu'il soit homogène, & que la surface du globe terrestre soit solide. Je prouve que la direction du vent ne doit s'écarter que fort peu du plan vertical variable, par lequel l'astre passe à chaque instant ; & déterminant ensuite la vitesse du vent par le calcul, je trouve que sous l'Equateur, elle doit avoir d'Orient en Occident une direction constante.

Je démontre (*art. 49 & 50*) un paradoxe singulier : savoir, qu'il y a des cas, où le Fluide, mû par la force de l'Attraction de l'astre, doit s'abaisser sous cet astre, au lieu de s'élever, comme il sembleroit le devoir faire. Ensuite résolvant la question d'une manière plus générale (*art. 65*), je donne les Equations pour déterminer la vitesse du vent, sans supposer que sa direction soit toujours dans le vertical de l'astre ; mais ces Equations sont si compliquées, que dans le cas même le plus simple, je n'ai pu en déduire que par approximation les principales loix d'où dépend la Théorie des vents.

Ensuite je reprends (*art. 77*) l'hypothèse de la direction du vent dans le plan vertical de l'astre, & je détermine sa vitesse, en supposant, que la Terre soit un globe solide, couvert, 1°. d'un Fluide dense, & dont les parties s'attirent, comme l'eau de la mer : 2°. d'un Fluide rare, dont les couches diffèrent en densité, comme la masse d'air qui nous environne.

## ANALYSE DE LA TROISIEME PARTIE

*Qui s'étend depuis l'article 90 jusqu'à la fin.*

Cette partie contient un léger essai sur le mouvement de l'air, entant que ce mouvement est changé & altéré par des montagnes ou par d'autres obstacles. Je détermine (art. 90) la vitesse du vent sous l'Equateur, sous un parallèle, & sous un Meridien quelconque, en supposant que ce vent souffle dans une chaîne de montagnes parallèles, soit que ces montagnes s'étendent jusqu'au haut de l'Atmosphère, ou non : ensuite je donne les Equations par le moyen desquelles on peut déterminer le mouvement du vent, ou les oscillations qu'il devoit faire dans un espace entouré & fermé de tous côtés par des montagnes. Enfin, j'essaie de donner aussi quelques règles pour déterminer la vitesse du vent, lorsqu'il souffle entre une chaîne de montagnes qui ne sont point parallèles, & je termine cette partie par la solution d'un Problème assez curieux, dans lequel je détermine quelle doit être la vitesse du vent, supposé 1°. que la Terre soit réduite au plan de l'Equateur, ou ce qui revient au même, que l'Equateur soit couvert de très-hautes montagnes parallèles entr'elles. 2°. Que l'Atmosphère, au premier instant de son mouvement, ait une figure quelconque, pourvu que cette figure soit peu différente d'un cercle. 3°. Que chaque partie de l'Atmosphère ait reçu au premier instant de son mouvement, une impulsion

quelconque. 4°. Qu'on connoisse l'endroit d'où l'Astre commence à se mouvoir, & le tems, depuis lequel il est en mouvement.

## R E M A R Q U E.

Dans tout le cours de cet Ouvrage, j'ai toujours supposé que le Fluide, ou les Fluides, soit homogenes, soit heterogenes, dont le globe terrestre étoit imaginé couvert, avoient peu de profondeur par rapport au rayon de la Terre; ce qui n'est point contraire à l'expérience, puisque la hauteur moyenne de l'air n'est que d'un petit nombre de lieues, selon l'estimation commune: & que la hauteur moyenne des eaux de l'Océan est réputée d'environ  $\frac{1}{4}$  de mille. De plus, cette supposition n'est point contraire à ces mots de la question proposée par l'Académie, *couverte d'un profond Ocean*; car quand on supposeroit la hauteur moyenne de l'Océan, d'une lieue par exemple, l'Océan, quoique très-profond, auroit encore fort peu de hauteur par rapport au rayon de la Terre.

Je n'ai presque point eu d'égard au mouvement de l'air, tant qu'il peut résulter de la chaleur produite par le Soleil. En effet, comme la cause de la chaleur, & la force par laquelle le Soleil échauffe l'air, sont entièrement inconnues, soit dans leur principe, soit dans la maniere dont elles agissent, & dans les effets qu'elles produisent, il m'a paru, qu'on n'en pouvoit rien déduire, qui servît à faire connoître *la vitesse & la direction du*

*vent*, comme l'Académie le demande dans son Programme. Je me suis donc borné à déterminer le mouvement de l'air, entant qu'il provient de la seule force du Soleil & de la Lune, qui agit sur la Mer & sur l'Atmosphère en attirant leurs parties; force que *Newton* nous a appris à mesurer, quel qu'en soit le principe; & que l'Académie semble indiquer comme la principale cause des vents, par ces paroles de son Programme. *Le mouvement des vents ne seroit peut-être déterminé que par ces trois causes; savoir, le mouvement de la Terre, la force de la Lune, & l'activité du Soleil. Comme ces trois choses suivent un ordre certain, les effets qu'elles produisent, doivent aussi subir des changemens dans un ordre semblable.* Par ces paroles, il me semble que l'Académie regarde l'action de la Lune comme influant sur les vents, du moins autant que le Soleil, quoique l'action de la Lune ne puisse échauffer l'air. De plus, l'Académie demande les loix du mouvement de l'air, entant qu'il est produit par des causes qui suivent un ordre certain. Or la force du Soleil pour échauffer l'air ne doit point être comptée, ce me semble, au nombre de ces causes, puisque l'ordre qu'elle suit, s'il n'est pas incertain en lui-même, l'est au moins par rapport à nous qui l'ignorons. J'avoue qu'il y a eu jusqu'à présent plusieurs Auteurs qui ont regardé comme la principale cause des vents, la chaleur produite dans l'air par le Soleil, & la raréfaction que cet Astre y cause. Mais en premier lieu, il me semble que les vents qui en sont l'effet, ont été expliqués jusqu'ici d'une manière assez vague, &

ne

ne peuvent l'être que par des calculs précis qu'on ne fauroit faire ; d'ailleurs, si ces Auteurs ont attribué les vents généraux à la chaleur produite par le Soleil, c'est, selon toute apparence, parce qu'ils n'ont pas crû pouvoir expliquer autrement le vent d'Est continuél qu'on sent sous l'Equateur. Or j'espere démontrer dans cet Ouvrage, que le vent d'Est dont il s'agit, peut être produit par l'Attraction seule du Soleil & de la Lune.

Cependant pour ne rien laisser à désirer sur le Problème proposé, j'ai ajouté à la fin de cette Dissertation quelques remarques, sur les mouvemens que peut occasionner dans l'air la différente chaleur de ses parties.

A l'égard de l'élasticité de l'air, j'ai fait voir (*art. 37 n. 2*) qu'on doit n'y avoir aucun égard, au moins entant qu'elle peut être augmentée ou diminuée par l'attraction du Soleil & de la Lune.

Pour ce qui concerne les vents irréguliers, qui résultent, soit des vapeurs, soit des nuages, soit de la situation des terres, soit enfin de différentes autres causes entièrement inconnues, je n'en ai fait aucune mention; l'Académie avouant elle-même qu'on ne peut raisonnablement en exiger le calcul.

Mais avant de finir cette Préface, il est à propos d'avertir que dans plusieurs endroits de la Dissertation suivante, j'ai cru pouvoir insérer différentes choses, qui sans avoir un rapport direct & immédiat à la question proposée par l'Académie, résultent néanmoins de la solution que j'en ai donnée, & peuvent être utiles, soit à la Dy-

namique, soit à l'Hydrodynamique, soit à l'Analyse même. De ce nombre, sont entr'autres 1°. les remarques de l'*art.* 31 sur la Figure de la Terre, où je démontre plusieurs vérités fort paradoxes sur cette matiere. 2°. L'examen de la cause pour laquelle l'action du Soleil & de la Lune produit une variation fort peu sensible sur le Barometre (*art.* 36), & en même tems quelques réflexions sur la maniere dont le savant M. *Daniel Bernoulli* a expliqué ce Phenoméne. 3°. Le principe général exposé dans la note sur l'*art.* 12 (+), & par lequel on peut résoudre avec facilité toutes les questions de Dynamique & d'Hydrodynamique. 4°. Les remarques de l'*art.* 79 sur les grandeurs imaginaires, & la méthode singuliere exposée dans l'*art.* 80, pour intégrer certaines équations, comme aussi la solution des Problèmes des *art.* 87 & 89. Cependant, afin qu'on puisse passer ces articles, si on le juge à propos, je les ai distingués par une étoile (\*) des articles absolument nécessaires.

Il ne me reste plus qu'à soumettre au jugement de

---

[ (+) Ce principe est le même dont je me suis servi dans mon *Traité de Dynamique* & dans mon *Traité des Fluides*; comme j'aurois pû me faire reconnoître en les citant, j'ai pris le parti d'exposer & de démontrer de nouveau ce même principe en peu de mots dans la note sur l'*art.* 12: ceux qui auront vû les applications que j'en ai fait dans mes deux premiers Ouvrages, & qui voudront se donner la peine d'examiner l'usage que j'en fais dans celui-ci, conviendront sans peine, que ce principe est tout à la fois, très-simple, très-facile, & très-fécond. ]

l'Académie, ce petit nombre de recherches, auxquelles le défaut de tems, & d'autres occupations, ne m'ont pas permis de donner tout l'ordre & toute la perfection dont elles pouvoient être susceptibles.

PROPOS. I. LEMME.

1. Soit un quart d'Ellipse gnd, (Fig. 1) qui diffère très-peu d'un cercle : si on suppose la moitié du petit Axe  $Cg = r$ , la différence des demi-Axes,  $a$ , & le Sinus de l'angle  $gCn$ ,  $z$ , le Sinus total étant 1 : je dis qu'on aura  $Cn - Cg = \frac{az}{rr}$  à très-peu près.

Car décrivant le cercle  $gO\omega$ , & menant l'ordonnée  $nKS$ , on aura à cause des triangles semblables  $nKO$ ,  $SnC$ ;  $nO$  ou  $Cn - Cg = \frac{nK \times nS}{nC} = \frac{a \cdot nS^2}{rr}$ . Donc &c.

PROPOS. II. PROBLÈME.

2. Soit un globe solide  $PEpV$ , (Fig. 2) composé de différentes tranches circulaires  $PEp$ ,  $KeT$ ,  $OF\sigma$ , qui soient, si l'on veut, de différentes densités ; supposons que ce globe soit couvert d'un Fluide homogène & sans ressort  $DEPGIVpHD$ ; que chaque partie  $N$  du Fluide soit sollicitée par une force qui agisse suivant  $NA$  parallèle à  $DC$ , (+) & qui soit

[(+)] Comme la ligne  $CG$  est supposée l'axe du Spheroidé ; la ligne  $DC$  change de position, selon les différentes coupes  $GdH$  dans lesquelles elle se trouve ; ainsi les lignes  $NA$  ne sont pas  
 b ij

proportionnelle au Sinus correspondant  $NS$ ; que de plus, les particules du Fluide soient poussées vers le centre  $C$ , par une force qui soit comme une fonction quelconque de la distance, & qui soit beaucoup plus grande que la force suivant  $NA$ . On demande la courbure  $gnd$  (Fig. 3) que doit avoir ou que doit prendre la surface du Fluide, pour être en équilibre.

Il est évident 1°. que la courbe  $gnd$  doit être à peu près circulaire; 2°. que la pesanteur suivant  $nC$  en quel point  $n$  que ce soit, peut être regardée comme constante, & peut être supposée  $= p$ ; 3°. que la force résultante de la pesanteur  $p$  & de la force suivant  $nA$ , doit être perpendiculaire à la courbe  $gnd$  en  $n$ ; 4°. que si on appelle  $\phi$  la force en  $d$ , parallèle & répondante à

la force suivant  $nA$ , on aura la force suivant  $nA = \frac{\phi z}{r}$ ;

donc la force suivant  $n$ , sera à très-peu près  $= \frac{\phi z \sqrt{rr - zz}}{rr}$ ;

Ainsi décrivant le cercle  $gO\omega$ , on aura, à cause de l'équilibre,  $p : \frac{\phi z \sqrt{rr - zz}}{rr} :: \frac{rdz}{\sqrt{rr - zz}} : d(nO)$  à peu près. Donc  $nO = \frac{\phi z z}{2pr}$ . Donc  $Cn - Cg = \frac{\phi z z}{2pr}$ ; c'est

parallèles à une ligne de position constante  $CD$ , mais aux lignes  $CD$  perpendiculaires à  $GH$  qui se trouvent dans les plans  $GNH$ ; ou pour parler plus clairement, la ligne  $NA$  est toujours perpendiculaire à la ligne fixe  $GH$ .]

SUR LA CAUSE GENERALE DES VENTS. 13

pourquoi (art. 1) la courbe  $gnd$  est une Ellipse, dont la différence  $a$  des Axes est  $= \frac{\varphi r}{3p}$ .

C O R O L L. I.

3. Pour avoir la ligne  $Gg$ , ou la distance entre le point  $G$  du cercle  $GND$ , & la surface  $gnd$ , il faut remarquer que le solide par  $GND\omega g$  (\*) doit être égal au solide par  $gd\omega g$ . Or si on appelle  $2n$  le rapport de la circonférence au rayon, &  $Gg$ ,  $k$ ; le premier de ces solides est  $k \cdot 2nrz$ . à très-peu près: le second est égal à ce que devient la quantité  $\int \frac{\varphi z z}{2pr} \times 2nz \times \frac{r dz}{\sqrt{rr-zz}}$ , lorsque  $z = r$ ; c'est-à-dire à  $\frac{\varphi}{p} \times \frac{2nr^3}{3}$ . Donc on aura

$$k = \frac{\varphi r}{3p}$$

S C O L I B I.

4. Il est évident que la quantité  $k$  ne doit pas être plus grande que  $GP$ : autrement il arriveroit que quand le Fluide seroit en équilibre, il y auroit quelque partie de la surface  $PE$  qui seroit entièrement à découvert, & alors la solution précédente devoit n'être plus la même.

(a) Par ces termes, le solide par  $GND\omega g$ , & d'autres semblables, j'entendrai toujours dans la suite, le solide engendré par la résolution de la figure  $GND\omega g$  autour de  $CG$ .

## SCOLIE II.

(\*) 5. Si on demande quelle devroit être la solution du Problème dans le cas où on trouve  $k > GP$ , (Fig. 4) on fera  $GP = \epsilon$ ; & supposant pour faciliter le calcul, que  $\epsilon$  soit fort petite par rapport à  $r$ , on imaginera que le Fluide parvienne à l'équilibre dans la situation  $g\delta E$ , enforte que la partie  $Pg$  de la surface du globe soit à découvert; & faisant  $E\delta = n$ , &  $gV = z'$ , on aura  $n = \frac{\phi r}{2p} \times$   
 $(\frac{rr - z'z'}{2r}) = \frac{\phi r}{2p} \times \frac{CV^3}{CP^3}$ . On trouvera de même  $NO = \frac{\phi}{p} \times$   
 $\frac{OL^3 - gV^3}{2r} = \frac{\phi}{p} \times \frac{zz - z'z'}{2r}$ . Ainsi prenant  $z'$  pour constante, on trouvera le solide par  $gN\delta E$  = au solide par  $gECV$  multiplié par  $\frac{\phi}{p}$ , moins la quantité  $\frac{\phi \cdot nCV \cdot gV^3}{p}$ . Or le solide par  $gN\delta E$  doit être égal au solide par  $GNDEP$  ou  $\epsilon \cdot 2nr$ : on aura donc  $\epsilon \cdot 2nr = \frac{\phi}{p} \times$   
 $[\frac{r}{3} \cdot 2nr \sqrt{rr - z'z'}] + \frac{nz'z' \sqrt{rr - z'z'}}{3} -$   
 $nz'z' \sqrt{rr - z'z'}$ . D'où l'on tire  $\frac{3p^3rr}{\phi} = (rr - z'z')^{\frac{3}{2}}$ ;  
ou  $\frac{3p^3rr}{\phi} = CV^3$ . Ainsi on connoitra la partie  $Pg$  de la surface du Fluide, qui doit être à découvert. Or comme  $CV$  ne peut être plus grand que  $r$ , il s'ensuit que le

Problème ne peut être résolu que dans le cas où  $\frac{3r^2}{\phi}$  n'est pas plus grand que  $r$ , c'est-à-dire dans le cas où  $r$  n'est pas plus grand que  $\frac{2r}{3\phi}$ ; ce qui est l'inverse de l'art. 4.

C O R O L L. II.

6. Si on revient maintenant aux suppositions qui ont été faites dans l'article 3, on aura  $Nn$  (Figure 3) ou  $Gg - nO = \frac{\phi}{r} \left( \frac{r}{3} - \frac{zx}{2r} \right)$ ; & le solide par  $GNng = \int \frac{\phi}{r} \left( \frac{r}{3} - \frac{zx}{2r} \right) \times 2nz \times \frac{r dz}{\sqrt{rr - zx}} = \frac{\phi n z z \sqrt{rr - zx}}{3P}$ .

C O R O L L. III.

7. Donc pour avoir un point  $v$  tel, que le solide par  $nvmM$  soit égal au solide par  $GNng$ , il faut prendre  $nv$  telle que l'on ait  $2nz \cdot nv \times \frac{r}{3} \times \left( 1 - \frac{CP^2}{CG^2} \right) = \frac{\phi n z z \sqrt{rr - zx}}{3P}$ ; donc si on fait  $CP = \rho$ ; on aura  $nv = \frac{\phi r^2 z \sqrt{rr - zx}}{P \cdot 2r (r^2 - \rho^2)}$ .

S C O L I E III.

8. Si la hauteur  $GP$  du Fluide est fort petite par rapport au rayon  $CP$ , on peut trouver encore l'équation de la surface  $gnd$  par une autre méthode fort facile, en supposant que les deux colonnes  $Mn$ ,  $mv$ , soient infiniment proches l'une de l'autre, & en remarquant que l'excès

du poids de la colonne  $mv$  sur la colonne  $nM$  est égal à la force de la particule  $Mm$  suivant  $Mm$ : d'où l'on tire

$$p \times d(nO) = \frac{r dz}{v [rr - zz]} \times \frac{\phi z \sqrt{rr - zz}}{rr} = \frac{\phi z dz}{r},$$

comme dans l'*art.* 2.

Si  $PG$  n'étoit pas fort petite par rapport à  $CP$ , alors en calculant la différence de poids des colonnes  $mv$ ,  $nM$ , on ne pourroit pas négliger la force suivant  $nN$ , résultante de la force  $\frac{\phi z}{r}$  qui agit suivant  $nA$ . Ainsi la force de la particule  $Mm$  suivant  $Mm$ , ne seroit point alors égale à  $pd(nO)$ , puisque  $pd(nO)$  ne devroit point alors être regardé comme l'excès de pesanteur de la colonne  $mv$  sur la colonne  $nM$ .

#### SCOLIE IV.

9. Supposant que  $GP$  soit fort petite par rapport à  $CP$ , on trouve que l'excès du poids de la colonne  $Ed$  sur la colonne  $Pg$ , sera à très-peu près  $\frac{\phi r}{2}$ .

#### SCOLIE V.

10. Les mêmes choses étant supposées; si on fait  $r - \phi = \epsilon$ , on aura dans l'*art.* 7,  $nv = \frac{z \sqrt{rr - zz}}{61} \times \frac{\phi}{p}$ .  
D'où il s'en suit que la ligne  $nv$  ne peut être fort petite par rapport à  $r$ , comme nous l'avons supposé dans l'*art.* 7, à moins

moins que  $\frac{\phi r}{\delta p}$  ne soit une quantité fort petite ; c'est pourquoi, comme  $\phi$  est déjà fort petite par rapport à  $r$ , il faut que  $\phi$  soit encore beaucoup plus petite par rapport à  $\delta p$ , que  $\phi$  ne l'est par rapport à  $r$ .

## COROLL. IV.

11. Si par un point quelconque  $\gamma$  de la petite ligne  $Gg$ , (Fig. 5) on décrit la courbe  $\gamma I i \delta$ , qui coupe les lignes  $Gg$ ,  $Nn$  en raison donnée, c'est-à-dire, de manière que  $NI$  soit à  $Nn$  comme  $G\gamma$  à  $Gg$  ; il est évident,

1°. Que si  $n\gamma$  est très-petite par rapport à  $r$ , la ligne  $N\gamma$  sera coupée en  $i$ , à peu près dans le même rapport que  $Nn$  l'est en  $I$  : & qu'ainsi on aura  $Mm : M\mu :: Nn : NI :: Gg : G\gamma$ .

2°. Que le solide par  $G\gamma IN$  sera au solide par  $GgnN$ , comme  $G\gamma$  à  $Gg$ , & qu'ainsi le solide par  $G\gamma IN$  sera = au solide par  $Ii\mu M$  ; puisque le solide par  $Ii\mu M$  est au solide par  $n\gamma m M$ , (égal au solide par  $GgnN$ ) comme  $M\mu$  est à  $Mm$ , ou comme  $G\gamma$  est à  $Gg$ .

3°. Que le Sinus du complément de l'angle presque droit  $gnC$ , est au Sinus du complément de l'angle presque droit  $\gamma IC$ , comme  $Gg$  à  $G\gamma$ , ou comme  $Mm$  à  $M\mu$  ; par conséquent, si on regarde les angles en  $I$  & en  $i$  comme presque égaux, le Sinus du complément de l'angle en  $i$  fera au Sinus du complément de l'angle en  $n$ , comme  $M\mu$  à  $Mm$ , à très-peu près.

## PROPOS. III. PROBLÈME.

12. Les mêmes choses étant supposées que dans le Problème précédent art. 2, on demande comment & par quels degrés la surface Spherique GND du Fluide GDEP parvient dans la situation gnd; ou, ce qui est la même chose, on demande la loi du mouvement de la masse GDEP lorsqu'elle parvient en gdeP.

Pour rendre le calcul plus facile; nous supposerons comme dans les art. 6, 7, 8, 9, &c. que  $\epsilon$  est fort petite par rapport à  $r$ ; & que  $\phi$  est encore beaucoup plus petite par rapport à  $\phi p$ . Cela supposé, je dis, qu'on peut imaginer sans erreur sensible, 1°. que la colonne  $NM$  du Fluide vient en  $\nu m$ , le point  $N$  décrivant la ligne  $N\nu$ , & le point  $M$  la ligne  $Mm$ . 2°. Que lorsque les points  $N, M$  sont arrivés en deux endroits quelconques  $i, \mu$ , alors la force accélératrice qui agit perpendiculairement à  $NM$  ou  $i\mu$ , soit sur le point  $N$ , soit sur le point  $M$ , est à la force  $\frac{\phi \epsilon \sqrt{[rr - z z]}}{rr}$ , comme  $m\mu$  à  $Mm$ . 3°. Que dans l'instant même où le point  $N$  vient en  $i$  ou en  $\nu$ , le point  $G$  vient en  $\gamma$  ou en  $g$ , & le point  $D$  en  $d$  ou en  $d$ , & que la surface  $GND$  se change en  $\gamma i d$  ou en  $gnd$ .

Il est constant qu'on peut admettre la première de ces suppositions, puisque les points  $N$  &  $M$ , étant (*hyp.*) très-proches l'un de l'autre, leur vitesse perpendiculaire à  $NM$  doit être à peu près la même; & cette suppo-

sition sera de nouveau confirmée par les remarques que nous ferons plus bas. [Voyez l'art. 18].

Maintenant, pour démontrer que la seconde & la troisième supposition sont exactes & légitimes, supposons qu'elles le sont en effet, & voyons ce qui s'en ensuivra. On remarquera d'abord, que quand le point  $N$  parvient en  $i$ , & le point  $M$  en  $\mu$ , on aura (en décrivant, comme dans l'art. 11 la courbe  $\gamma I \delta$ ) le solide par  $G \gamma I N =$  au solide par  $I i \mu M$ . De plus, la force totale qui agit sur le point  $N$  ou  $i$  perpendiculairement au rayon, est

$\frac{\phi z \sqrt{rr - zz}}{rr}$  : c'est pourquoi si on suppose que la force ac-

célératrice est  $\frac{\phi z \sqrt{rr - zz}}{rr} \cdot \frac{m\mu}{Mm}$ ; il est évident que la

force restante sera  $\frac{\phi z \sqrt{rr - zz}}{rr} \times \frac{M\mu}{Mm}$ . Or si les deux suppositions que nous examinons ici, sont légitimes, il faut 1°. que cette force restante soit telle, qu'elle ne produise aucun mouvement dans les points  $\mu$  &  $i$  (\*), puis-

(\*) §. I. C'est un principe généralement vrai en Mécanique, que si un corps tend à se mouvoir avec la vitesse  $a$ , & qu'il soit forcé de prendre la vitesse  $b$ , soit par la rencontre de quelque obstacle, soit par quelque autre cause, on peut supposer que la vitesse  $a$ , est composée de la vitesse  $b$ , & d'une autre vitesse  $c$ ; & que la vitesse  $c$  doit être telle, que si elle étoit la seule qui eût été imprimée au corps, toutes les autres circonstances demeurant d'ailleurs les mêmes, le corps seroit resté en repos. C'est sur ce principe que sont appuyées les loix du mouvement d'un corps qui

que (*hyp.*) de la force totale  $\frac{\varphi z v [rr - z\kappa]}{rr}$ , il n'y a que

la partie  $\frac{\varphi z v [rr - z\kappa]}{rr} \times \frac{m\mu}{Mm}$  qui soit employée à mouvoir les points  $i$  &  $\mu$ :  $2^{\circ}$ . il faut que le tems employé à parcourir  $Mm$  ou  $M\mu$ , ne dépende pas de la situation du point  $M$  dans le cercle  $PME$ ; car puisque (*hyp.*) tous les points de la courbe  $GN$  passent tous en même tems sur la courbe  $\gamma i\delta$ , savoir dans le tems que le point  $N$

vient frapper obliquement une surface plane. Car la vitesse absolue  $a$  avec lequel le corps tend à se mouvoir lorsqu'il frappe le plan, est composée de la vitesse  $b$  parallèle au plan, qui est la vitesse avec laquelle le corps doit se mouvoir après le choc, & de la vitesse  $c$ , perpendiculaire au plan, qui doit être détruite, & qui est telle, que si elle avoit été seule imprimé au corps, elle n'auroit produit aucun mouvement.

De ce principe général il résulte, que si la vitesse  $b$  a la même direction que la vitesse  $a$ , cette dernière vitesse pourra être regardée comme composée de  $b$  & de  $a - b$ , à cause de  $a = b + a - b$ . Donc si le corps n'avoit eu que la seule vitesse virtuelle  $a - b$ , il auroit dû rester en repos.

Supposons donc que le point  $A$  (Fig. 6) se meuve suivant  $AG$ , sur une courbe quelconque  $PAD$ , étant animé d'une force accélératrice réelle  $= \pi$ ; & qu'en même tems il soit sollicité de se mouvoir suivant  $AG$  par une force  $= F$ , qui par quelque raison que ce puisse être, se change en  $\pi$ ; je dis que ce corps  $A$ , s'il étoit sollicité suivant  $AP$  par une force  $= F - \pi$ , demeureroit en repos. Car soit  $u$  la vitesse du corps  $A$  suivant  $AG$  dans un instant quelconque  $dt$ : dans l'instant suivant la vitesse du point  $A$  seroit  $u + Fdt$ , si rien n'altéroit son mouvement; mais (*hyp.*) cette vitesse est réellement  $u + \pi dt$ ; or la vitesse  $u + Fdt = u + \pi dt + Fdt - \pi dt$ ; c'est-à-dire, que la vitesse  $u + Fdt$  est composée

SUR LA CAUSE GENERALE DES VENTS. 21

passe en  $i$ , l'expression de ce tems doit être constante & invariable pour tous les points  $N$ ; c'est-à-dire, le tems que le point  $M$  met à parcourir  $M\mu$ , ne doit point dépendre de la situation du point  $M$ . Voyons donc si la

force  $\frac{\phi z \sqrt{[rr - zz]} \times \mu M}{rr \cdot M\mu}$  agissant perpendiculairement à

$i\mu$ , ne doit en effet produire aucun mouvement dans le fluide; & outre cela, si le tems par  $M\mu$  & par  $Mim$  est le même pour tous les points  $M$ .

de la vitesse  $u + \pi dt$ , & de la vitesse  $F dt - \pi dt$ , suivant  $AG$ . Donc par le principe général, la vitesse  $F dt - \pi dt$  doit être telle, que si elle étoit seule imprimée au point  $A$ , ce point resteroit en repos; ou ce qui revient au même, le point  $A$  étant poussé suivant  $AG$  par la force accélératrice  $F - \pi$ , devoit rester en équilibre.

Donc dans la supposition présente, le point  $i$  ou  $\mu$  (Fig. 5) étant sollicité par la seule force  $\frac{\phi z \sqrt{[rr - zz]} \times \frac{M\mu}{\Delta sm}}{rr}$  devoit rester en

repos; car la force  $F$  est ici égale à  $\frac{\phi z \sqrt{[rr - zz]}}{rr}$ , & la force

$\pi = \frac{\phi z \sqrt{[rr - zz]} \cdot \mu \mu}{rr \cdot M\mu}$ . Donc  $F - \pi = \frac{\phi z \sqrt{[rr - zz]} \times M\mu}{rr \cdot M\mu}$ .

§. II. On doit aussi remarquer (ce qui est très-nécessaire pour l'intelligence des propositions suivantes) que si le point  $A$  ne se mouvoit pas suivant  $AP$ , mais suivant  $AD$ , & que la force accélératrice  $\pi$  agit suivant  $AD$ , la force  $F$  agissant toujours suivant  $AP$ , la vitesse dans l'instant qui suit l'instant  $dt$ , seroit  $u + \pi dt$ ; & que  $u - F dt$  seroit la vitesse que le point  $A$  auroit eue, si rien n'avoit altéré son mouvement. Or  $u - F dt = u + \pi dt - F dt - \pi dt$ . Donc si le corps  $A$  ne recevoit que la seule vitesse  $- F dt - \pi dt$  suivant  $AD$ , ou ce qui revient au même, s'il n'étoit animé que de la seule force accélératrice  $F + \pi$  suivant  $AP$ , il devoit demeurer en repos.

On a (art. 2) le Sinus du complément de l'angle  $gnC$ , au Sinus total, comme  $\frac{\phi z \sqrt{[rr - zz]}}{rr}$  à  $p$ ; & (art. 11) le Sinus du complément de l'angle  $\gamma iC$  est au Sinus du complément de l'angle  $gnC$ , comme  $M\mu$  à  $Mm$ . Donc le Sinus du complément de l'angle  $\gamma iC$  est au Sinus total, comme  $\frac{\phi z \sqrt{[rr - zz]}}{rr} \times \frac{M\mu}{Mm}$  est à  $p$ ; donc l'action sur le point  $i$ , provenant de la gravité  $p$  vers  $C$ , & de la force  $\frac{\phi z \sqrt{[rr - zz]}}{rr} \times \frac{M\mu}{Mm}$  perpendiculaire à  $i\mu$ , sera perpendiculaire à la courbe  $\gamma iC$  en  $i$ . Donc l'action de la force  $\frac{\phi z \sqrt{[rr - zz]}}{rr} \times \frac{M\mu}{Mm}$  ne produira aucun mouvement dans le Fluide.

De plus, comme l'on a  $Mm = \frac{\phi z \sqrt{[rr - zz]}}{6ip}$  (art. 10)

& que la force accélératrice en  $M = \frac{\phi z \sqrt{[rr - zz]}}{rr}$ , il est clair que la force en  $M$  est par-tout proportionnelle à la distance du point  $M$  au point  $m$ : donc le tems par  $Mm$  fera le même pour tous les points  $M$ , aussi-bien que le tems par  $M\mu$ , puisque  $M\mu$  est par-tout à  $Mm$  dans la raison constante de  $G\gamma$  à  $Gg$ .

Donc la seconde & la troisième supposition sont légitimes. *Ce qu'il falloit démontrer.*

C O R O L L. I.

13. Si un corps ou point  $M$  est poussé vers un autre point  $m$  par une force accélératrice qui dans les différens points  $\mu$ , soit  $= \frac{F \cdot m\mu}{Mm}$ ; les Geomètres savent, qu'en appellant  $Mm$ ,  $\zeta$ ,  $m\mu$ ,  $x$ , & le tems par  $M\mu$ ,  $t$ , on aura  $dt = - \frac{dx \sqrt{\zeta}}{\sqrt{F \cdot v [\zeta^2 - x^2]}}$ . Donc le tems total employé à parcourir  $Mm$  fera au tems  $\theta$ , qu'un corps pesant mettroit à parcourir une ligne donnée  $a$  en vertu de la gravité  $p$ , comme  $\frac{v \sqrt{\zeta}}{2 \sqrt{F}}$  à  $\frac{\sqrt{2a}}{v}$ ,  $2n$  exprimant toujours le rapport de la circonférence d'un cercle au rayon : donc si au lieu de  $Mm$  ou  $\zeta$ , on substitue sa valeur  $\frac{\varphi z \sqrt{[rr - zz]}}{\delta \rho}$  & pour  $F$  sa valeur  $\frac{\varphi z \sqrt{[rr - zz]}}{rr}$ , on trouvera que le tems employé à parcourir  $Mm$ , est  $\frac{\theta nr}{4 v [3 \delta \rho]}$ .

C'est une chose digne de remarque, que le tems employé par le point  $M$  à parcourir  $Mm$  ne dépend en aucune maniere de la force accélératrice  $\varphi$ , mais seulement de  $r$  & de  $\epsilon$ . Mais si on examine ce paradoxe de plus près, il ne paroîtra point surprenant, puisque la ligne  $Mm$  ( $\frac{\varphi z \sqrt{[rr - zz]}}{\delta \rho}$ ) est proportionnelle à la force  $\frac{\varphi z \sqrt{[rr - zz]}}{rr}$  suivant  $Mm$ .

## COROLL. II.

14. Il est évident, que quand le point  $M$  est arrivé en  $m$ , il ne doit pas rester en ce point  $m$ , mais qu'il doit continuer son chemin vers  $m'$ , & décrire une ligne  $mm' = Mm$ ; qu'ensuite il doit revenir de  $m$  vers  $m'$ , & de-là en  $M$ ; & qu'ainsi il doit faire en allant & en revenant autour du point  $m$  des oscillations, qui dureroient éternellement, si la tenacité & le frottement des parties du Fluide ne ralentissoit peu à peu son mouvement; qui s'éteindra enfin tout-à-fait, le point  $M$  s'arrêtant en  $m$ , & le Fluide s'arrêtant en  $g dEP$ .

Donc le tems d'une oscillation entiere de  $M$  en  $m' = \frac{2nr}{2\sqrt{[3a1]}}$ , & le tems de deux oscillations =  $\frac{2nr}{\sqrt{[3a1]}}$ .

## COROLL. III.

15. En général on aura  $dt$  à  $\theta$ , comme  $-\frac{dx\sqrt{c}}{\sqrt{F} \cdot \sqrt{[cc - xx]}}$  est à  $\frac{\sqrt{2a}}{\sqrt{p}}$ ; c'est-à-dire  $\frac{2dt\sqrt{[3a1]}}{dr} = \frac{-dx}{\sqrt{[cc - xx]}}$ : donc prenant  $c$  pour le nombre dont le Logarithme est l'unité; on aura . . . . .

$$c^{\frac{2t\sqrt{[3a1]} \cdot \sqrt{-1}}{dr}} = \frac{x + \sqrt{[xx - cc]}}{c}. \text{ Donc } \frac{x}{c} =$$

$$c^{\frac{4t\sqrt{[3a1]} \cdot \sqrt{-1}}{dr}} + c^{\frac{-4t\sqrt{[3a1]} \cdot \sqrt{-1}}{dr}}. \text{ Donc } M\mu =$$

$$\frac{\phi z \sqrt{[rr - zz]}}{6p} \times \left[ \frac{2 - \left( c \frac{4r \sqrt{[3a1]} \cdot V-1}{\partial r} + c \frac{-4r \sqrt{[3a1]} \cdot V-1}{\partial r} \right)}{2} \right]$$

$$\& NI = \frac{\phi}{p} \left( \frac{r}{3} - \frac{zz}{2r} \right) \times \left[ \frac{2 - \left( c \frac{4r \sqrt{[3a1]} \cdot V-1}{\partial r} + c \frac{-4r \sqrt{[3a1]} \cdot V-1}{\partial r} \right)}{2} \right]$$

parce que  $NI$  est à  $M\mu$ , comme  $Nn$  ou  $\frac{\phi}{p} \times \left( \frac{r}{3} - \frac{zz}{2r} \right)$  est à  $Mm$  ou  $\frac{\phi z \sqrt{[rr - zz]}}{6ip}$ .

## S C O L I E I.

16. Nous avons déjà prouvé que la ligne  $Nv$  est la direction de la particule  $N$  du Fluide : or il est facile de déterminer l'angle  $nNv$ , puisque  $Nv$ , &  $nv$  sont connues (*art. 6 & 7*) : par conséquent on trouvera facilement la vitesse absolue du Fluide suivant  $Nv$  en un point quelconque  $i$ .

[ Si le Fluide  $GND$  n'avoit pas d'abord été sphérique, mais qu'il eût eu la figure d'une des courbes  $\gamma Id$ ,  $gnd$ , &c. que nous avons déterminées (*art. 11*), il n'auroit pas été plus difficile de trouver en ce cas le mouvement du Fluide ; par exemple, si la surface du Fluide avoit d'abord été  $\gamma Id$ , le point  $i$  eût décrit la ligne  $iv$ , & le point  $\mu$  la ligne  $\mu m$  ; & le tems de la demi oscillation par  $\mu m$  eût été le même, que le tems de la demi oscillation par  $Mm$  dans le cas de la sphéricité. Tout cela peut se démontrer par le même raisonnement dont on s'est déjà servi *art. 12*, & il ne nous paroît point nécessaire de nous

étendre davantage là-dessus. Nous verrons dans la suite quel doit être le mouvement du Fluide, lorsque la surface  $GND$  a une figure quelconque donnée.]

## S C O L I E II.

17. Pour ce qui regarde la vitesse & la direction absolue des points qui sont entre  $N$  &  $M$  (Fig. 7) ; voici comment on la déterminera. Ayant décrit par un point quelconque  $L$  de la ligne  $GP$  le cercle  $LRV$ , on prendra  $L\lambda = \frac{Gg \times LP}{GP}$ , & on décrira la courbe  $\lambda q\mu$ , telle, que l'on ait par-tout  $Rq : Nn :: L\lambda : Gg$ ; faisant ensuite  $Ll = G\gamma \times \frac{LP}{GP}$ , on décrira la courbe  $lro$ , dans laquelle on ait  $Rr : Ni :: Ll : G\gamma$ . Maintenant on verra facilement, que le solide par  $G\gamma IN$  est au solide par  $LlrR$ , comme  $G\gamma$  à  $Ll$ , (à cause que  $GP$  est supposée fort petite par rapport à  $r$ ) c'est-à-dire, comme  $GP$  à  $LP$ . Or le solide par  $Ni\mu M$  est au solide par  $Ro\mu M$ , comme  $NM$  à  $RM$ , ou comme  $GP$  à  $LP$ , & le solide par  $Ni\mu M$  est égal au solide par  $G\gamma IN$ ; d'où il s'ensuit que le solide par  $LlrR$  fera égal au solide par  $Ro\mu M$ . Donc le point  $N$  venant en  $i$ , le point  $R$  viendra en  $o$ , & la vitesse de ce point  $R$  suivant  $Rr$ , sera à la vitesse du point  $N$  suivant  $Ni$ , comme  $L\lambda$  à  $Gg$ , ou  $LP$  à  $GP$ ; ainsi comme la vitesse des points  $R$  &  $N$  parallèlement à  $Mm$ , est la même, on aura facilement le mouvement absolu du point  $R$  suivant  $Ro$ .

## S C O L I E III.

18. Dans la solution du Problème précédent (*art. 12*) nous avons démontré que la force  $\frac{\phi z \sqrt{rr - zz} \cdot M\mu}{rr \cdot Mm}$  étoit

telle, qu'elle faisoit équilibre au point *i* avec la pesanteur vers *C*. Nous eussions pû aussi démontrer que la particule *Mm* du Fluide, animée par cette seule force  $\frac{\phi z \sqrt{rr - zz} \cdot M\mu}{rr \cdot Mm}$  seroit restée en équilibre avec les co-

lonnes *IM*,  $\mu i$ , ou plutôt avec la différence du poids de ces deux colonnes. Si nous eussions suivi cette route pour résoudre le Problème, nous eussions trouvé pour la valeur de la force accélératrice du point *M*, l'expression  $\frac{\phi z \sqrt{rr - zz} \cdot m\mu}{rr \cdot Mm}$  qui est l'excès de la force totale

$\frac{\phi z \sqrt{rr - zz}}{rr}$ , sur la force  $\frac{\phi z \sqrt{rr - zz} \cdot M\mu}{rr \cdot Mm}$ . Or cette va-

leur de la force accélératrice du point *M*, est égale à celle qu'on a déjà trouvée pour la force accélératrice qui meut le point *N* parallèlement à *Mm*. Ce qui confirme de nouveau la supposition que nous avons faite dans l'*art. 12*, que la vitesse des points *N* & *M* parallèlement à *Mm* étoit la même. (J'appellerai dans la suite cette vitesse, *vitesse horizontale*.)

Je ne vois qu'une seule objection à faire contre cette supposition: c'est que la ligne *vm* étant plus petite que la ligne *NM*, il est difficile de concevoir comment les

d ij

points de la ligne  $NM$  peuvent tous arriver en  $ym$ . Mais  
 1<sup>o</sup>. les lignes  $NI$  &  $ym$  diffèrent très-peu l'une de l'autre ;  
 par conséquent l'erreur qui peut résulter de leur différence dans la détermination du mouvement des points de la ligne  $NI$ , doit être une erreur fort petite. [ En effet, que ce soit le point  $N$  même qui vienne en  $i$ , ou que ce soit un autre point ; il est évident, à cause de la petitesse de  $Gg$  par rapport à  $CP$ , que cet autre point ne peut être que fort près de  $N$ , & qu'ainsi le point  $N$  lui-même doit toujours se trouver très-près de la surface ; on peut donc sans erreur sensible, supposer qu'il soit toujours sur la surface même. D'ailleurs, si on examine la solution donnée dans l'*art.* 12, on verra qu'elle ne suppose réellement autre chose, sinon que les points d'une même colonne verticale ont tous une vitesse égale, ou à peu près égale dans le sens horizontal, hypothèse à laquelle on ne sauroit se refuser. C'est sur-tout le mouvement que les points  $N, O$ , ( *Fig.* 5 ) ont dans le sens vertical, qui peut faire changer leur situation par rapport à la surface  $GND$ . Or la force accélératrice qui produit ce mouvement n'est point à considérer, étant très-petite par rapport à la pesanteur ]. 2<sup>o</sup>. L'hypothèse que nous faisons ici, est entièrement semblable & analogue à celle qu'on a fait jusqu'ici tous les Auteurs d'Hydraulique, savoir que quand un Fluide s'échappe verticalement d'un vase de figure quelconque, toutes les particules qui sont situées dans la même tranche horizontale, ont le même mouvement vertical : cette dernière hypothèse est conforme à l'ex-

périence, & cependant elle pourroit être sujette aux mêmes difficultés que l'on nous fait ici. 3°. Me fera-t-il permis d'ajouter ( mais je ne donne ceci que comme une légère conjecture ) que les particules du Fluide qui sont dans la ligne  $NM$ , peuvent être considérées comme des globules ou corpuscules élastiques, qui changent un peu de figure pour venir dans l'espace  $\nu\mu$ . En effet soient  $NM$ ,  $GT$ , ( Fig. 8 ) deux colonnes infiniment proches; que  $NM$  vienne en  $\nu\mu$ , &  $GT$  en  $St$ ; il est évident que le solide par  $NMTG$  doit être égal au solide par  $\nu Stm$ . Ainsi, comme  $\nu m$  est plus petite que  $NM$ , la base du second solide doit être plus grande que celle du premier, en même raison. Ne peut-on donc pas supposer que les globules élastiques qui remplissent le premier solide, deviennent un peu sphéroïdaux, lorsqu'ils viennent remplir le second, & que leur diamètre diminue un peu dans le sens  $NM$ , & augmente un peu dans le sens  $Mm$ ?

Au reste, cette hypothèse sur la figure & l'élasticité des parties du Fluide ( que je ne donne encore une fois que comme une légère conjecture, ) n'a rien de contraire à l'expérience par laquelle on trouve que l'eau est incompressible. En effet, une boule d'ivoire, par exemple, à qui la moindre percussion fait changer de figure, ne peut être comprimée par la pression la plus considérable qu'on puisse imaginer.

## S C O L I E IV.

19. Si la hauteur  $NM$  du Fluide n'est pas petite par  
d iij,

rapport au rayon  $CM$ , alors on ne peut plus supposer que la vitesse horizontale des points  $N$  &  $M$  soit la même : en effet, ce n'est que dans le cas où l'arc  $Mm$  ne diffère pas sensiblement de l'arc concentrique décrit du rayon  $Cn$ , qu'il est permis d'admettre que la force qui fait équilibre en  $M$  avec les colonnes  $NM, nm$ , est égale à la force qui fait équilibre en  $n$  avec la gravité. Dans tous les autres cas, la force accélératrice des points  $N$  &  $M$  n'est pas la même, puisque les forces accélératrices des points  $N$  &  $M$ , ne sont autre chose que l'excès dont la force  $\frac{\varphi z \sqrt{rr - zz}}{rr}$  surpasse les forces qui sont équilibre avec la pesanteur; par conséquent la vitesse horizontale de ces points ne doit pas être la même.

## S C O L I E V.

20. (\*) On nous objectera peut-être, que les vitesses horizontales des points  $M$  &  $N$ , peuvent au moins être entr'elles comme les rayons  $CM, CN$ , dans le cas où  $GP$  n'est pas petite par rapport à  $CP$ . Si cela étoit, les points  $N$  &  $M$  auroient la même vitesse horizontale *angulaire*, & on pourroit avec facilité déterminer leur mouvement. Pour lever entièrement cette difficulté; nous allons démontrer que les vitesses horizontales des points  $N$  &  $M$  ne sont point exactement entr'elles, comme les rayons  $CN, CM$ , dans le cas où  $GP$  est fort petite par rapport à  $CP$  : d'où il sera facile de conclure

que ces vitesses ne font pas entr'elles comme les rayons dans les autres cas.

La force suivant  $NA$ , est  $\frac{\varphi x x}{r r}$  entant qu'elle agit suivant  $CN$ . Donc les parties de la colonne  $NM$  font toutes animées par une force  $= p - \frac{\varphi x x}{r r}$  : de plus, un point quelconque  $O$  est mû suivant  $OM$  (art. 17) par

une force  $= \frac{\varphi \left( \frac{r}{3} - \frac{x x}{2 r} \right) \phi_1}{r r} \times \frac{OM}{MN} \times \frac{m \mu}{M m}$ . Donc faisant  $MO = x$ , il est évident que le poids du point  $O$  vers  $x$ ,

fera  $p - \frac{\varphi x x}{r r} - \frac{\varphi \phi_1 \left( \frac{r}{3} - \frac{x x}{2 r} \right)}{r r} \times \frac{x}{r} \times \frac{m \mu}{M m}$ . Donc le poids de la colonne  $OM = p x - \frac{\varphi x x x}{r r} -$

$\frac{3 \varphi \left( \frac{r}{3} - \frac{x x}{2 r} \right) x x \cdot m \mu}{r r \cdot M m}$ ; & le poids total de la colonne  $IM$ ,

fera  $p \cdot IM - \frac{\varphi x x x}{r} - \frac{3 \varphi x x \cdot m \mu \left( \frac{r}{3} - \frac{x x}{2 r} \right)}{r r \cdot M m}$ . Donc la diffé-

rence entre le poids de deux colonnes voisines, est  $p d(NM) - \frac{2 \varphi x d x \cdot x}{r r} + \frac{3 \varphi x x \cdot m \mu \cdot x d x}{M m \cdot r^2}$ . Or si les points

$N$  &  $M$  avoient la même vitesse angulaire, la force ac-

céleratrice du point  $M$  feroit  $\frac{\varphi x \sqrt{r r - x x}}{r r} \times \frac{CM}{CN} \times \frac{m \mu}{M m}$ ;

& la force qui devoit faire équilibre avec la gravité,

seroit  $\frac{\phi z \sqrt{rr-zz}}{rr} \times \frac{r-1}{r} \times \frac{M\mu}{Mm}$ ; cette force étant multipliée par  $Mm = \frac{r dz - 1 dz}{\sqrt{rr-zz}}$ , devroit être égale à la différence de poids des deux colonnes voisines  $IM$ ,  $i\mu$ ; or on a  $p d(NM) = \frac{\phi z dz \cdot M\mu}{r \cdot Mm}$ . C'est pourquoi il faudroit qu'on eût  $\frac{M\mu}{Mm} \times -\frac{2\phi z dz}{rr} = \frac{3\phi z z \cdot m\mu r dz}{Mm \cdot r^2} - \frac{2\phi z dz}{rr}$ . Ce qui est impossible.

Si outre la force suivant  $NA$ , il y a une force suivant  $NC$ , qui soit proportionnelle à la distance du point  $N$  au point  $C$ , ce qui doit être en effet (*Princ. Math. I. 1. Prop. 66.*) lorsque la force suivant  $NA$  vient de l'action d'un corps fort éloigné, qui agit sur la masse  $DCG$ ; dans ce cas il sera facile de démontrer que les points  $N$  &  $M$  n'auront pas la même vitesse angulaire. Car comme l'expression de la force suivant  $NC$ , ne contient ni  $z$ , ni  $Mm$ , ni  $M\mu$ , ni  $m\mu$ ; il est évident que l'équation, qui dans le cas précédent n'a pu avoir lieu, & qui conserve encore dans ce cas-ci, les quantités  $\frac{M\mu}{Mm} \times -\frac{2\phi z dz}{rr}$ , &  $\frac{3\phi z z \cdot m\mu \cdot z dz}{Mm \cdot rr} - \frac{2\phi z dz}{rr}$ , ne pourra pas non plus avoir lieu dans l'hypothèse présente. Donc &c.

## S C O L I E VI.

21. Si la force que nous avons supposée agit suivant  $nA$  (Fig. 3) agissoit suivant  $nB$  parallèle à  $CG$ , & étoit proportionnelle

proportionnelle au Sinus de l'angle  $NCE$ , ou au Cosinus de l'angle  $NCG$ , alors il n'y auroit d'autre changement à faire dans les calculs précédens, que de mettre  $-\phi$  pour  $\phi$ ,  $\phi$  exprimant la force suivant  $CG$  en  $G$ ; en effet, la force qui sollicite alors les points  $M$  &  $N$  au mouvement dans le sens horizontal, est  $-\frac{\phi z \sqrt{rr - zz}}{rr}$ .

Dans ce cas, le grand axe de l'Ellipse  $gnd$  fera  $Cg$ , le petit axe fera  $Cd$ ; & les lignes  $Gg$ ,  $Dd$ ,  $Mm$ ,  $Nn$ ,  $NI$ , &c. deviendront négatives, tout le reste demeurant comme ci-dessus.

[ Il faut seulement remarquer, que si on vouloit alors résoudre le Problème de l'art. 5, on trouveroit que la partie de la surface  $PE$  (Fig. 4) qui peut être à découvert, ne devoit point être prise depuis le point  $P$  jusqu'en  $g$ , comme dans l'art. 5; mais depuis le point  $E$  jusqu'à quelque autre point qui fût entre  $E$  &  $P$ : soit  $O$  ce point; si on nomme  $OL$ ,  $z'$ , on aura l'équation

$$2zrr = \frac{\phi}{p} \times [rz'z' - \frac{z^3}{3} + \frac{z}{3}(rr - z'z')^{\frac{3}{2}} = \frac{\phi}{p} \times$$

$[r \cdot (OC^2 - CL^2) - \frac{z}{3} \times (CO^2 - CL^2)]$ ; équation du troisième degré, d'où l'on tirera la valeur de  $CL$ .]

PROPOS. IV. LEMME.

22. Soit un Spherode Elliptique, engendré par la révolution d'une demi Ellipse  $gdK$  (Fig. 9) autour de son petit axe  $gK$ ; je dis 1°. que l'attraction que la masse du Fluide

c

exerce en un point quelconque  $n$  suivant  $nR$ , sera égale à l'attraction qu'exerceroit sur le point  $S$  un Spherode semblable au Spherode  $gdK$ , & de même densité, dont le petit axe seroit  $2CS$ , & le centre  $C$ . 2°. Que l'attraction que le même point  $n$  souffre suivant  $nS$ , est égale à l'attraction qu'exerceroit sur le point  $R$  un Spherode semblable au Spherode  $gdK$ , & de même densité, dont le grand axe seroit  $2CR$ , &  $C$  le centre.

Cette proposition a été démontrée par *M. Mac-Laurin* dans son excellente Dissertation sur le Flux & Reflux de la mer. (Paris 1741.)

## C O R O L L. I.

23. On aura donc l'attraction en  $n$ , si on détermine la quantité des attractions en  $R$  & en  $S$ , produites par les Spherodes dont nous venons de parler. Or la première de ces attractions (*Cor. 3. Prop. 91. l. 1. Princ. Math.*) est à l'attraction en  $d$ , comme  $CR$  à  $Cd$ ; la seconde est à l'attraction en  $g$ , comme  $CS$  à  $Cg$ . Donc la question se réduit à trouver les attractions en  $g$  & en  $d$ .

## C O R O L L. II.

24. Afin de rendre le calcul plus simple, nous supposons que l'Ellipse  $gdK$  diffère peu d'un cercle. Cela posé; pour déterminer la quantité de l'attraction en  $g$ , soit  $Cg$  ou  $C\delta = R$ ,  $\frac{\delta^2}{Cg} = \frac{\pi}{R}$ ;  $gS = x$ ;  $2n$  le rapport de la circonférence au rayon;  $\delta$  la densité du Spherode

de, ou le rapport de la masse au volume : on fait que l'attraction de la Sphère en  $g$ , est  $\frac{4nR^3}{3} \times \frac{1}{R^2} = \frac{4nR}{3}$ ;

Pour avoir l'attraction du Sphéroïde, il faut ajouter à cette quantité, ce que devient  $\int \frac{2ndx \cdot d \cdot x \cdot (2Rx - xx) \cdot a}{(2Rx)^{\frac{1}{2}} \cdot R}$ ,

lorsque  $x = 2R$ , c'est-à-dire  $\frac{16na^3}{15}$ . Ainsi l'attraction en  $S$  suivant  $SC$ , ou en  $n$  suivant  $nR = \frac{CS}{Cg} \times (\frac{4nR}{3} + \frac{16na^3}{15})$ .

À l'égard de l'attraction en  $d$ ; pour la trouver, nous remarquerons avec M. *Daniel Bernoulli*, que les sections du Sphéroïde perpendiculaires à  $Cd$ , sont des Ellipses semblables à la génératrice, & dont le rapport avec leurs cercles circonscrits, est  $\frac{1}{1 + \frac{a}{R}} = 1 - \frac{a}{R}$  à très-peu

près. C'est pourquoi si on fait  $Rd = x$ ; on trouvera que l'attraction en  $d$  est égale à l'attraction du globe circonscrit au Sphéroïde, c'est-à-dire  $\frac{4n^3}{3} \times (R + a)$ , moins

ce que devient  $\int \frac{ndx \cdot ax^2 \cdot (2Rx - xx)}{(2Rx)^{\frac{1}{2}} \cdot R}$  lorsque  $x = 2R$ ;

c'est-à-dire  $\frac{8na^3}{15}$ . Donc l'attraction en  $n$  suivant  $nS =$

$$\frac{CR}{Cg} \times (\frac{4n^3R}{3} + \frac{12na^3}{15}) = \text{à peu près } \frac{CR}{Cg} \times \frac{4n^3R}{3} - \frac{a \cdot CR}{R \cdot Cg} \times$$

e ij

$\frac{4n\delta R}{3} + \frac{CR}{Cg} \times \frac{13na\delta}{15}$ . Donc,  $z$  étant le Sinus de l'angle  $gCn$ , &  $r$  le Sinus total, l'attraction qui agit sur le point  $n$  perpendiculairement à  $Cn$ , fera  $\frac{CR \cdot CS \cdot a}{Cg^2 \cdot R} \times \frac{4n\delta R}{3} + \frac{4na\delta}{15} \times \frac{CS \cdot CR}{Cg^2} = \frac{z\sqrt{rr-zz}}{rr} \times \frac{4n\delta R}{3} \times \frac{6a}{5R}$ .

## COROLL. III.

25. Donc l'attraction du Sphéroïde, entant qu'elle agit sur le point  $n$  perpendiculairement à  $Cn$ , est, toutes choses d'ailleurs égales, comme la différence  $a$  des axes.

## SCOLIE.

26. Si le Sphéroïde étoit allongé, alors  $a$  seroit négative, & l'attraction qui agiroit sur le point  $n$  perpendiculairement à  $Cn$ , seroit dirigée vers le côté  $gC$ .

## PROPOS. V. LEMME.

27. Les mêmes choses étant posées que dans l'article 11, si par un point  $\gamma$  (Fig. 5) de la petite ligne  $Gg$  on décrit une courbe  $\gamma Id$ , telle, que l'on ait par-tout  $Nn : NI :: Gg : G\gamma$ ; je dis, que cette nouvelle courbe  $\gamma Id$ , sera une Ellipse dont la différence des axes sera à  $a$ , comme  $G\gamma$  à  $Gg$ .

Car puisque  $Cn = Cg + \frac{azz}{rr}$ , &  $nI = \frac{Nn \times G\gamma}{Gg}$  =  
 $\frac{(Cg + gG - Cn) \times G\gamma}{Gg} = (gG - \frac{azz}{rr}) \times \frac{G\gamma}{Gg} = g\gamma - \frac{azz \cdot G\gamma}{rr \cdot Gg}$ ;

on aura  $CI - C\gamma = Cg + \frac{axz}{rr} + g\gamma - \frac{axz}{rr} \times \frac{zy}{Gg} - Cg -$   
 $g\gamma = \frac{axz}{rr} \times \frac{G\gamma}{Gg}$ . Donc  $C\delta - C\gamma = \frac{a \cdot G\gamma}{Gg}$ . Ce Q. F. D.

PROPOS. VI. PROBLÈME.

28. On demande le mouvement du Fluide GDEP, (Fig. 5) en supposant que les particules du Fluide & du Globe s'attirent mutuellement, tout le reste demeurant comme dans la Propos. 3.

1°. L'attraction que le Globe & le Fluide exercent sur le point  $n$  perpendiculairement à  $Cn$ , doit être la même, que si le globe solide étoit homogène, & d'une densité  $\delta$  égale à celle du Fluide, parce que l'attraction du globe perpendiculairement à  $Cn$ , est nulle.

2°. Pour trouver la courbure  $gnd$  que doit avoir le Fluide, afin de rester en équilibre, il faut écrire dans les calculs de l'art. 2 & des suivants, jusqu'au 12, la quantité  $\phi + \frac{4n\delta \cdot 6a}{3 \cdot 5}$ , au lieu de  $\phi$ ; & si on fait  $CP = \rho$ , & qu'on sup-

pose  $\frac{4n\Delta\epsilon}{3}$  égale à l'attraction du globe suivant  $nC$ , on au-

$$ra \phi + \frac{4n\delta \cdot 6a}{3 \cdot 5} = \phi + \frac{6a}{5r} \times \rho \times \left( \frac{4n\delta r}{4n\delta r - 4n\delta\epsilon + 4n\Delta\epsilon} \right).$$

$$\text{Donc la ligne } a = \frac{r}{2} \times \left( \frac{\phi}{\rho} + \frac{4n\delta \cdot 6a}{5(4n\delta r - 4n\delta\epsilon + 4n\Delta\epsilon)} \right).$$

$$= \frac{\phi r}{2\rho} \cdot \left( 1 - \frac{3n\delta r}{5(n\delta r - n\delta\epsilon + n\Delta\epsilon)} \right).$$

3°. On aura par conséquent le mouvement du Fluide, si dans les calculs de l'*art.* 12 & des suivans, on met au lieu de  $\phi$  la quantité  $\phi : (1 - \frac{3n\delta r}{5(n\delta r - n\delta c + n\Delta c)})$  qui peut se réduire à  $\frac{\phi}{1 - \frac{3\delta}{5\Delta}}$ , parce que  $r$  est presque  $= c$ .

En effet, le complément de l'angle en  $I$  ou  $i$  étant au complément de l'angle en  $n$ , comme  $G\gamma$  à  $Gg$ , ou comme  $M\mu$  à  $Mm$ ; & la force qui fait équilibre en  $n$  avec la gravité étant  $\frac{\phi z \sqrt{[rr - zz]}}{rr (1 - \frac{3\delta}{5\Delta})}$ ; la difficulté se ré-

duit à prouver que la force qui fera équilibre en  $i$ , sera  $\frac{\phi z \sqrt{[rr - zz]}}{rr (1 - \frac{3\delta}{5\Delta})} \times \frac{G\gamma}{Gg}$ . Or cette force a en effet une telle

valeur. Car la force qui agit sur le point  $n$  perpendiculairement à  $Cn$ , est composée de l'attraction perpendiculaire à  $Cn$ , & de la force  $\frac{\phi z \sqrt{[rr - zz]}}{rr}$ ; & la somme de

ces forces est  $\frac{\phi z \sqrt{[rr - zz]}}{rr (1 - \frac{3\delta}{5\Delta})}$ ; or l'attraction en  $n$  est à l'at-

traction en  $I$  ou  $i$ , (*art.* 25 & 27) comme  $Gg$  à  $G\gamma$ ;

de plus, la force  $\frac{\phi z \sqrt{[rr - zz]}}{rr}$  en  $n$  est à la force correspondante en  $I$  ou  $i$ , comme  $Gg$  à  $G\gamma$ . Donc la somme

de l'attraction en  $I$ , & de la force qui répond à la force  $\frac{\varphi z \sqrt{rr - zz}}{rr}$ , est  $\frac{\varphi z \sqrt{rr - zz}}{rr (1 - \frac{3\delta}{5\Delta})} \times \frac{G\gamma}{G\delta}$ . Ce  $Q. F. D.$

C O R O L L. I.

29. Donc, tout ce qui a été démontré depuis l'*art.* 2 jusqu'à l'*art.* 22, peut s'appliquer au cas, où l'on suppose que les parties du Fluide s'attirent. Il ne faudra qu'écrire  $\frac{\varphi}{1 - \frac{3\delta}{5\Delta}}$ , au lieu de  $\varphi$ .

S C O L I E G E N E R A L.

30. Si les surfaces  $PME$ ,  $GND$ , n'étoient point circulaires, mais seulement peu différentes d'un cercle; il faudroit pour trouver le mouvement du Fluide, faire les mêmes calculs que ci-dessus, pourvu que la surface  $GND$  fût telle, qu'elle fût en équilibre, abstraction faite de la force  $\varphi$ : les lignes  $NI$ ,  $Nn$ ,  $Gg$ ,  $G\gamma$ ,  $Mm$ ,  $M\mu$ , demeureroient toujours les mêmes; il n'y auroit que les complémens des angles en  $N$  & en  $I$  qui seroient augmentés ou diminués d'une quantité égale au complément de l'angle  $GNC$ . Mais aussi les forces qui feroient équilibre en  $i$  & en  $n$  avec la gravité, feroient diminuées ou augmentées de la force qui agit en  $N$  perpendiculairement à  $CN$ , & qui doit toujours être proportionnelle au complément de l'angle  $GCN$ , puisque

la surface  $GND$  (*hyp.*) est en équilibre. Cette observation a lieu, tant pour le système de la pesanteur vers un centre, que pour le système de l'attraction des parties de la matière; tout cela n'a pas besoin, ce me semble, de démonstration: cependant on pourra la trouver aisément par les principes que nous établirons plus bas (*a*).

## COROLL. II.

31. (\*) La différence des axes, dans le cas de l'attraction des parties, étant  $\frac{er}{2p(1 - \frac{3\delta}{5\Delta})}$ ; il est évident que cette

différence peut être très-considérable par rapport à  $r$ , lorsque  $\frac{e}{2p(1 - \frac{3\delta}{5\Delta})}$  n'est point une petite quantité;

que cette différence peut même devenir infinie, si  $3\delta$  est égal à  $5\Delta$ ; mais il faut remarquer que dans les cas où  $\alpha$  n'est pas fort petite par rapport à  $r$ , les calculs de l'art. 28 ne peuvent plus avoir lieu, parce que dans ces calculs, on a supposé que  $\alpha$  fût très-petite par rapport à  $r$ .

Outre cela, si  $1 - \frac{3\delta}{5\Delta}$  est une quantité négative, alors la différence des axes devient négative, c'est-à-dire, le Sphéroïde devient allongé autour de l'axe  $CP$ , & les

---

(a) Voyez l'art. 62.

calculs des articles précédens peuvent encore s'appliquer à ce cas, pourvû que le Sphéroïde soit peu allongé.

Par-là on expliqueroit, pour le dire en passant, comment la Terre auroit pû être allongée par sa rotation autour de son axe. Il n'y auroit qu'à supposer qu'elle eût d'abord été sphérique, & composée de deux parties sphériques, l'une solide & l'autre Fluide, dont les densités  $\Delta$  &  $\delta$  eussent été entr'elles en moindre raison que 3 à 5.

J'avoue qu'il doit paroître assez singulier, que la force suivant  $NA$ , combinée avec l'attraction des parties, doive en certains cas abaisser le Fluide en  $D$  au lieu de l'élever. Mais pour peu qu'on y fasse d'attention, on remarquera qu'il y a une infinité de cas où  $Cd$  ne sauroit être le grand axe du Sphéroïde. Car puisqu'on a nécessairement  $a =$

$\frac{r}{2} \times \left( \frac{\phi}{p} + \frac{4n\delta \cdot 6a}{5(4n\delta r - 4n\delta\epsilon + 4n\Delta\epsilon)} \right)$ ; ou  $a = \frac{\phi r}{2p} + \frac{3n\delta}{5\Delta}$ ;  
il est évident que la quantité  $a$  ne peut être positive, à moins que  $\frac{3n\delta}{5\Delta}$  ne soit  $< a$ , c'est-à-dire, à moins que  $3\delta$  ne soit  $< 5\Delta$ .

Ainsi le rapport des densités  $\delta$  &  $\Delta$  peut être tel, 1<sup>o</sup>. que la plus petite force agissant suivant  $nA$ , soit capable d'élever considérablement le Fluide en  $D$ . 2<sup>o</sup>. Que cette même force soit capable de l'abaisser considérablement au même point  $D$ .

Si le noyau intérieur, que nous avons supposé jusqu'à présent sphérique, étoit un Sphéroïde Elliptique dont la demi différence des axes fut  $a'$ , en ce cas, imaginant

toujours la hauteur du Fluide très-petite par rapport à  $r$ , on trouveroit que l'attraction horizontale d'un point quelconque  $n$  du Fluide, seroit égale à  $\frac{zv' [rr - zz]}{rr} \times$

$\left[ \frac{4n^2}{3} \times \frac{6\alpha}{5} + \frac{4n\Delta - 4n^2}{3} \times \frac{6\alpha'}{5} \right]$  (†). D'où l'on tire

$$\alpha = \frac{r}{2} \times \left[ \frac{\phi}{p} + \frac{4n^2 \cdot 6\alpha + (4n\Delta - 4n^2) \cdot 6\alpha'}{5 \cdot 4n\Delta r} \right] = \frac{\frac{\phi r}{2p} + \frac{3\alpha'}{5} \left( \frac{\Delta - \delta}{\Delta} \right)}{1 - \frac{3\delta^2}{5\Delta}}$$

c'est pourquoi, lors même que le noyau intérieur est aplati, le Sphéroïde peut être allongé, si on a  $\alpha < \frac{3\delta^2}{5\Delta}$ ,

& si  $\phi + \frac{6p\alpha' \cdot (\Delta - \delta)}{5\Delta r}$  est positif. En général, soit que le

noyau intérieur soit aplati, ou qu'il soit allongé, c'est-à-dire, soit que  $\alpha'$  soit positif ou non, le Sphéroïde fluide extérieur sera aplati ou allongé, selon que les deux termes de la fraction précédente seront de même signe ou de signes différens. Donc si la Terre étoit un Sphéroïde allongé, il ne seroit pas absolument nécessaire d'avoir recours pour expliquer ce Phenomène, à un noyau intérieur allongé. Car il pourroit se faire que ce noyau fût aplati, & que la Terre fût allongée vers les Pôles.

[(†) Comme le Fluide est supposé avoir peu de hauteur, l'attraction du noyau sur une partie quelconque du Fluide est sensiblement la même, que si cette partie étoit immédiatement contiguë au globe.]

[Par exemple, si  $3\delta = 3\delta - f$ , on trouvera que  $a$  doit être  $= \frac{\frac{\varphi r}{2p} - \frac{a'}{5} (2 + \frac{f}{\Delta})}{\frac{-f}{5\Delta}}$ ; d'où l'on voit que  $\frac{\varphi}{p}$  étant

$\frac{1}{289}$ ,  $a$  sera négatif, si  $\frac{3a'}{5r} \times (2 + \frac{f}{\Delta})$  est moindre que  $\frac{1}{289}$ .

On remarquera, que si l'on a en même tems  $\varphi = 0$ ,  $a' = 0$  &  $3\delta = 5\Delta$ , la quantité  $a$  pourra être tout ce qu'on voudra; c'est-à-dire, que si la densité de la partie solide est à celle de la partie fluide, comme 3 à 5, le Fluide pourra rester en équilibre, ayant telle figure Elliptique qu'on voudra, pourvu que cette figure Elliptique ne s'écarte pas beaucoup d'un cercle, & qu'aucune autre force n'agisse sur le Sphéroïde que l'attraction mutuelle de ses parties. Il en sera de même, si  $3\delta = 5\Delta$  &  $\frac{\varphi r}{2p} + \frac{3a'(\Delta - \delta)}{5\Delta} = 0$ .

Au reste, il faut observer que la quantité  $a$  exprime la différence des rayons  $Cd$ ,  $Cg$ , & que cette différence n'est égale à celle des lignes  $Ed$ ,  $Pg$ , que dans le cas où  $a' = 0$ . Si on suppose que la force  $\varphi$  n'agisse point sur le Fluide; & que dans ce cas la surface  $GND$  soit en

équilibre, on aura  $CD - CG = \frac{\frac{3a'}{5} \times \frac{\Delta - \delta}{\Delta}}{1 - \frac{3\delta}{5\Delta}}$ ;  $ED -$

$PG = \frac{\frac{3a'}{5}}{5(\frac{3\delta}{5\Delta} - 1)}$ ; donc  $Dd + Gg = \frac{\frac{\varphi r}{2p}}{f ij}$ ,

précisément comme dans le cas où  $a'$  étoit  $= 0$  (art. 28). On trouvera aussi que la force parallèle au côté  $Mm$  du Sphéroïde solide, est par-tout  $\frac{0.25 [rr - zt]}{rr(1 - \frac{3\delta}{5\Delta})}$ ;

précisément comme dans le cas de la sphéricité: ce qui confirme de nouveau la remarque que nous avons déjà faite dans l'art. 30.

Il faut remarquer encore, que quand on suppose le noyau sphérique,  $\Delta$  exprime la densité d'un globe homogène, dont le rayon seroit  $r$  ou  $\rho$ , & dont l'attraction  $\frac{4\pi\Delta r}{3}$  seroit égale à celle du noyau; au lieu que quand on suppose le noyau Elliptique, les calculs précédens demandent qu'il soit homogène, & que  $\Delta$  exprime sa véritable densité.]

### C O R O L L. III.

32. (\*) De l'article précédent il s'ensuit, que si l'élevation des eaux en pleine mer, est bien connue, & que la force du Soleil ou de la Lune, ou la somme de ces deux forces soit connue aussi, on pourra toujours déterminer la relation qui doit être entre  $\delta$  &  $\Delta$ , pour que les eaux s'élevent à la hauteur observée. Il ne paroît pas qu'on puisse déterminer par un autre moyen le rapport de la densité  $\Delta$  à la densité  $\delta$ . Par-là on connoitra quelle seroit la pesanteur résultante de l'attrac-

tion d'un globe solide égal à la Terre en grosseur, & de la même densité que les eaux de l'Océan.

M. *Newton* trouve que l'élévation des eaux de la mer en vertu de l'action seule du Soleil, seroit d'environ deux pieds, en supposant tout le globe de la Terre fluide & homogène ; cet illustre Geomètre auroit trouvé cette hauteur beaucoup plus grande, s'il avoit supposé que la mer eût peu de profondeur par rapport au rayon de la Terre, par exemple  $\frac{1}{2}$  de mille, & que la densité des parties solides fût différente de celle de la partie fluide. Ainsi pour faire quadrer avec les observations la hauteur des eaux de la mer trouvée par la Théorie de l'attraction, il n'est point nécessaire d'avoir recours à l'hypothèse, que la Terre est composée d'une infinité de couches fluides de différentes densités ; hypothèse que nous examinerons d'ailleurs dans un moment (a) : il suffit de supposer que les parties solides de la Terre n'ont pas la même densité que l'eau de la mer.

## COROLLAIRE GENERAL.

33. On peut, par le moyen de tout ce qui a été démontré jusqu'ici, trouver aisément la vitesse & la direction du vent, en un endroit quelconque de la Terre, en supposant 1°. que l'air soit un Fluide homogène, rare, & sans ressort. 2°. Que la Terre qu'il environne de tous-

---

(a) Voyez l'art. 36.

côtés soit un globe solide, ou (*art. 30*) qu'elle diffère peu d'un globe. 3°. Que la Terre & l'air qui la couvre, tournent autour d'un même axe. 4°. Que le Soleil & la Lune n'ayent aucun mouvement par rapport à la Terre, & qu'ils agissent sur la masse de l'air en attirant ses parties.

On remarquera d'abord, que l'air étant supposé très-rare, l'attraction des parties de l'air ne produira aucun effet sensible, puisque la force  $\frac{\phi}{1 - \frac{\delta}{\Delta}}$  doit être censée

égale à  $\phi$ , lorsque  $\delta$  est fort petite par rapport à  $\Delta$ .

Maintenant, pour déterminer le vent que doit produire la rotation de la Terre, il faut observer que ce vent doit souffler alternativement du Nord au Sud, & du Sud au Nord, & que le tems d'une de ses oscillations dépend de la seule hauteur de l'air (*art. 13*).

Pour donner là-dessus un essai de calcul, nous supposérons que l'air étant homogène, ait 850 x 32 pieds de hauteur. En effet, l'air que nous respirons ici est environ 850 fois moins dense que l'eau, & le poids d'une colonne d'air entière = 32 pieds d'eau. Donc (*art. 13*) on aura le tems par  $Mm = \frac{nr}{4\sqrt{[3a]}} = 1^{\text{sec.}} \times$

$$\frac{180 \cdot 57060 \cdot 6}{4\sqrt{[3 \cdot 15 \cdot 850 \cdot 32]}}$$

parce qu'en faisant  $\theta = 1^{\text{sec.}}$ , on a  $a = 15$  pieds,  $nr = 180^{\text{degr. terr.}} = 180 \times 57060 \times 6$ : or

$$1^{\text{sec.}} \times \frac{180 \cdot 57060 \cdot 6}{4\sqrt{[3 \cdot 15 \cdot 850 \cdot 32]}} = 1^{\text{jour}} \times \frac{61624800}{4 \times 302276571} \times (3 + \frac{2}{6});$$

& le tems par  $Mm'$ , ou le tems d'une oscillation entière

$$= 2^{\text{jours}} \times \frac{61624800}{4 \times 302276571} \times \left(3 + \frac{1}{6}\right) = \text{environ 8 heures.}$$

Présentement, si on fait abstraction du mouvement de la Terre & de la force de la Lune, & qu'on cherche le vent qui doit résulter de la seule action du Soleil qu'on suppose demeurer fixe & immobile au-dessus d'un point quelconque  $D$  du globe; il est évident que le vent à chaque endroit soufflera toujours dans le plan d'un cercle qui passe par le Soleil & par le centre de la Terre, & que ce vent soufflera alternativement en sens contraires,

pendant un tems égal à  $2^{\text{jours}} \times \frac{61624800}{4 \times 302276571} \times \left(3 + \frac{1}{6}\right)$ .

Il en faut dire autant de l'action de la Lune.

Donc, si par les règles ordinaires, on réduit à un seul mouvement les trois mouvemens qui résultent de la rotation de la Terre autour de son axe, de la force du Soleil, & de celle de la Lune, on aura la direction & la vitesse absolue du vent pour chaque endroit. Car comme la figure de l'air est peu changée par l'action de chacune de ces trois forces, lorsqu'elles sont séparées, il s'ensuit que le mouvement qui résulte de ces trois actions prises ensemble, doit être à peu près le même que le mouvement composé qui résulteroit des trois mouvemens considérés séparément. De plus, il faut remarquer

1°. Que si l'action du Soleil & celle de la Lune est supposée commencer avec la rotation de la Terre, la direction du vent fera toujours dans une ligne droite,

& que le vent soufflera alternativement en sens opposés pendant le tems que nous venons de déterminer ; & qu'au contraire , si ces trois causes ne commencent pas à agir dans le même instant , la direction du vent variera continuellement.

2°. Que le tems des oscillations du vent ne dépend point de la grandeur de ces forces , quoiqu'elles influent sur la vitesse & sur la force absolue du vent.

[ Si on cherche par l'art. 13 quelle doit être la vitesse au point  $m$  ( Fig. 5 ), qui est le point de milieu d'une oscillation , on trouvera que cette vitesse est à  $\sqrt{[2pa]}$  ::  $\frac{\varphi r \sqrt{[rr - z z]}}{r}$  :  $2p\sqrt{[3at]}$ . Donc , lorsqu'elle est la plus grande qu'il est possible , elle sera à la vitesse  $\sqrt{[2pa]}$  , comme  $\varphi r$  à  $4p\sqrt{[3at]}$ . Or un corps pesant parcourt environ 15 pieds dans une seconde , & la vitesse qu'il a après avoir parcouru ces 15 pieds , est telle , qu'elle lui feroit parcourir uniformément 30 pieds dans le même tems : donc la plus grande vitesse que le Fluide puisse avoir , lui fera parcourir en une seconde ,  $30^{\text{pieds}} \times \frac{\varphi r}{4p\sqrt{[3at]}}$  : donc comme la hauteur de l'air doit être beaucoup plus grande que  $850 \times 32^{\text{pieds}}$  ; il s'ensuit que la plus grande vitesse de l'air fera beaucoup moindre que de  $30^{\text{pieds}} \times \frac{\varphi r}{4p\sqrt{[3at \cdot 850 \times 32]}}$  par seconde. Nous verrons dans l'article suivant , les conséquences qu'on peut tirer de cette formule.

Si

Si au lieu de supposer que la force  $\phi$  agisse sur une Sphère, on suppose qu'elle agisse sur une masse circulaire  $PEDG$  (Figure 3), on trouvera pour lors  $Mm = \frac{\phi r \sqrt{[rr - zz]}}{4p}$ , comme il est aisé de s'en assurer par le calcul, & la vitesse en  $m$  sera à la vitesse dans le cas de la Sphère, comme  $\sqrt{3}$  à  $\sqrt{2}$ . Ainsi la vitesse pour une masse circulaire sera plus grande que pour une masse sphérique. De-là on voit, comment il se peut faire que les montagnes augmentent la vitesse du vent, indépendamment de ce qu'elles rétrécissent le Canal dans lequel il doit se mouvoir. *Voyez l'art. 90.* ]

## R E M A R Q U E L.

34. Il ne faut pas manquer d'observer, qu'en supposant  $r = 850 \times 32$  pieds, la méthode précédente ne seroit pas absolument exacte, pour déterminer la vitesse du vent qui viendroit de la rotation de la Terre. En effet, pour que la méthode soit assez exacte, il faut (*art. 10*) que  $\frac{\phi r}{6sp}$  soit une quantité assez petite : or on a ici  $\phi =$

$$\frac{p}{289}; s = 32 \times 850 \text{ pieds} : r = 19695539; \text{ donc } \frac{\phi r}{6sp} =$$

$$\frac{19695539}{6 \cdot 289 \cdot 850 \cdot 32} = \frac{19695539}{47164800}; \text{ quantité qui n'est peut-être pas}$$

assez petite, pour que la solution puisse être regardée comme fort approchée.

[ Mais si au lieu de supposer la hauteur de l'air de  $850 \times 32$  pieds , on la supposoit avec M<sup>re</sup> Mariotte & de la Hire d'environ 15 lieues ou 184320 pieds, alors la plus grande valeur de l'espace  $Mm$ , ne seroit plus qu'environ  $\frac{1}{20}$  du rayon ; & l'expression de la vitesse du vent seroit alors plus exacte. Il est vrai que dans cette hypothese, l'air ne seroit pas homogene, comme nous l'avons toujours supposé jusqu'à présent. Mais je crois qu'on peut prendre ici sans beaucoup d'erreur la vitesse du vent pour la même, soit dans le cas de l'homogeneité de l'air, soit dans le cas où ses parties ont différentes densités. J'en donnerai la raison dans la suite de cette Dissertation. ]

A l'égard du vent qui résulte de l'action du Soleil, la méthode précédente le donnera fort exactement, même quand on supposeroit  $s = 850 \times 32$ . Car la force  $\phi$ , (†) comme il est aisé de le voir par les *Principes Mathematiques de la Philos. nat. l. 3. Prop. 66.* est  $\frac{15r}{d^2}$  ;  $S$  étant la masse du Soleil, &  $d$  sa distance au centre

(†) Ici & dans toute la suite de cette Dissertation, j'ai négligé entièrement la partie de la force Solaire qui agit suivant  $NC$  ; & qui (*Princ. Math. l. 3. Prop. 66.*) est  $\frac{s \cdot NC}{d^3}$  ; parce que cette force doit être regardée comme nulle par rapport à la gravité  $P$  ;  $NC$  étant presque égale à  $CP$ .

de la Terre. Or on a  $\frac{s}{d^2} : \frac{p}{289} :: \frac{d}{(365)^2} : \frac{r}{1}$ , parce que les forces centrales ou centrifuges, sont entr'elles en raison composée de la directe des rayons & de l'inverse des quarrés des tems périodiques. Donc  $\frac{15r}{d^2} = \frac{3p}{289 \cdot (365)^2}$ ; donc  $\frac{pr}{61p} = \frac{19695539}{2 \cdot 289 \cdot (365)^2 \cdot 850 \cdot 32}$ , quantité fort petite. A l'égard de la Lune, sa force, suivant M. *Newton*, n'est qu'environ quadruple de celle du Soleil (+): ainsi  $\frac{pr}{61p}$  est encore une fort petite quantité pour la Lune.

[ Si l'on vouloit savoir combien le vent auroit de vitesse en vertu de la rotation de la Terre, en supposant la hauteur de l'air de  $850 \cdot 32 \times 9$  pieds, qui est plus grande que la hauteur donnée par M. *Mariotte*, on trouveroit qu'il parcourroit en une seconde avec sa plus grande vitesse (art. 33) l'espace de  $\frac{19695539 \times 30 \text{ pieds}}{289 \cdot 4 \cdot \sqrt{[3 \cdot 15 \cdot 850 \cdot 32 \times 9]}}$

qui est  $> \frac{19695539 \times 30}{4 \times 289 \times 2 \times 4 \times 30 \times 6 \times 3} > 30 \times \frac{19695539}{290 \cdot 200 \cdot 100}$

[ (+) M. *Daniel Bernoulli* dans sa pièce sur le Flux & Reflux de la mer, prétend que le rapport des deux forces donné par M. *Newton* est trop grand; & il ne fait ce rapport égal qu'à  $\frac{5}{2}$ , ce qui rendroit  $\frac{pr}{61p}$  encore moindre pour la Lune. Quoiqu'il en soit, on peut au moins assurer que le rapport des forces Solaire & Lunaire, ne doit être exprimé que par un nombre assez petit, & cela nous suffit ici pour l'usage que nous en voulons faire. ]

g ij

> 90 <sup>pieds</sup>. Or, 1°. selon M. *Mariotte*, un vent capable de déraciner les arbres, ne fait qu'environ 22 pieds par seconde. 2°. Nous avons supposé ici la hauteur de l'air beaucoup plus grande que ne l'a fait M. *Mariotte*, & par-là nous avons encore diminué la vitesse du vent. 3°. Nous avons supposé que l'air étoit homogène, & uniformément répandu dans tout l'espace qu'il occupe. Or si on imagine que les parties inférieures soient plus denses que les supérieures, comme elles le sont en effet, le mouvement total de la masse de l'air doit rester à peu près le même, & ce mouvement doit se partager de telle sorte, que les parties inférieures aient plus de vitesse que les parties supérieures; on en verra la raison dans la suite: cela vient en général de ce que les parties inférieures étant plus denses, la partie qui est détruite dans la force attractive qui les anime, doit être moindre que celle qui est détruite dans les parties supérieures; car pour qu'il y ait équilibre, il faut que la partie de la force accélératrice qui est détruite dans chaque couche, soit d'autant moindre que cette couche est plus dense. (*Voyez l'art. 76.*): donc la partie restante de la force attractive, & employée à mouvoir chaque couche, sera d'autant plus grande que cette couche sera plus dense, ou plus près de la Terre. De toutes ces observations combinées il résulte, que la vitesse du vent en vertu de la rotation de la Terre, devoit être énorme. On verra dans l'*art. 37*, pourquoi ses effets ne sont pas à beaucoup près si considérables qu'ils le devoient être suivant ce calcul.

*SUR LA CAUSE GENERALE DES VENTS.* 53

A l'égard de la vitesse du vent qui peut résulter de l'action du Soleil, on trouvera, qu'en supposant la hauteur de l'Atmosphère de  $850 \times 32$  pieds, elle ne seroit

que de  $\frac{3 \cdot 19605539 \times 20^{\text{pieds}}}{2 \cdot 289 \cdot (365)^2 \cdot 4 \cdot [3 \cdot 15 \cdot 850 \cdot 32]}$ , qui est une quantité très-petite. D'où il faut conclure, que si le Soleil étoit en repos, le vent que son action pourroit produire sur la Terre ne seroit point sensible; on verra dans la suite quel doit être le vent produit par le Soleil, lorsqu'on suppose cet astre en mouvement.]

*R E M A R Q U E I I.*

35. Dans la supposition que le Soleil seul agisse, la plus grande différence entre le poids de deux colonnes d'air éloignées l'une de l'autre de 90 degrés, est (art. 9)

$\frac{3S r^2 \delta}{2 d^3}$ , en supposant que  $\delta$  soit la densité de l'air voisin de la Terre; par conséquent cette différence est égale à  $\frac{3P \cdot (19605539) \times \delta}{2 \cdot 289 (365)^2}$ . Or la densité du Mercure étant à celle de l'air que nous respirons, comme  $850 \times 14$  à 1, il s'ensuit que la quantité  $\frac{3P \cdot (19605539) \times \delta}{2 \cdot 289 \cdot (365)^2}$  est au poids de

27 pouces de Mercure, comme  $\frac{19605539 \times 3}{2 \cdot 289 \cdot (365)^2}$  est à  $\frac{27}{12} \times 850 \times 14$ . Donc la différence cherchée est égale au poids d'un pouce de Mercure, multiplié par la fraction

g iij

$\frac{16 \times 10695539}{2 \cdot 289 \cdot (365)^2 \cdot 850 \times 14}$ ; c'est-à-dire qu'elle est égale au poids

de  $\frac{709039404}{6878200 \times 119985}$  parties d'un pouce de Mercure; quan-

tité trop petite pour pouvoir être sensible. Il faut remarquer encore, que la plus grande différence entre le poids de deux colonnes éloignées l'une de l'autre de

90 degrés, est toujours égale à  $\frac{3Sr^2 \cdot d^2}{2d^2}$ , soit que l'air soit

homogene, ou composé de couches de différente densité, & d'une hauteur quelconque; ainsi on peut déjà assurer en général, que l'action du Soleil & celle de la Lune, quand on les suppose en repos, ne doit produire aucun effet sensible sur le Barometre.

[ Si on cherche quelle devrait être la variation du Barometre en vertu de la rotation de la Terre, on la trouve-

ra de  $\frac{19695539 \times 12}{2 \cdot 289 \cdot 850 \cdot 14}$  pouces de Mercure; quantité très-

considérable: on demandera sans doute, pourquoi un changement qui devrait être si remarquable, ne s'observe pas journellement? Cela vient 1°. de ce que les balancemens de l'Atmosphere causés par la rotation de la Terre doivent avoir cessé depuis long-tems, & de ce que l'Atmosphere doit avoir acquis depuis plusieurs siècles la figure permanente que la rotation de la Terre a dû lui donner. 2°. On peut en apporter une autre raison. Si la surface de la Terre *PME* étoit sphérique, la figure permanente de l'Atmosphere seroit telle, que

le Barometre devoit être considérablement plus haut en *E* qu'en *P*. Mais la surface solide de la Terre est Elliptique, & telle que la force centrifuge combinée avec la pesanteur, pousse les corps pesans dans une direction perpendiculaire à cette surface. Supposant donc que la Terre & l'Atmosphere tournent autour d'un même axe, il est facile de voir que dans le cas de l'équilibre, on aura la colonne *Ed* égale à la colonne *Pg*; donc la hauteur du Barometre sera la même en *P* & en *E*, au moins sensiblement.

Si on veut savoir quel est le rapport de l'espace que le vent peut parcourir dans une seconde, à la variation du Barometre, on trouvera que ce rapport est celui de  $30 \times 850 \times 14$  à  $2\sqrt{[3 \cdot 15 \cdot 1]}$ . Ainsi une force capable de faire parcourir au vent *n* pieds, ou  $12 \times n$  pouces dans une seconde, feroit varier le Barometre de

$\frac{2 \times 12n \times \sqrt{[3 \cdot 15 \cdot 1]}}{850 \cdot 14 \cdot 30}$  pouces. Supposant donc  $s = 850 \times$

$32$  &  $n = 10$ , on trouveroit qu'une force capable de faire parcourir au vent 10 pieds par seconde, produiroit dans le Barometre des balancemens très-sensibles.

Si l'on vouloit que la densité de l'air fût à celle de l'eau, comme 1 à *m*, en ce cas il faudroit au lieu de  $850 \times 32$ , mettre  $m \times 32$  & au lieu de  $850 \times 14$ , il faudroit mettre  $m \times 14$ ; & la quantité précédente se changeroit en  $\frac{2 \cdot 12n \sqrt{[3 \times 15 \times 32]}}{\sqrt{m} \cdot 14 \cdot 30}$ , qui seroit d'autant moindre que l'air seroit supposé moins dense.

On verra dans la suite quel doit être le rapport entre la vitesse du vent & la variation du Barometre, lorsqu'on suppose le Soleil & la Lune en mouvement.

Au reste, il n'est pas inutile d'observer que  $\frac{e r}{2 p}$  n'exprimant (*art. 9*) que la différence de poids des colonnes  $Ed$ ,  $Pg$ , cette quantité n'exprime proprement que la moitié de la variation que doit avoir le Barometre durant les oscillations de l'air, dans les hypotheses précédentes. Car, comme on l'a déjà remarqué *art. 13*, lorsque le Fluide est parvenu dans la situation  $gnd$ , il doit passer au-delà de ce terme d'équilibre, & la ligne  $Pg$  doit se raccourcir encore d'une quantité égale à  $Gg$ , tandis que la ligne  $Ed$  s'allongera d'une quantité égale à  $Dd$ . Donc la variation du Barometre, sera comme  $2(Dd + Gg)$  égale à  $\frac{e r}{p}$  : mais cette remarque n'empêche pas les propositions précédentes d'être exactes.]

### R E M A R Q U E III.

36. Le célèbre M. *Daniel Bernoulli*, dans son excellent Traité du Flux & Reflux de la mer, explique d'une manière bien différente, pourquoi l'action du Soleil & de la Lune ne produit aucun effet sensible sur le Barometre. Suivant le calcul de ce savant Geometre, l'action seule du Soleil devoit produire sur le Barometre, une différence de plus de 20 lignes, si l'air n'étoit pas

pas un Fluide élastique. Mais comme l'air est élastique, sa pression, dit cet illustre Auteur, doit être égale dans tous les endroits de la Terre. Ainsi l'action du Soleil & de la Lune ne doit point changer sensiblement la hauteur du Mercure dans le Barometre.

Mais, en premier lieu, il ne me paroît pas évident que l'Elasticité de l'air doive produire une pression égale sur toutes les parties de la Terre. En effet, pour qu'un Fluide Élastique, dont les parties sont tirées par exemple suivant *NA* (Fig. 3), soit en équilibre, il suffit, ce me semble, que la pression en un point quelconque *M* soit égale au ressort de la particule *M*; de même que dans l'Athmosphère dont les couches se condensent les unes les autres, il suffit que la réaction d'une couche quelconque ou vertu de son ressort, soit égale au poids qui la comprime, sans qu'il soit nécessaire, que la pression soit par-tout la même. 2°. On peut au moins douter, si lorsque l'air est agité par le Soleil, cette pression peut se répandre assez promptement sur toute la surface de la Terre, pour être tout-d'un-coup égale en tous lieux. Si donc on s'en rapporte aux calculs de *M. Daniel Bernoulli*; il ne doit pas paroître impossible que le Barometre ne soit sujet chaque jour à des variations considérables. 3°. Si ce grand Geomètre étoit parti d'une autre hypothèse, que celle sur laquelle il a fait ses calculs, peut-être n'auroit-il pas eu besoin d'avoir recours au ressort de l'air, pour expliquer le Phenomene en question. Qu'on nous permette ici quelques réflexions sur l'Analyse de ce

favant Auteur ; elles sont nécessaires pour nous faire mieux entendre.

M. Daniel Bernoulli fait d'abord la même hypothèse que nous ; il suppose (*Ch. IV. art. II. n. IV.*) que la Terre est un globe solide composé d'une infinité de couches solides & sphériques, dont chacune est homogène, mais diffère des autres par sa densité. Il imagine ensuite que le globe terrestre est couvert d'un Fluide homogène, qui ait peu de hauteur par rapport au rayon de la Terre ; il prend donc le noyau sphérique  $GbH$  (Fig. 10) pour immuable, & suppose que la seule partie  $GBHbG$  change de figure par l'action du Soleil : il résout ensuite son Problème, en remarquant que le Fluide des canaux  $GC, BC$ , doit être en équilibre. Faisant donc  $AC = a$ ,  $GC = c$ ,  $Bb = \epsilon$ ,  $Cp$  ou  $Cn = x$  ;  $po$  ou  $nm = dx$ , la densité variable en  $p$  ou en  $n = m$ , la densité uniforme du Fluide  $GBHbG = \mu$  ; la gravitation en  $C$  vers le corps  $A = g$ , la force accélératrice que le globe exerce en  $b$  ou  $G = G$ , la même force pour les points  $o$ , &  $m = Q$  ; il trouve le poids de la colonne  $BC = \mu \epsilon G + \int Q m dx - \frac{\int x g m x dx}{a} - \frac{\int 2 n \mu \epsilon m x dx}{15 b}$ , & le poids de la

colonne  $GC = \int Q m dx + \frac{\int g m x dx}{a} + \frac{\int 4 n \mu \epsilon m x dx}{15 b}$  :

D'où il conclut

$$\epsilon = \frac{\int x g b m x dx}{5 \mu G a b - \int 4 n \mu a m x dx}$$

Ainsi, la quantité  $\epsilon$ , doit, selon lui, être en raison in-

verse de  $\mu$ , tout le reste d'ailleurs égal ; c'est-à-dire, que  $\epsilon$  doit être en raison inverse de la densité du Fluide  $GBHbG$  : ce qui est fort différent du résultat que nous devrions trouver par nos principes dans cette hypothese.

Pour le faire voir, supposons qu'on n'ait aucun égard à l'attraction des parties de la matiere ; dans ce cas, les quantités  $-\frac{\int 8n\zeta\mu m x dx}{15b}$  &  $\frac{\int 4n\mu\zeta m x dx}{15b}$  devroient être effacées des calculs précédens ; & supposant la pesanteur en raison inverse du quarré des distances, on auroit

$$\epsilon = \frac{3 \int g m x dx}{\mu G a}.$$

D'où l'on voit, que si on n'avoit point d'égard à l'attraction, la quantité  $\epsilon$ , suivant les calculs de M. *Daniel Bernoulli*, devroit être encore en raison inverse de  $\mu$ . Or suivant notre calcul de l'*art. 2*, la différence  $\frac{e'}{2p}$  des axes ne dépend point de la densité du Fluide  $GBHbG$ . D'où peut donc provenir le peu d'accord de notre résultat avec celui de l'illustre Auteur dont il s'agit ? Voici, si je ne me trompe, quelle en est la raison.

M. *Daniel Bernoulli* considère la partie  $GbH$  comme solide ; or dans cette hypothese, il me semble qu'on ne doit point supposer l'équilibre entre les Canaux entiers  $BC$  &  $GC$ , dont les parties  $CG$ ,  $bG$ , se font équilibre, pour ainsi dire, par leur solidité seule, soit qu'elles aient précisément le même poids, ou non. Il ne doit y avoir véritablement d'équilibre que dans la seule partie Fluide

h ij

homogene  $GBHbG$  ; car il n'y a que cette partie qui puisse faire changer la figure du Globe. Or si on n'a point d'égard à l'attraction, on trouvera comme dans l'art. 2.

$Bb = \frac{\varphi r}{2p}$  ; & si on a égard à l'attraction, on trouvera que

la différence des axes est  $\frac{\varphi r}{2p(1 - \frac{3\delta}{5\Delta})}$  : cette quantité

ne fuit point la raison inverse de  $\delta$  ; mais elle est d'autant plus grande que  $\delta$  est plus grand, si  $1 > \frac{3\delta}{5\Delta}$ , & si  $3\delta > 5\Delta$ , elle est d'autant plus petite, prise négativement, que  $\delta$  est plus grand.

Si on veut maintenant que la partie  $GbH$  soit Fluide, alors on ne peut point supposer que les couches  $mo$ ,  $pn$ , soient circulaires & concentriques : car toutes les couches de différente densité dont le Fluide est composé, doivent changer de figure ; ainsi la différence des axes ne sera pas  $Bb$ , puisqu'alors  $Cb$  fera plus grand que  $CG$ .

Or je dis, 1<sup>o</sup>. que n'ayant point égard à l'attraction des parties, cette différence sera la même, que si le globe étoit formé d'un seul Fluide homogene d'une densité quelconque ; car soit  $GB$  (Fig. 11) la courbûre que le Fluide doit prendre dans ce dernier cas, où le globe est entièrement homogene, & soient  $PO$ ,  $NM$ ,  $nm$ , les courbes auxquelles la pression du Fluide est perpendiculaire : il est évident que  $Nn$  fera en équilibre avec

*Mm*; donc qu'on augmente ou qu'on diminue la densité du Fluide contenu dans l'espace *NMmn*, l'équilibre ne fera point troublé pour cela: & comme on en peut dire autant du Fluide contenu dans les autres espaces, il s'ensuit que le Fluide *GBG* conservera toujours la même figure, soit qu'il soit homogène, ou non, pourvu qu'on n'ait point d'égard à l'attraction des parties.

Donc la différence  $\epsilon$  des axes ne paroît pas devoir dépendre de la loi des densités des différentes parties du globe, au moins dans le cas où l'on n'a point d'égard à l'attraction. Néanmoins suivant la formule

$$\epsilon = \frac{3 \int g m x dx}{\mu G a}$$

que nous avons déduite de celle de *M. Bernoulli*, on voit que la quantité  $\epsilon$  devrait dépendre des densités. Ainsi il me semble qu'on peut douter si la formule de *M. Bernoulli* est exacte, soit pour le cas où le globe est entièrement Fluide, soit pour le cas où il est en partie Fluide, & en partie solide.

Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de chercher quelle figure le globe devrait avoir, en le supposant entièrement Fluide & composé de parties différemment denses, & en ayant de plus égard à l'attraction: cette recherche peut être utile dans la Théorie de la Figure de la Terre, parce qu'on peut à la rigueur supposer que la Terre, aujourd'hui mêlée de parties solides & de parties Fluides de différentes densités, étoit toute Fluide dans son origine, & composée de couches inégalement denses

qui se sont durcies pour la plupart, après avoir pris la figure qu'elles devoient avoir suivant les loix de l'Hydrostatique. Mais dans la matiere que nous traitons ici, c'est-à-dire dans les recherches sur les causes des Marées ou des vents, on doit supposer la Terre, à peu près dans l'état où elle est en effet, c'est-à-dire presque entièrement solide, & couverte 1°. d'un Fluide homogene & dont les parties s'attirent, comme l'eau de la mer. 2°. D'un Fluide heterogene, fort rare, dont l'attraction puisse être négligée comme insensible.

Or pour trouver en ce cas la figure de ce Fluide mixte, il faut d'abord chercher (*art.* 28) la figure que la surface de l'eau doit prendre, & qui, à cause du peu d'attraction de l'air, doit être à peu près la même, que s'il n'avoit point d'air au-dessus. Cela posé, il est évident que la surface de la mer & la surface supérieure de l'air, doivent être chacune de niveau; ainsi les colonnes verticales de l'air contenues entre ces deux surfaces, doivent être toutes du même poids, & par conséquent de la même longueur. Ce qui fournit un moyen facile de déterminer la figure de chacune des couches de l'air.

#### R E M A R Q U E IV.

37. Il faut remarquer, au reste, que le vent, tel que nous l'avons déterminé dans les *art.* 33 & 34, doit avoir lieu dans la seule hypothese, que la masse de l'air ait d'abord eu la figure sphérique, que ses parties soient

parfaitement Fluides & homogenes , qu'enfin le Soleil & la Lune soient immobiles. Or il est naturel d'imaginer, ou que la masse de l'air peut avoir eu dès le commencement la figure qu'elle auroit dû avoir, pour être en équilibre en vertu de l'action des trois causes dont nous avons parlé, ou au moins, que si elle a d'abord été sphérique, elle a dû parvenir en peu de tems à l'état d'équilibre par le frottement & la tenacité de ses parties, comme il arrive aux liqueurs qui oscillent dans des Syphons. Ainsi, tout ce que nous avons dit sur cette matiere, est principalement utile pour disposer le Lecteur à entendre les propositions qui doivent suivre, & dans lesquelles il retrouvera tous les principes que nous avons employés jusqu'à présent.

C'est pourquoi dans toute la suite de cette Dissertation, où nous supposerons que le Soleil & la Lune soient en mouvement par rapport à la Terre, nous ferons entièrement abstraction du vent qui pourroit résulter de la rotation de la Terre autour de son axe, parce que d'un côté ce vent doit avoir cessé depuis long-tems, s'il a jamais existé; & que d'un autre côté il ne seroit pas le même que nous avons déterminé jusqu'ici, l'air étant heterogene, au lieu que nous l'avons supposé homogene jusqu'à présent. A l'égard de la figure Spheroidale que l'Athmosphere doit avoir en vertu de cette rotation, elle ne doit apporter aucun changement sensible à la vitesse & à la direction du vent, qui, dans l'hypothese de la sphéricité de la Terre, devoit résulter du mouvement

du Soleil & de la Lune , & que nous déterminerons plus bas.

[ On voit par-là , pourquoi la rotation de la Terre qui devroit produire (*art.* 34 ) des vents si considérables , n'en produit cependant aucun.

Au reste , quand je dis que la rotation de la Terre n'excitera dans l'Athmosphere aucun mouvement , cela doit s'entendre de l'Athmosphere supposée inaltérable & dans un état permanent. Mais comme la masse de l'air se charge & se décharge continuellement d'une infinité de vapeurs & de corps étrangers , qui passent d'un endroit dans un autre , & que d'ailleurs la chaleur Solaire en raréfie certaines parties , pendant que d'autres se condensent par le froid , il est facile de concevoir que les colonnes verticales , ou les couches horizontales de l'air sont continuellement altérées dans leur poids & dans leur densité , & qu'ainsi la rotation du globe Terrestre doit causer fréquemment dans notre Athmosphere des mouvemens , qui pourront être assez considérables , & qui (*art.* 35 ) pourront même produire dans le Barometre des variations sensibles. C'est ce qui doit arriver sur-tout dans les endroits où l'air fera libre , & ne sera arrêté dans ses mouvemens par aucun obstacle. Ne peut-on donc pas conjecturer , sans prétendre pour cela exclure les autres causes , que les vents violens qui sont beaucoup varier le Barometre , sont dûs , au moins en partie , à la rotation de la Terre ? Quoiqu'il en soit , comme ces vents dépendent de la disposition actuelle de l'Athmosphere ,  
on

on sent assez qu'il est impossible de les déterminer, & que nous devons par conséquent faire abstraction ici de toutes les variations accidentelles qui peuvent arriver dans le poids & la densité de l'air. ]

Nous supposerons par-tout dans la suite, 1°. que le globe terrestre est en repos, & que tout le mouvement est dans le Soleil & dans la Lune. En effet, il ne doit résulter de là aucune différence dans le mouvement de l'air, si ce n'est peut-être celle qui proviendrait de la force centrifuge de ses parties, causée par le mouvement diurne ou annuel. Or, en premier lieu, la force centrifuge qui vient du mouvement annuel, étant la même dans toutes les parties du globe terrestre, elle ne doit produire dans l'air, que des mouvemens qui lui seront communs avec toute la masse du globe. A l'égard de la force centrifuge qui naît du mouvement diurne, elle doit seulement changer un peu la figure de l'Atmosphère, sans produire dans les mouvemens de l'air aucune altération sensible.

2°. Nous ferons entièrement abstraction du ressort de l'air, au moins entant que ce ressort peut empêcher toutes les colonnes verticales d'avoir la même densité. En effet, il est évident que la force qui presse horizontalement les particules de la colonne qui est au-dessous de l'astre, n'est pas fort grande par rapport à la force  $\frac{3Sv^2}{2d^2}$  qui (art. 35) presse ces parties dans le cas de l'équilibre, & qui est tout-à-fait insensible (*ibid.*). Donc la force

dont il s'agit est très-petite par rapport au poids total de l'air ; donc les parties de la colonne qui en est pressée , doivent avoir une densité qui ne diffère pas sensiblement de celle de la colonne qui est éloignée de l'Astre de 90 degrés.

3°. Nous supposons qu'il n'y ait qu'un Astre qui se meuve autour de la Terre ; car après avoir déterminé les mouvemens de l'air , qui doivent provenir de l'action d'un seul astre , on trouvera facilement (*art. 33. n. 2*) par la composition des mouvemens , l'effet qui doit résulter de l'action de plusieurs astres ensemble.

4°. Enfin , nous supposons toujours  $r = 1$  , & que  $z$  étant le Sinus de l'angle  $u$  , on a  $z = \frac{e^{u\sqrt{-1}} - e^{-u\sqrt{-1}}}{2\sqrt{-1}}$

&  $V[1-zz] = \frac{e^{u\sqrt{-1}} + e^{-u\sqrt{-1}}}{2}$  ; ce qui est connu

des Geomètres. Donc faisant l'arc  $PM = u$  , on aura la force  $\frac{3S\sqrt{rr-zz}}{rd^3} = \frac{3S}{d^3} \times \left( \frac{e^{2u\sqrt{-1}} - e^{-2u\sqrt{-1}}}{4\sqrt{-1}} \right)$ .

#### R E M A R Q U E V.

38. Une des principales difficultés qu'on rencontre dans la détermination du mouvement de l'air , consiste en ce que chacune de ses particules ne doit point , à parler en rigueur , avoir le même mouvement , que si elle étoit libre , & considérée comme un point unique & isolé. Car quoique les parties de l'air , qui , par exemple ,

environnent l'Equateur, soient contiguës les unes aux autres, toutes ces parties auroient le même mouvement & la même vitesse vers le même côté, si elles avoient toutes la même force accélératrice, & ainsi chaque particule auroit alors la même vitesse, que si on la considéroit comme un point libre & isolé. Mais les parties de l'air sont agitées par des forces qui sont différentes, selon la différente distance qu'il y a de l'astre à ces parties. Donc si on considère ces parties comme des points libres, & qu'on cherche le mouvement qu'elles doivent recevoir en vertu de leurs forces accélératrices, on trouvera une vitesse différente pour chaque point. Ainsi, pour que chaque partie d'air eût la même vitesse, que si elle étoit entièrement libre, & pour qu'en même tems les parties du Fluide fussent toujours contiguës les unes aux autres, il faudroit nécessairement qu'il arrivât de deux choses l'une : ou que le Fluide s'abaissât dans les endroits où la vitesse seroit plus grande, & s'élevât dans ceux où il y auroit moins de vitesse ; ou que le Fluide, entant qu'il est capable de se dilater & de se comprimer, se dilatât dans les endroits où il y auroit plus de vitesse, & se comprimât dans ceux où il y en auroit moins. Or (*hyp.*) la force qui agit sur l'air horizontalement, est employée toute entière à en mouvoir les parties. Ainsi le Fluide ne pourroit s'élever & s'abaisser dans le premier cas, ou se dilater & se comprimer dans le second, sans que la force des colonnes verticales ne devint inégale ; d'où il résulteroit nécessairement un nouveau mouvement dans

les particules de l'air, qui troubleroit & changeroit leur mouvement horizontal.

Cependant si on suppose ( ce qui se peut à la rigueur ) que le Fluide, en partie se dilate & se comprime, en partie s'élève & s'abaisse, de maniere que la différence entre le poids de deux colonnes voisines  $nM, nm$ , ( Fig. 5 ) soit égale à l'effort que fait pour se dilater la partie  $Mm$  de Fluide comprise entre ces colonnes; alors, & dans ce seul cas, le mouvement de chaque particule sera le même, que si on n'avoit point d'égard au mouvement des particules environnantes.

De plus, faisant abstraction entière de l'Elasticité, on remarquera, que quand les colonnes verticales de notre Athmosphere ne seroient pas toutes exactement de même poids, cependant il pourroit absolument se faire, qu'à cause de la tenacité & de l'adhérence des parties, cette différence de poids ne causât aucun mouvement dans l'air, sur-tout si sa hauteur étoit peu considérable; car l'Athmosphere ayant peu de densité, la différence de poids seroit alors fort petite, & par conséquent la force motrice fort petite aussi. Cherchons donc d'abord la vitesse que devoient avoir les parties de l'air, en les regardant comme des points isolés. Nous donnerons ici d'autant plus volontiers la solution de ce Problème, qu'elle facilitera beaucoup l'intelligence de tout ce qui doit suivre.

PROPOS. VII. PROBLÈME.

39. On demande quel doit être le mouvement de l'air :

en supposant 1°. que le Soleil se meuve autour de la Terre , & qu'il agisse sur la masse de l'air. 2°. Que l'air soit un fluide de peu de profondeur , qui environne la Terre , & dont les parties reçoivent de l'action du Soleil tout le mouvement qu'elles peuvent en recevoir ; c'est-à-dire , le même mouvement qu'elles auroient , si on les considéroit comme des points isolés & libres , qui ne fussent pas environnés par d'autres points.

1°. Si le point  $A$  (Fig. 12) dont on cherche le mouvement , est supposé dans l'Equateur  $QAR$  , & que l'astre décrive l'Equateur d'un mouvement uniforme, qu'enfin l'astre supposé en  $P$  , décrive  $Pp$  pendant que  $A$  parcourt  $AB$  ; on fera  $AP = u$  ,  $Pp = da$  ,  $AB = qda$ . Or comme  $AB$  est supposée fort petite par rapport à  $Pp$  , à cause que l'action du Soleil est fort petite , il est évident qu'on pourra faire  $Pp = du$  , & que la différence de  $qda$  , sera à très-peu près  $dqdu$ . Outre cela , si le tems par  $Pp$  & par  $AB$  est appelé  $dt$  , & si  $\theta$  est comme dans l'art. 13 , le tems qu'un corps pesant met à parcourir la ligne  $a$  , en vertu de la gravité  $p$  , on aura , suivant les principes connus de la Méchanique (+)  $dqda = \frac{\pi dt^2 \cdot 2a}{p \theta}$  ,

---

(+) Cette équation est appuyée sur le principe général si connu , que des forces accélératrices qui agissent uniformément , sont entr'elles en raison composée de la directe des espaces parcourus , & de l'inverse des quarrés des tems employés à parcourir ces espaces. Cependant on pourroit être en doute , s'il ne faut pas mettre  $2a$  , au lieu de  $a$  dans cette équation , parce que  $a$  est (*hyp.*) l'es-

( $\pi$  étant la force accélératrice en  $A$ ). Or  $\pi$  est ici égal à  $\frac{3S}{d^3} \times \left( \frac{e^{2uv-1} - e^{-2uv-1}}{4v-1} \right)$  (art. 37. n. 4) : & on peut supposer que le Soleil parcourt pendant le tems  $\theta$  l'espace  $b$  dans l'Equateur par son mouvement uniforme ; donc  $b : Pp :: \theta : dt$  : ainsi l'équation précédente se changera en  $dq = \frac{3S \cdot 2u \cdot du}{p b^2 \cdot d^3} \times \left( \frac{e^{2uv-1} - e^{-2uv-1}}{4v-1} \right)$  : donc  $q = \left( \frac{3S z^2}{2 d^3} \pm \frac{3S m^2}{2 d^3} \right) \times \frac{2u}{p b^2}$  ;  $z$  étant le Sinus de l'angle  $u$ , &  $m$  une constante.

Donc si  $m = 0$ , ou si  $m$  est telle que  $z z \pm m m$  soit

pace qu'un corps animé de la pesanteur  $p$ , devoit parcourir dans le tems  $t$  ; mais il faut remarquer que la différentielle de l'espace infiniment petit  $AB$ , prise suivant la méthode des secondes différences, se trouve double de sa valeur réelle ; ainsi afin d'avoir son expression véritable, il faut la diviser par 2. Pour nous mieux faire entendre, supposons qu'on demande l'espace que doit parcourir pendant le tems  $t$ , un corps poussé par la gravité  $p$  ; il est évident que cet espace sera  $\frac{a \times t^2}{11}$ . Maintenant, soit  $x$  ce même espace ;

si on supposoit  $ddx = \frac{a dt^2}{11}$  ; on auroit  $x = \frac{a t^2}{22}$  ; ainsi on trouveroit une valeur de  $x$  qui ne seroit que la moitié de sa valeur véritable. On doit donc supposer  $ddx = \frac{2 a dt^2}{11}$  ; & l'on aura  $x = \frac{a t^2}{11}$ .

Quoique cette remarque soit inutile pour ceux d'entre les Géomètres à qui ces sortes de calculs sont familiers, j'ai crû devoir la rappeler ici, de crainte que quelques-uns de mes Lecteurs, n'y faisant pas attention, ne croyent que j'aie commis une erreur en mettant  $2 a$  pour  $a$ .

toujours une quantité positive, l'air se mouvra continuellement sous l'Equateur d'Orient en Occident. Or pour que  $z z + m m$  soit toujours positif, il faut que  $m m$  ait toujours le signe  $+$ . Si  $m m$  avoit le signe  $-$  & que  $m m$  fût  $> 1$ , alors il y auroit sous l'Equateur un vent continuel d'Occident en Orient.

2°. Soit  $Q P R$  un parallèle quelconque,  $a$  un point quelconque, qui dans le tems que  $P$  parcourt  $P p$ , parcourt  $a c = \lambda d u$  dans la direction du Méridien, &  $a b = q' d u$  dans la direction du parallèle; il est constant que la force suivant  $a b$  sera toujours donnée par une fonction de la variable  $A P = u$ , & des distances du point  $a$  au parallèle  $Q P R$  & à l'Equateur, distances qu'on peut regarder comme constantes sans erreur sensible, durant le tems que l'astre met à parcourir le cercle  $Q P R$ . Ainsi on aura à très-peu près

$$d q' = \frac{3 S \cdot z a d u \phi n}{p b^2 d^2}, (\dagger) \text{ \& } d \lambda = \frac{3 S \times d u \Delta n \cdot z a}{p d^2 b^2}$$

équations qui peuvent être aisément intégrées, au moins par les quadratures.

Ayant trouvé la vitesse du vent dans le sens du parallèle & dans le sens du Méridien, on trouvera facilement sa vitesse & sa direction absolue.

C O R O L L A I R E.

40. Il ne seroit pas plus difficile de trouver la vitesse

(†) Par  $\phi n$  &  $\Delta n$ , j'entends des fonctions données de  $u$ .

du point  $\alpha$ , si ce point étoit supposé se mouvoir entre des montagnes parallèles. Car l'action du Soleil sur ce point seroit toujours déterminable par une fonction de  $u$ , & de la distance du point  $\alpha$  au parallèle de l'astre, distance qu'on peut regarder comme constante pendant le tems d'une révolution; par conséquent, si  $q'' du$  est l'espace décrit par le point  $\alpha$ , tandis que le point  $P$  parcourt  $Pp$ , on aura à très-peu près

$$dq'' = \frac{3S \cdot du \cdot r u \cdot 2a}{d^3 p b^2}.$$

## S C O L I E I.

41. On peut sans beaucoup de peine trouver les équations exactes & rigoureuses qui doivent conduire à déterminer le mouvement du point  $A$ ; car, par exemple, si on cherche le mouvement dans l'Equateur, on remarquera que  $Pp - AB = d(PA)$ ; c'est-à-dire, que  $da - qda = du$ . Ainsi on aura . . . . .

$$\frac{3S}{d^3} \times \left( \frac{e^{2uv-1} - e^{-2uv-1}}{4\sqrt{-1}} \right) \times \frac{2ad u^2}{b^2 p} = \frac{dq}{du} \times da;$$

ou  $\frac{3S \cdot 2ad u}{p b^2 d^3} \times \left( \frac{e^{2uv-1} - e^{-2uv-1}}{4\sqrt{-1}} \right) = dq(1-q);$

dont l'intégrale est  $\frac{3S a}{p b^2 d^3} \times (z z \pm mm) = q - \frac{qq}{2}$ .

[ Il est évident que l'on aura  $\frac{e^{uv-1} - e^{-uv-1}}{2\sqrt{-1}} =$

$$\pm \sqrt{[\pm mm \pm \frac{p b b d^3}{3 S a} \times (q - \frac{qq}{2})]};$$

ou

ou  $d\alpha (1 - q) = \pm \frac{pbbd\alpha}{3sa} \times (\frac{dq}{\alpha} - \frac{q dq}{\alpha})$  divisé par

$$\sqrt{[(1 \pm mm - \frac{pbbd\alpha}{3sa}) \times (q - \frac{qq}{\alpha})]} \times$$

$$\sqrt{[\mp mm + \frac{pbbd\alpha}{3sa}) \times (q - \frac{qq}{\alpha})]};$$

D'où l'on tirera fort aisément la valeur de  $d\alpha$  en  $dq$  & en  $q$ ; & par conséquent, si on suppose que dans un instant quelconque la vitesse du vent soit donnée en tel point qu'on voudra de l'Equateur, avec la distance du Soleil au Zenith de ce point, on aura l'équation entre les arcs que parcourt le Soleil durant un tems quelconque, & la vitesse du vent à la fin de ce même tems, ainsi que l'espace  $sqd\alpha$  que le vent aura parcouru.

On peut négliger le terme  $\frac{qq}{\alpha}$  comme nul par rapport aux autres; en ce cas on aura . . . . .

$$d\alpha = \pm \frac{pbbd\alpha dq}{2.3sa \sqrt{[(1 \pm mm - \frac{pbbd\alpha q}{3sa}) \times (\mp mm + \frac{pbbd\alpha q}{3sa})]}}$$

équation très-facile à intégrer, & de laquelle on tirera la valeur de  $\alpha$  en  $q$ , & celle de  $q$  en  $\alpha$ , & par conséquent celle de  $sqd\alpha$  en  $\alpha$ ].

S C O L I E II.

42. Il est évident, que les quantités  $\phi u$  &  $\Delta u$  de l'art. 39. n. 2. sont faciles à connoître lorsqu'on connoît les quantités  $AP = u$ ,  $\alpha A = A$ , & les angles  $k$

$PaA$ ,  $Pab$ , & l'arc  $aP$ . Je donnerai ici d'autant plus volontiers la méthode pour les déterminer, qu'il en traita une Trigonométrie sphérique, non-seulement nouvelle à plusieurs égards, mais qui pourra encore être utile pour calculer les triangles sphériques dont tous les côtés ne sont point des arcs de grand cercle.

Soit donc le triangle sphérique  $aRN$ , (Figure 13) rectangle en  $N$ , & composé de trois Arcs de grand cercle, soit l'Angle  $RaN = a$ , l'Angle  $aRN = R$ , l'Angle  $KaR$ , complément d' $a = a'$ ;  $aN = x$ ,  $aR = X$ ,  $RN = V$ ; soient  $aO$ ,  $aZ$  les tangentes des Arcs  $aN$ ,  $aR$ ; on pourra facilement démontrer que le triangle rectiligne  $aZO$  est rectangle en  $O$ : donc supposant l'Arc  $RV$  infiniment proche de  $Ra$ , on aura  $aI : aV :: aO : aZ$ ; ou  $dx$ :

$$dx :: \frac{e^{xV-1} - e^{-xV-1}}{e^{xV-1} + e^{-xV-1}} : \frac{e^{XV-1} - e^{-XV-1}}{e^{XV-1} + e^{-XV-1}} : \text{donc}$$

$$\frac{dx(e^{xV-1} - e^{-xV-1})}{e^{xV-1} + e^{-xV-1}} = \frac{dX(e^{XV-1} - e^{-XV-1})}{e^{XV-1} + e^{-XV-1}},$$

$$\text{ou } \frac{d(e^{xV-1} + e^{-xV-1})}{e^{xV-1} + e^{-xV-1}} = \frac{d(e^{XV-1} + e^{-XV-1})}{e^{XV-1} + e^{-XV-1}} :$$

ainsi, comme  $x = 0$ , rend  $X = RN = V$ , on aura

$$\frac{e^{xV-1} + e^{-xV-1}}{2} = \frac{e^{V^2-1} + e^{-V^2-1}}{2} \times \frac{e^{xV-1} + e^{-xV-1}}{2} \dots \dots \dots (\text{Æ}).$$

Maintenant, pour avoir les Angles  $a$  &  $R$ , il faut

remarquer qu'en prenant  $x$  pour constante, on aura

$$\frac{dV}{dx} = \frac{1}{\text{Cof. } R} = \frac{1}{e^{R\sqrt{-1}} + e^{-R\sqrt{-1}}} \dots \dots \dots (\mathcal{A}')$$

& qu'en prenant  $V$  pour constante, on aura

$$\frac{dx}{dV} = \frac{1}{\text{Cof. } a} = \frac{1}{e^{a\sqrt{-1}} + e^{-a\sqrt{-1}}} \dots \dots \dots (\mathcal{A}'')$$

Soit donc  $AN = A$ ,  $AP = u$ ;  $zP = u'$ , on aura, en faisant passer par le Pôle  $S$  le grand cercle  $SPQ$ ,  $PQ$  ou  $AN =$

$$x - A; NQ = \frac{AP}{\text{Cof. } AN} = \frac{u}{e^{(x-A)\sqrt{-1}} + e^{-(x-A)\sqrt{-1}}};$$

$$QR = NR - NQ = V - \frac{u'}{e^{(x-A)\sqrt{-1}} + e^{-(x-A)\sqrt{-1}}};$$

& enfin  $PR = X - u'$ . Or  $PRQ$  étant un triangle sphérique rectangle en  $R$ , & composé de trois Arcs de grand cercle, on aura, à cause de l'équation  $(\mathcal{A})$  ci-dessus,

$$\left( \begin{matrix} PR \cdot \sqrt{-1} & -PR \cdot \sqrt{-1} \\ c & + c \end{matrix} \right) \times 2 = \left( \begin{matrix} RQ \cdot \sqrt{-1} & -RQ \cdot \sqrt{-1} \\ c & + c \end{matrix} \right) \times \left( \begin{matrix} PQ \cdot \sqrt{-1} & -PQ \cdot \sqrt{-1} \\ c & + c \end{matrix} \right) \dots \dots \dots (\mathcal{A}''')$$

il faut substituer dans cette équation les valeurs de  $PR$ ,  $PQ$ ,  $RQ$ , qu'on vient de trouver.

Or comme l'équation  $(\mathcal{A}''')$  donnera une valeur du Cofinus de l'angle  $R$ , dont on a déjà une autre expression par l'équation  $(\mathcal{A}')$ , on aura, en comparant ensemble ces deux valeurs, une nouvelle équation que j'appelle  $\mathcal{A}''''$ ; & des trois équations  $\mathcal{A}$ ,  $\mathcal{A}'''$ ,  $\mathcal{A}''''$ , combinées ensemble, il en naîtra une seule qui contiendra

les trois quantités  $u$ ,  $u'$ ,  $A$ , & outre cela, la quantité  $x$ , ou la distance du lieu  $\alpha$ , au grand cercle  $NR$ .

Outre la méthode que nous venons de donner dans cet article pour trouver l'équation entre les Arcs d'un triangle sphérique, dont tous les côtés ne sont point de grands cercles, on peut aussi se servir de la méthode suivante, qui paroît encore plus facile. Soit imaginée la corde de l'Arc  $\alpha P$  (Fig. 15), & des points  $\alpha$ ,  $P$ , soient aussi imaginées des droites perpendiculaires aux plans  $'AP$ ,  $\alpha A$ , & au rayon du cercle  $AP$  qui passe par  $A$ . On aura un triangle rectangle, dont les côtés seront facilement exprimés par les Arcs  $\alpha P$ ,  $\alpha A$ ,  $AP$ , & l'équation entre les côtés de ce triangle, qui peut se déduire facilement de l'égalité entre le carré de l'hypothénuse, & la somme des carrés des côtés, donnera l'équation entre les Arcs  $\alpha P$ ,  $AP$ ,  $\alpha A$ .

Pour déterminer précisément les quantités  $q'$ , &  $\lambda$  de l'art. 39, soit  $AP$  (Fig. 15) le parallèle décrit par le Soleil; & supposons qu'on cherche la vitesse du point  $\alpha$  sur le parallèle  $QR$ ; on fera  $AP = u$ , & on prendra  $\frac{n}{1}$  pour le rapport du rayon du parallèle  $AP$  au rayon du parallèle  $QR$ : je dis, que suivant les noms donnés dans

cet article, on aura  $\lambda = \frac{3S \cdot 2an}{2d1 \cdot p^2b^2} \times [(\text{Sin. } \alpha P)^2 \pm mm]$ ,

Car on doit avoir  $d\lambda du = 3S \cdot \left( \frac{\epsilon^{2\alpha P \cdot \sqrt{-1}} - \epsilon^{-2\alpha P \cdot \sqrt{-1}}}{4d1 \sqrt{-1}} \right) \times$

Cof.  $R\alpha P \times \frac{2adn^2}{p^2b^2}$ . Or quelle que soit l'équation entre

$aP$ ,  $AP$ ,  $Aa$ , on trouvera par le moyen de cette équation le Cofinus de l'angle  $RaP$ , en y prenant  $AP$  &  $aP$  comme variables, en tirant ensuite de la différentiation la valeur de  $\frac{d(aP)}{d(AP)}$ , & multipliant cette valeur

par  $n$  ou la divisant par  $\frac{1}{n}$  : donc on aura le Cofinus de

$$RaP = \frac{p^N}{Pp} \times n = \frac{d(aP)}{d(u)} \times n. \text{ Donc } d\lambda = \frac{3S \cdot 2a}{p^b b a^3} \times n$$

$$\left( \frac{e^{2aP \cdot \sqrt{-1}} - e^{-2aP \cdot \sqrt{-1}}}{4\sqrt{-1}} \right) \times d(aP); \text{ \& } \lambda = \frac{3Sn \cdot a}{a^3 p^b} \times$$

[ ( Sin.  $aP$  )<sup>2</sup> + mm ].

A l'égard de la vitesse du vent dans le sens du Méridien; supposons, pour plus de facilité, que le cercle  $AP$  soit l'Equateur; & faisant  $aP = X$ , &  $aA = x$ , la force accélératrice suivant  $aA$ , sera  $\frac{3S}{d^3} \times \frac{e^{2X\sqrt{-1}} - e^{-2X\sqrt{-1}}}{4\sqrt{-1}} \times$

$$\frac{dx}{dx} = \frac{3S}{d^3} \times \frac{e^{x\sqrt{-1}} - e^{-x\sqrt{-1}}}{\sqrt{-1} (e^{x\sqrt{-1}} + e^{-x\sqrt{-1}})} \times \frac{(e^{X\sqrt{-1}} + e^{-X\sqrt{-1}})^2}{4}$$

D'où il suit que dans un seul & même Hémisphère, cette force sera toujours dirigée du même côté; ainsi comme elle produit (*hyp.*) son plein & entier effet, il en résulte que l'action de cette force devrait continuellement rapprocher de l'Equateur la masse entière de l'air, & que toute l'Athmosphère devrait se réunir & s'amonceler dans le plan de l'Equinoctial.

Or il est clair au premier coup d'œil, qu'on ne peut légitimement supposer que cela arrive, & que la masse

de l'Atmosphère, doit nécessairement faire des oscillations dans le sens du Méridien, & avoir du Nord au Sud un espece de Flux & de Reflux: on ne doit donc point supposer, que la force qui agit dans le sens du Méridien, ait son effet plein & entier. Au reste, il est évident que cette force est nulle quand  $x=0$ , &  $X=90^\circ$ , & qu'ainsi elle est nulle à l'Equateur & aux Pôles, & très-petite dans les lieux voisins. Donc pour peu qu'il y ait de ténacité dans les parties de l'air, & d'aspérité dans la surface de la Terre, l'action de cette force sera nulle près de l'Equateur & des Pôles; elle n'aura d'effet que dans les Zones tempérées, & cet effet doit même être peu considérable; car lorsque l'air n'a point de mouvement dans le sens du Méridien près de l'Equateur & des Pôles, l'air intermédiaire qui lui est adhérent & contigu, ne doit faire que de très-petites oscillations en ce sens.

De-là il s'ensuit, que si on veut chercher la vitesse du vent suivant la méthode de l'art. 39, on ne doit & on ne peut avoir égard qu'au mouvement qui se fait dans le sens du parallèle *QR*. or

## S C O L I E III.

43. *b* étant (*hyp.*) l'espace que le Soleil ou la Terre parcourt dans le tems  $\theta$ , qu'un corps pesant met à parcourir *a*; si on fait  $\theta = 1$  sec., on aura  $a = 15$  pieds,  $b =$

$$\frac{15 \text{ deg. terr.}}{3600} = \frac{15 \cdot 57060 \cdot 6 \text{ pieds}}{3600} = \frac{5706}{4} = 1427 \text{ pieds environ;}$$

or la vitesse angulaire du vent est à la vitesse angulaire de l'Astre, comme  $q$  à 1, ou (négligeant  $mm$ ) comme

$\frac{3^a S}{p b^2 d_i} \times z z$  à 1; c'est-à-dire, dans le cas présent, com-

me  $\frac{3 \times 11 \times 10695539}{3^{29} \cdot (365)^2 \cdot (1427)^2} \times z z$  est à 1; & dans le tems que la

Terre parcourroit l'espace  $b$ , le vent avec la plus grande vitesse qu'il pût avoir, parcourroit un espace =  $\frac{3^a S}{p b d_i}$ ;

c'est-à-dire, que le vent parcourroit en une seconde un

espace égal à  $\frac{3 \times 11 \times 10695539}{289 \cdot (365)^2 \cdot (1427)}$  pieds, [ quantité fort

petite, puisqu'elle est beaucoup moins considérable que

$\frac{50 \times 1000000}{200 \cdot 100000 \cdot 1000}$  pieds, c. à d.  $\frac{1}{20}$  de pied. ] Or comme les

observations nous apprennent que sous l'Equateur le vent fait environ 8 à 10 pieds par seconde (+); il s'ensuit que la vitesse véritable du vent est fort différente de celle que nous trouvons par la Théorie présente, & qu'ainsi la méthode de l'art. 39, 1. sauroit être regardée comme assez exacte, à moins qu'on ne suppose  $mm$  positif, & beaucoup plus grand que l'unité.

#### S C O L I E IV.

44. Afin qu'on puisse plus aisément juger si la méthode du Problème présent peut être admise, dans le cas

---

(+) Voyez M<sup>rs</sup> Mariotte & Musschembroek.

où on suppose  $mm$  beaucoup plus grand que l'unité, nous allons examiner quelle devroit être la différence entre le poids des colonnes ou leur longueur, si les parties de l'air se mouvoient avec la vitesse que nous venons de déterminer. Pour rendre le calcul plus facile, nous supposons que la Terre soit réduite au plan de l'Equateur, que  $\epsilon$  soit la hauteur du Fluide au point  $P$  (Fig. 14) au-dessus duquel est l'Astre, &  $\epsilon - k$  la hauteur du Fluide en  $A$ ,  $k$  étant une fonction de  $u$ , que  $A, a$ , soient deux points infiniment proches l'un de l'autre, & que  $a$  parcoure la ligne  $ab$ , tandis que  $A$  parcourt la ligne  $AB$ ;

supposant ensuite  $q = \frac{3S \cdot a}{p b^2 d^2} \times (zz \pm mm)$  on aura  $ab -$

$$AB = \frac{2adn \cdot 3Szdz}{p b^2 d^2}; \text{ par conséquent } Bb = du -$$

$$\frac{2adn \cdot 3Szdz}{p b^2 d^2}. \text{ Or la hauteur du Fluide en } A, \text{ lorsque}$$

l'Astre est en  $P$ , est (*hyp.*)  $\epsilon - k$ ; donc la hauteur de la colonne en  $A$ , lorsque l'Astre est en  $p$ , doit être

$$\frac{Aa \times (\epsilon - k)}{Bb}, \text{ parce que le Fluide qui occupoit d'abord}$$

l'espace  $AOaa$ , occupe dans l'instant suivant l'espace  $QEBbq$ ; donc la hauteur de la nouvelle colonne en  $A$ ,

$$\text{fera } \epsilon - k + \frac{2a \cdot 3Szdz}{p b^2 d^2}; \text{ de plus, lorsque } P \text{ vient en } p,$$

la hauteur de la colonne en  $A$ , devient  $\epsilon - k - dk$

$$\text{à très-peu près. D'où l'on tire } dk = \frac{-2a \cdot 3Szdz}{p b^2 d^2}; \&$$

comme

comme  $z = 0$  rend  $k = 0$ , on aura  $k = \frac{-3a \cdot S z^2}{p b^2 d^2}$ .

Donc la plus grande différence qu'il puisse y avoir entre le poids des colonnes, est  $\frac{3 S a}{p b^2 d^2} \times p d^2$ ; or  $p d^2$  étant

égal au poids de 32 pieds d'eau, cette différence est égale au poids de  $\frac{3 \cdot 15 \cdot 32 \cdot 10605510}{(1427)^2 \cdot (365)^2 \cdot 289}$  parties d'un pied

d'eau, quantité fort petite, comme il est facile de le voir.

De plus, il faut remarquer, que dans le cas dont il s'agit ici, elle exprime la différence de poids des colonnes, soit pour l'air homogène, soit pour l'air hétérogène. Car 1°. si l'air est supposé homogène, on aura toujours  $d$  en raison inverse de  $s$ ; parce que  $p d^2$  est égal au poids de 32 pieds d'eau. 2°. Si l'air est hétérogène, & composé de couches de différentes densités  $d, d', d''$  &c. dont les hauteurs en  $P$  soient  $s, s', s''$  &c. on

trouvera que la différence cherchée est égale à  $\frac{3 a S}{p b^2 d^2} \times (p d^2 + p d'^2 + p d''^2 \text{ &c.})$  Or  $p d^2 + p d'^2 + p d''^2 \text{ &c.}$  est égal au poids de 32 pieds d'eau. Donc &c.

Par conséquent, puisque la force qui peut empêcher que les parties de l'air ne se meuvent comme des points libres & isolés, est une force très-petite; il s'ensuit que dans la méthode du Problème présent, on pourroit ne s'écarter que très-peu de la vérité, pourvu qu'on prit *mm* positif & beaucoup plus grand que l'unité. Cependant pour ne pas trop nous arrêter à cette simple

conjecture, & pour embrasser le Problème dans toute sa difficulté, nous allons déterminer la vitesse du vent dans l'hypothèse que les parties de l'air se nuisent mutuellement les unes aux autres; mais avant de passer à cette recherche, nous avons encore une remarque à faire dans l'article suivant, sur le cas dont il s'agit ici.

## S C O L I E V.

45. Si le globe solide que nous avons supposé couvert d'une lame ou couche d'air sphérique, étoit changé en Sphéroïde solide, il n'en résulteroit aucun changement dans le mouvement de l'air. Car tous les points de la surface du Sphéroïde seront poussés perpendiculairement à cette surface (parce que ce Sphéroïde représente notre Terre à laquelle l'air est contigu); par conséquent les particules de l'air, voisines de cette surface, ne recevront par l'attraction du Sphéroïde aucune nouvelle force qui puisse augmenter ou diminuer le mouvement qu'elles ont déjà. Il n'en seroit pas de même si le Sphéroïde étoit Fluide, & que ses parties eussent un mouvement horizontal. Car alors, outre la force d'attraction, commune aux parties du Sphéroïde & de l'air, il seroit encore nécessaire d'avoir égard à la force accélératrice des parties du Fluide: soit  $\pi$  cette force accélératrice,  $\phi$  l'attraction horizontale des parties du Fluide; & imaginons que la pesanteur  $p$  vers le centre se décompose en deux forces, dont l'une que j'appelle  $G$ ,

soit perpendiculaire à la surface du Sphéroïde, & l'autre que j'appelle  $F$ , agisse dans le sens horizontal; il est évident (*art.* 12. *not.* (a) §. I.) que les particules du Fluide, sollicitées par les forces  $G$ , &  $\phi - F - \pi$ , devroient rester en équilibre; donc la force  $G$  étant (*hyp.*) perpendiculaire à la surface du Fluide, on aura  $\phi - F - \pi = 0$ . Or la force  $\phi - F$  agit sur les particules de l'air; donc ces particules, outre la force  $\frac{3S}{4V-1} \times \frac{(e^{2NV-1} - e^{-2NV-1})}{4V-1}$ ,

sont encore sollicitées au mouvement par la force  $\phi - F$ , ou (à cause de  $\phi - F - \pi = 0$ ) par la force  $\pi$  qui est la force accélératrice horizontale des particules du Fluide.

D'où il s'ensuit 1°. que la vitesse & la force absolue du vent, n'est pas la même sur un Sphéroïde solide que sur un Sphéroïde Fluide, dont on suppose que les parties soient en mouvement. 2°. Que la vitesse respective du vent & des parties de la surface du globe est la même dans l'un & l'autre cas, puisque la force  $\pi$  dont il faut augmenter ou diminuer dans le second cas la force accélératrice du vent, est la force même qui accélère le Fluide.

Voilà ce qui doit arriver, dans l'hypothèse, que la force  $\frac{3S}{4V-1} \times \frac{(e^{2NV-1} - e^{-2NV-1})}{4V-1}$  n'agisse que sur l'air & non sur le Fluide inférieur. Mais comme cette hypothèse est peu naturelle, supposons que la force  $\frac{3S}{4V-1} \times \frac{(e^{2NV-1} - e^{-2NV-1})}{4V-1}$  agisse en même tems sur l'air

& sur le Fluide, & nous aurons . . . . .

$$\frac{3S}{d^2} \times \frac{(e^{2nV-1} - e^{-2nV-1})}{4V-1} + \phi - F - \pi = 0. \text{ Les}$$

trois premiers termes de cette équation représentent la force qui agit sur l'air : donc cette force est  $= \pi$  ; c'est-à-dire que la force accélératrice de l'air est la même que celle du Fluide. Donc la vitesse respective de l'air & du Fluide sera nulle.

De-là il est aisé de conclure, que la vitesse du vent qui souffle sur la Mer, doit être fort différente de celle avec laquelle le vent souffleroit sur le continent ; car, comme la Mer change continuellement de figure, on ne fauroit avoir continuellement  $\phi - F = 0$ . [En effet, pour que l'on eût toujours  $\phi - F = 0$ , il faudroit que le Sphéroïde pût prendre toutes sortes de figures en vertu de son attraction, & qu'ainsi il y eût une infinité de cas, où il fût en équilibre, ce qui n'a lieu (*art. 31*) que dans un seul cas, savoir dans celui où la densité du noyau est à celle du Fluide, comme 3 à 5.] Ainsi la force accélératrice  $\pi$  du vent *marin*, si on peut l'appeller ainsi, ne doit pas être supposée égale à la force accélératrice  $\frac{3S}{d^2} \times \frac{(e^{2nV-1} - e^{-2nV-1})}{4V-1}$  du vent qui souffle sur le continent ( $\dagger$ ).

---

· [( $\dagger$ ) Cette vérité se confirmera encore, par ce que nous démontrerons dans l'*art. 85*.]

## PROPOS. VIII. LEMME.

46. Soit un parallélepède rectangle, qui ait pour base le rectangle infiniment petit ABCD, (Fig. 16) & dont la hauteur soit  $\epsilon$ ; imaginons que les points A, B, C, D, viennent en a, b, c, d, desorte que la base ABCD, devienne abcd; on demande quelle doit être la hauteur du parallélepède, qui auroit pour base abcd, pour que ce parallélepède soit égal au parallélepède donné, dont la base est ABCD, & la hauteur  $\epsilon$ .

Soit  $\epsilon - \mu$  la hauteur cherchée,  $\mu$  étant fort petite par rapport à  $\epsilon$ ; on aura  $[\epsilon - \mu] \times (AB + ab - AB) \times (AD + ad - AD) = \epsilon \cdot AB \cdot AD$ . D'où l'on tire,

en négligeant ce qui se doit négliger,  $\frac{\mu}{\epsilon} = \frac{ab - AB}{AB} + \frac{ab - AD}{AD}$ . Ce Q. F. T.

## PROPOS. IX. PROBLÈME.

47. Soit la Terre un globe solide qui ait pour centre le point G (Fig. 17); imaginons que ce globe soit couvert d'un fluide homogène & sans ressort, & outre cela fort rare, afin qu'on puisse négliger l'attraction de ses parties; & supposons qu'un corps dont la masse soit S, se meuve uniformément autour du centre du globe à la distance d: on demande le mouvement du fluide en vertu de l'action du corps S.

## I.

Supposons 1°. que le corps S se meuve dans le plan  
l iij.

d'un grand cercle  $pPR$ , & prenons sur la surface du globe, deux points  $A, B$ , infiniment proches du cercle  $pPR$ , & qui en soient également éloignés de part & d'autre. Maintenant, par les points  $A$  &  $B$ , & par le point  $P$ , au-dessus duquel on suppose que soit l'Astre, faisons passer les plans des deux grands cercles  $PAD$ ,  $PBC$ ; il est évident que le mouvement horizontal des points  $A$  &  $B$  vient de la force avec laquelle le corps  $S$  agit horizontalement sur ces points. Or la direction de cette force est toujours dans le plan vertical qui passe par le corps  $S$ , & ce plan vertical, diffère peu du plan immobile  $pPR$ , au moins dans les lieux qui sont fort près du cercle  $pPR$ ; ainsi nous supposerons ici que les points  $A$  &  $B$  se meuvent toujours dans le plan du grand cercle vertical qui passe par ces points, par le centre  $G$ , & par le corps  $S$ ; & nous n'aurons pour le présent aucun égard au mouvement que les Corpuscules  $A$  &  $B$  peuvent avoir perpendiculairement à ce plan. Nous examinerons plus bas, jusqu'à quel point cette hypothèse peut passer pour exacte. [ Il faut observer, au reste, que ces plans verticaux changent continuellement de position, à mesure que le corps  $S$  se meut. ]

## II.

Soit l'arc  $PA$ , ou la distance de l'Astre au point  $A = u$ ; que  $Pp = da$ , représente l'arc décrit par le corps  $S$  dans un instant : on supposera ( ce qui est permis )  $AD = Pp$ ; &  $AB = Pp$ ; de plus, on remarquera que

toute la variation qu'il peut y avoir dans la vitesse des parties du Fluide & dans sa hauteur, doit dépendre de la seule distance variable du corps *S* au Zenith du lieu où l'on cherche la vitesse du Fluide ; imaginant donc que le point *A* décrive la ligne *Aa*, tandis que le corps *S* vient de *P* en *p*, on fera  $Aa = qd\alpha$ , *q* exprimant une fonction inconnue composée de *u* & de constantes. Or comme la ligne *Aa* est très-petite par rapport à *Pp*, on pourra supposer sans erreur sensible  $d\alpha = du$ , &  $qd\alpha = qdu$ . Donc si *Dd* est l'espace parcouru durant ce même tems par le point *D*, on aura  $Dd - Aa = dqdu$ , &

$$\frac{ab - AB}{AB} = \frac{bm - BM}{BM} = qdu \times \frac{d(c^{n\sqrt{v}-1} - c^{-n\sqrt{v}-1})}{c^{n\sqrt{v}-1} - c^{-n\sqrt{v}-1}}$$

(en supposant que *BM* soit le Sinus de *PA* ou *PB*,

& qu'ainsi  $BM = \frac{c^{n\sqrt{v}-1} - c^{-n\sqrt{v}-1}}{2\sqrt{v}-1}$ ).

### III.

Soit à présent la hauteur du Fluide en *P* = *s*, & *s* - *k* sa hauteur en *A*; il est évident (art. 46) que le point *S* venant en *p*, la hauteur *s* - *k* doit être diminuée de la quantité  $(\frac{Dd - Aa}{AD} + \frac{ab - AB}{AB}) \times [s - k]$ ,

ou (en négligeant *k*)  $s \times (\frac{Dd - Aa}{AD} + \frac{bm - BM}{BM})$ . Or

si on suppose  $k = fdu$ , il est clair que *P* venant en *p*, & *A* en *a*, de manière que *Aa* soit fort petite par rap-

port à  $Pp$ , la hauteur  $s - k$  deviendra à très-peu près  $s - k - v du$ ; donc on aura . . . . .

$$\frac{s}{s} = \frac{dg}{du} + \frac{g d(c^{n\sqrt{-1}} - c^{-n\sqrt{-1}})}{du(c^{n\sqrt{-1}} - c^{-n\sqrt{-1}})} \dots \dots (A).$$

## IV.

Supposons ensuite que  $\pi$  soit la force accélératrice de la particule  $A$  ou  $a$ , on aura  $\pi = \frac{d(Aa)ps^2}{dt^2 \cdot 2a}$ , (en conservant les mêmes noms que dans les *art.* 13 & 39); & si on fait  $b : da :: \theta : dt$ , c'est-à-dire, si on suppose que le corps  $S$  parcourre uniformément l'espace  $b$  dans le tems  $\theta$ , on aura  $\pi = \frac{d(Aa) \cdot pb^2}{2ad^2}$  = à très-peu près

$\frac{dg}{du} \times \frac{pb^2}{2a}$ , parce que  $Aa$  est fort petite par rapport à  $Pp$ .

Or comme le point  $A$  est mû suivant  $AD$  par la force accélératrice  $\pi$ , en même tems qu'il est tiré suivant  $AP$  par une force =  $\frac{3S}{d^2} \times \left( \frac{c^{2n\sqrt{-1}} - c^{-2n\sqrt{-1}}}{4\sqrt{-1}} \right)$ , il faut

(*art.* 12. *not.* (a) §. II.) que la force  $\frac{3Sc(c^{2n\sqrt{-1}} - c^{-2n\sqrt{-1}})}{4d^2\sqrt{-1}}$

+  $\pi$  soit telle, que si elle agissoit toute seule sur le point  $A$ , elle retirât ce point en repos : donc la force  $\pi$  +  $\frac{3S(c^{2n\sqrt{-1}} - c^{-2n\sqrt{-1}})}{4d^2\sqrt{-1}}$  doit nécessairement faire équi-

libre en  $A$  avec la gravité  $p$ : donc la différence de poids des

des

des colonnes en  $A$  & en  $D$ , doit être = à  $AD \times$   
 $(\frac{3S(e^{2nV-1} - e^{-2nV-1})}{4d^1V-1} + \pi)$  : donc on aura l'équation  
 $v du \times p = du (\frac{3S(e^{2nV-1} - e^{-2nV-1})}{4d^1V-1} + \pi)$  ;  
 ou  $v = \frac{3S(e^{2nV-1} - e^{-2nV-1})}{4p d^1 V-1} + \frac{bb dq}{dn. 2a} \dots (B)_2$

V.

On tire des équations  $A$  &  $B$ , l'équation suivante ;

$$\frac{v dq}{dn} + \frac{v q d(e^{nV-1} - e^{-nV-1})}{dn(e^{nV-1} - e^{-nV-1})} = \frac{3S}{p d^1} \times \frac{(e^{2nV-1} - e^{-2nV-1})}{4d^1V-1} +$$

$$\frac{dq}{dn} \times \frac{b^2}{2a} : \text{ si on suppose dans cette équation } 1 - \frac{b^2}{2a} = \lambda, \text{ \&}$$

$$\frac{e^{nV-1} - e^{-nV-1}}{2V-1} = z, \text{ on la changera en } \lambda dq + \frac{q dz}{z} =$$

$$\frac{3S z dz}{p d^1} ; \text{ dont l'intégrale complete } (\dagger) \text{ est } q z^{\frac{1}{\lambda}} = \frac{3S}{p d^1} \times$$

(†) Dans cette équation intégrale, il ne faut point ajouter de constante. Car si  $\frac{1}{\lambda}$  est une quantité positive, aussi-bien que  $\frac{1}{\lambda} + 2$ , alors les deux membres deviennent l'un & l'autre égaux à zero, lorsque  $z = 0$  ; & si  $z^{\frac{1}{\lambda}}$ , ou  $z^{\frac{1}{\lambda} + 2}$ , ou ces deux quantités à la fois sont infinies quand  $z = 0$ , il y aura toujours égalité entre les deux membres de l'intégrale, si  $q = \frac{3S z z}{p d^1 (2\lambda + 1)}$  sans qu'on ait besoin d'ajouter de constante.

$$\frac{\frac{x}{2\lambda} + 1}{2\lambda + 1}. \text{ Donc } q = \frac{3S}{p d^3} \times \frac{z^3}{3 - \frac{b^2}{a^2}}; \text{ \& } k \text{ ou } \int r du = \frac{3S z^2}{2 p d^3} +$$

$$\frac{b^2}{2 a^4} \times \frac{3S}{p d^3} \times \frac{z^2}{3 - \frac{b^2}{a^2}} = \frac{3S z^2}{2 p d^3} \times \left( \frac{3 a^4}{3 a^4 - b^2} \right).$$

## VI.

Telles sont les valeurs des quantités  $k$  &  $q$ , dans l'hypothèse, que les points  $A$  voisins du cercle  $pPR$  se meuvent toujours dans le plan qui passe par le centre  $G$  & par le Soleil; hypothèse qui peut être regardée comme assez exacte pour deux raisons: 1°. parce que la force qui peut écarter de ce plan le point  $A$ , est infiniment petite par rapport à la force suivant  $AP$ , qui est elle-même très-petite par rapport à la pesanteur  $p$ : ainsi pour peu qu'il y ait quelque adhérence & quelque tenacité dans les particules du Fluide, & que l'aspérité de la surface terrestre produise quelque résistance, on sent que l'effet de cette force doit être nul. 2°. Outre cela, cette force, pendant le tems d'une révolution, agit alternativement en sens contraires. Ainsi son effet total peut être considéré comme nul, & on peut regarder les valeurs déjà trouvées des quantités  $q$ , &  $k$ , comme leurs valeurs moyennes.

Pour ce qui est des autres points qui sont plus éloignés du cercle  $pPR$ , on peut aussi supposer que leur mouvement se fasse dans le plan d'un grand cercle qui

passé par le corps  $S$ , par ces points, & par le centre  $G$ ; 1°. parce que la force qui peut éloigner ces points du plan vertical, agit alternativement en sens contraires. 2°. Parce que la tenacité & la cohésion des parties du Fluide peut être telle, que les parties, éloignées du cercle  $pPR$ ; aient un mouvement analogue à celui des parties voisines de ce cercle.

A l'égard de la vitesse de ces points, nous la déterminerons dans le Problème suivant (*art. 65*); mais nous supposerons pour le présent, qu'en vertu de la tenacité du Fluide toutes les parties qui sont également distantes du corps  $S$ , aient une égale vitesse.

Nous sera-t-il permis d'ajouter, pour confirmer cette hypothèse, qu'elle paroît avoir beaucoup de rapport à celles qu'ont faites les célèbres *M<sup>r</sup> Euler & Daniel Bernoulli*, dans leurs excellentes Pièces sur le Flux & Reflux de la mer? Ces deux illustres Auteurs supposent que la Terre est changée par l'action du Soleil ou de la Lune, en un Sphéroïde dont l'axe est dans la ligne qui joint le centre de la Terre & celui du Soleil ou de la Lune. Or la hauteur des parties du Fluide dépend de leur vitesse horizontale; & comme la hauteur est supposée la même dans tous les lieux, du Zenith desquels le Soleil, par exemple, est également éloigné, n'est-il pas naturel d'en conclure, qu'on peut supposer aussi que la vitesse horizontale soit la même dans ces points-là?

De plus, les observations nous apprennent que le vent souffle sous l'Equateur d'Orient en Occident au tems

des Equinoxes , qu'il participe un peu du Nord dans l'Hémisphère Boreal , & un peu du Sud dans l'Hémisphère Austral : & qu'il participe d'autant plus du Nord ou du Sud , que le Soleil est plus éloigné vers le Sud ou vers le Nord. Donc on peut supposer que la direction du vent , est à peu près dans le vertical du Soleil. [ Nous verrons d'ailleurs plus bas (*art. 74*) que cette hypothèse peut avoir lieu , même dans le cas où l'on supposeroit les particules parfaitement Fluides , & sans aucune adhérence entr'elles , ni aucun frottement sur la surface du globe terrestre. ]

Enfin , si on veut avoir égard à l'attraction des parties du Fluide , comme on y aura égard dans l'*art. 77* , on est obligé de supposer d'abord , que le Fluide est au moins à peu près , un Sphéroïde formé par la révolution d'une Ellipse autour de son axe : autrement on se trouveroit engagé dans des calculs impraticables. *Voyez les art. 77 & 84.*

Si le corps *S* étoit mù , non dans le plan d'un grand cercle , mais dans une courbe quelconque , il est visible , que pour les raisons déjà exposées ci-dessus , on pourra supposer sans beaucoup d'erreur , que les parties du Fluide se meuvent toujours dans un plan qui passe par le corps *S* & par le centre de la Terre.

Au reste , ceux qui ne jugeront pas ces hypothèses assez plausibles , trouveront dans le Problème suivant (*art. 65*) les équations vraies & rigoureuses , par lesquelles on peut déterminer exactement le mouvement du Fluide , avec les corrections qu'on peut faire aux calculs du Problème présent.

## COROLLAIRE I.

$$48. \text{ Puisque } Aa = q du = \frac{3sz^2}{\epsilon p d^1 (3 - \frac{b^2}{a^1})} \times du, \&$$

que  $zz$  est toujours positif; il est évident que le point  $A$  se mouvra toujours du même côté, savoir, du côté opposé au corps  $S$ , comme on l'a supposé dans la figure, si  $3 > \frac{bb}{a^1}$ ; & du même côté, si  $3 < \frac{bb}{a^1}$ . Or supposons que l'air soit homogène, & que sa hauteur  $\epsilon$  (*art. 33*) soit de  $850 \times 32$  pieds; on aura  $3a\epsilon$  ou  $3 \cdot 15 \cdot 850 \cdot 32 < bb$  ou  $(1427)^2$ . Donc l'air devrait dans cette hypothèse se mouvoir d'Orient en Occident, & toujours du même côté que le Soleil, ce qui s'accorde avec les observations.

De plus, il est évident que la hauteur du Fluide  $\epsilon - k$  ou  $\epsilon - \frac{3sz^2}{2p d^1} \times \frac{1a\epsilon}{3a\epsilon - b^2}$ , est la plus petite qu'il est possible dans les lieux qui ont le corps  $S$  à l'horizon, & la plus grande dans ceux qui ont le corps  $S$  au Zenith, si  $3a\epsilon > b^2$ ; qu'au contraire, si  $3a\epsilon < b^2$ , la hauteur du Fluide fera la plus petite qu'il est possible, lorsque le corps  $S$  est au Zenith, & la plus grande, lorsque le corps  $S$  est à l'horizon: qu'enfin, soit que l'on ait  $3a\epsilon >$  ou  $< b^2$ , la surface du Fluide doit s'élever & s'abaisser alternativement deux fois dans l'espace d'un jour, mais que sa hauteur ne fera jamais plus grande ou plus petite que  $\epsilon$ .

## SCOLIE I.

49. Il doit paroître fort surprenant, que dans l'hypothese de  $3a < b^2$ , le Fluide doit s'abaisser au-dessous de l'Astre, lorsqu'au contraire il sembleroit devoir s'élever. Mais, pour peu que l'on y fasse d'attention, le paradoxe disparaîtra presque entièrement: en effet, si le Fluide n'avoit aucune force d'inertie, il devroit toujours s'élever au-dessous de l'Astre: mais l'inertie de ses parties peut être telle, que s'étant d'abord élevé au-dessous de l'Astre au premier instant, il s'élève un peu plus vers l'Est dans l'instant suivant, dans le troisième instant encore un peu plus vers l'Est; & ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il soit arrivé à la distance de 90 degrés de l'Astre, auquel point on peut supposer que le Fluide ait acquis un état permanent. Pour que le Fluide s'abaisse sous l'Astre, il faut qu'il soit d'autant plus élevé, qu'il est plus éloigné de l'Astre: or pour qu'il soit d'autant plus élevé, qu'il est plus éloigné de l'Astre, il suffit que de deux points pris dans le même vertical infiniment près l'un de l'autre, celui qui est le plus éloigné de l'Astre, se meuve plus vite ou plus lentement que l'autre, selon que le mouvement se fait vers le même côté ou vers un autre côté que celui du corps *S*. En effet, soit par exemple  $Dd > Aa$ ; la hauteur  $\epsilon - k$  du Fluide augmentera, tandis que *P* vient en *p*, parce que *ABDC* décroissant, & devenant *abcd*, la hauteur du Fluide doit croître en même raison. Ainsi le paradoxe est beaucoup moindre qu'il ne paroît.

S C O L I E II.

50. Au reste, on auroit tort de croire que ce paradoxe vint de la supposition que nous avons faite, que toutes les parties du Fluide se mouvoient dans un plan vertical passant par le corps *S*. Car, supposons pour un moment, que la Terre & l'Air qui l'environnent soient réduits au plan de l'Equateur, ou du cercle *pPR*, alors, sans faire aucune hypothese, on trouveroit les équations suivantes, en ne faisant qu'effacer *q* dans les équations

$$A', B; \frac{v}{z} = \frac{dq}{du} \dots (C) \text{ \& } v = \frac{3S(c^{2uV-1} - c^{-2uV-1})}{p d^1 \cdot 4v-1} +$$

$$\frac{dq \cdot b^2}{2ad^1} \dots (D); \text{ par conséquent } \lambda dq = \frac{3S z dx}{p d^1}; \text{ dont l'in-}$$

tégrale est  $q = \frac{3S z^2}{\lambda, p \cdot 2 d^1} + K$ , supposant que  $q = K$ ;

quand  $z = 0$ : &  $\int v du = \frac{3S z z}{2 p d^1} \times \frac{2 a^2}{2 a^2 - b b}$ ; d'où l'on voit

que si  $2 a^2 < b b$ , le Fluide doit s'abaisser sous l'Astre.

C O R O L L. II.

51. C'est une chose digne d'être remarquée, que la quantité *q* a une valeur déterminée & unique, lorsqu'on suppose que la Terre est un globe: au lieu que cette même quantité *q* peut varier selon la quantité *K*, lorsqu'on suppose que la Terre est réduite à un plan circu-

laire. Soit  $K = \frac{3S m m}{\lambda, p \cdot 2 d^1}$ ; & on verra que la vitesse du

Fluide aura la même direction que celle du corps  $S$ , ou une direction contraire, ou alternativement la même direction & une direction contraire, selon que  $\frac{zz + mm}{\lambda}$  fera, ou toujours négatif, ou toujours positif, ou alternativement positif & négatif.

## COROLL. III.

§ 2. Cette remarque donne moyen d'expliquer, comment il peut se faire qu'il y ait sous l'Equateur un vent continuel d'Orient en Occident, & qu'en même tems la Mer ait un Flux & Reflux alternatif pendant chaque jour: car la masse de l'air qui couvre l'Océan sous l'Equateur, étant libre de tous côtés, peut & doit être regardée comme une portion de Sphere: au contraire, la Mer qui est resserrée par les Terres de toutes parts, doit se mouvoir à peu près comme dans un plan circulaire. D'ailleurs les rivages qui sont dans la direction du Méridien, empêchent nécessairement les eaux de la Mer de se mouvoir toujours dans le même sens.

[ Il résulte de tout ce que nous venons de dire,

1°. Que le plus grand espace que le vent puisse parcourir durant une seconde, en vertu de l'action Solaire,

est  $1427^{\text{pieds}} \times \frac{3 \cdot 16965539 \cdot 15 \cdot}{289 \cdot (365)^2 (3 \cdot 151 - [1427]^2)}$ ; ainsi connoissant

la vitesse du vent sous l'Equateur en vertu de l'action Solaire, on trouvera quelle doit être la hauteur de l'Atmosphère, supposée homogène.

2°. Que

2°. Que si  $3ae < b^2$ , cette vitesse sera d'autant plus petite que  $e$  sera plus petite ; & qu'au contraire, si  $3ae > b^2$ , elle sera d'autant plus petite que  $e$  sera plus grande.

3°. Que la plus grande variation du Barometre sera en général  $\frac{3s^2}{2p^2 \cdot 850 \cdot 14} \times \frac{3}{3 - \frac{(1427)^2}{15}}$  ; & que cette va-

riation sera à l'espace que le vent parcourt dans une seconde, comme  $\frac{3 \cdot 850 \cdot 32}{2 \cdot 850 \cdot 14} : 1427$  pieds, en supposant com-

me ci-dessus  $e = 850 \times 32$ . Donc si le vent parcourt par ex. 1 pied dans une seconde, la variation du Baro-

metre sera de  $\frac{3 \cdot 12 \cdot 12}{2 \cdot 14 \cdot 1427}$  pouces = environ  $\frac{1}{35}$  de pouce.

Donc si la force du Soleil peut faire parcourir 1 pied à l'air dans une seconde, elle ne causera dans le Barometre que des variations très-peu considérables & insensibles. De plus, il est à remarquer, que si on suppose comme dans l'art. 35,  $e = m \times 32$ , & par conséquent qu'on mette  $m \times 14$ , au lieu de  $850 \times 14$ , on

trouvera toujours la même variation de  $\frac{3 \cdot 12 \cdot 32}{2 \cdot 14 \cdot 1427}$  pouces :

d'où l'on voit qu'en général, supposant l'air homogène, ou mù, comme s'il étoit homogène, & le vent de  $n$  pieds par seconde, la variation du Barometre sera d'environ  $\frac{12n}{35}$  lignes. Par conséquent, si en vertu de l'ac-

tion du Soleil & de la Lune, l'air fait sous l'Equateur 10 pieds par seconde lorsqu'il a le plus de vitesse, la variation du Barometre pourra être assez sensible, quoique petite, puisqu'elle sera d'environ trois lignes en un jour. C'est de quoi il seroit bon de s'assurer par des observations. Au reste, les variations du Barometre ont bien d'autres causes que l'action du Soleil & celle de la Lune; ainsi on ne pourroit faire les observations dont il s'agit, que dans les tems où il arriveroit à la masse de l'air peu de variations accidentelles, & dans les endroits où l'air seroit libre. Quoiqu'il en soit, ce que nous remarquons ici sur les variations du Barometre, n'a rien de contraire à ce que nous avons dit sur ce sujet dans l'*art.* 35, où nous supposons le Soleil & la Lune en repos. On verra d'ailleurs dans la suite, que ces variations sont à peu près les mêmes dans nos climats que sous l'Equateur, & plus petites encore, dans les lieux plus près du Pôle, quoiqu'elles soient déjà assez petites sous l'Equateur, pour qu'elles puissent être sensiblement altérées par l'action des causes accidentelles, & par-là difficiles à connoître & à distinguer:

4°. Si  $3ae < b^2$ , la variation du Barometre sera d'autant plus petite que  $e$  sera plus petite; ce sera le contraire, si  $3ae > b^2$ .

5°. Etant donnée la hauteur à laquelle les eaux de la Mer sont élevées par l'action du Soleil ou de la Lune, on connoitra facilement la profondeur  $e$  nécessaire pour produire cette élévation. Ainsi sans avoir recours, com-

me dans l'art. 32, à la différente densité de la partie fluide du globe terrestre & de sa partie solide, on peut expliquer l'élévation plus ou moins grande des eaux, par le plus ou moins de profondeur qu'elles ont.

6°. Si la hauteur  $\epsilon$  n'est que d'un petit nombre de pieds, on trouvera que la plus grande élévation est de

$\frac{3 \cdot 70695539 \cdot 3 \cdot 15 \cdot \epsilon}{2 \cdot 289 \cdot (365)^2 \cdot [1427]^2}$  pieds, quantité très-petite, lorsque  $\epsilon$  est au-dessous de 250 pieds : ce qui peut servir à expliquer, pourquoi l'action du Soleil & celle de la Lune, ne produisent aucun Flux dans les plus profondes rivières.]

S C O L I E III.

53. Si dans les calculs du Problème précédent, on supposoit  $3a\epsilon = b^2$ , alors  $Aa$  seroit infinie, & par conséquent fort grande par rapport à  $Pp$ ; c'est pourquoi on ne pourroit appliquer à ce cas-ci les calculs précédens, dans lesquels on a toujours supposé que  $Aa$  étoit fort petite par rapport à  $Pp$ . Pour avoir donc alors les vraies équations du mouvement du Fluide, il faut remarquer que  $Pp + AB = d(PA)$ , c'est-à-dire, que  $da + qda = du$ . Donc, faisant toujours  $AB = Pp = da$ ; on aura

$$(1) \dots \frac{dk(1+q)}{1-k} = dq + \frac{q d(\epsilon^{nV-1} - \epsilon^{-nV-1})}{\epsilon^{nV-1} - \epsilon^{-nV-1}},$$

&c

$$(2) \dots \frac{dk}{dn} = \frac{3S(\epsilon^{2nV-1} - \epsilon^{-2nV-1})}{4d^2pV-1} + \frac{dq \cdot (1+q) \epsilon k}{dn \cdot 2a}$$

n ij

Donc, faisant les réductions, & supposant la quantité  $\frac{c^u \sqrt{-1} - c^{-u} \sqrt{-1}}{2\sqrt{-1}} = z$ , on trouvera l'équation

$$(3) \dots \frac{35zx}{p d^2} + \frac{bbdq}{2a} - sdq - \frac{zdx}{z} = \frac{-zdg}{1+q} - \frac{k dq}{1+q} - \frac{qbbdq}{2a} - \frac{zqdx + kqdz}{z(1+q)}$$

Cette équation ne paroît point facile à intégrer, excepté dans le cas où  $k$  &  $q$  sont supposées des quantités fort petites; car alors on peut faire le second membre de l'équation égal à zero.

Cependant il est bon de remarquer, que cette équation peut être de quelque usage, pour déterminer aussi près qu'on voudra le mouvement du Fluide. Pour cela, on l'intégrera d'abord en négligeant le second membre, puis on l'intégrera de nouveau, en mettant dans le second membre les valeurs de  $q$  & de  $k$ , trouvées par la première intégration: ensuite de cette nouvelle valeur de  $q$ , on tirera une seconde valeur de  $k$ , par le moyen de l'équation (2), & cette valeur de  $k$  est exactement  $\frac{35zx}{2pd^2} +$

$$\frac{b^2q}{2a} + \frac{b^2q^2}{4a}$$

: substituant ces nouvelles valeurs de  $q$  & de  $k$ , dans le second membre de l'équation (3), on en tirera une seconde valeur de  $q$ , encore plus exacte, & ainsi de suite; & de cette manière on approchera de plus en plus de la vraie valeur des grandeurs  $q$  &  $k$ .

C O R O L L. IV.

54. Pour déterminer la constante  $\epsilon$ , au moins lorsqu'on suppose que  $k$  est fort petite par rapport à  $\epsilon$ ; on supposera que  $\epsilon'$  soit la hauteur du Fluide lorsqu'il est sphérique, & on trouvera aisément, que  $\epsilon' \cdot 2nr^2$  doit être égal à

$$\epsilon \cdot 2nr^2 - \frac{1S}{p d^3} \times \frac{2nr^3}{3} \times \frac{3a\epsilon}{3a\epsilon - b^2}.$$

Donc, on aura à peu

$$\text{près } \epsilon = \epsilon' + \frac{3S}{p d^3} \times \frac{3a\epsilon' \cdot r}{3(3a\epsilon' - b^2)}.$$

S C O L I E IV.

55. La quantité  $k$  étant proportionnelle au carré  $z^2$  du Sinus de l'arc  $PA$ , il s'ensuit que la surface du Fluide

est une Ellipse, dont la différence des axes est  $\frac{3S \cdot 1a\epsilon}{2p d^3 (3a\epsilon - b^2)}$ :

& il faut remarquer, que si  $3a\epsilon > b^2$ , on a toujours  $3a\epsilon > 3a\epsilon - b^2$ ; donc en ce cas l'Ellipse sera plus allongée vers le Soleil, que l'Ellipse dont le Fluide prendroit la figure, si le corps  $S$  étoit en repos, & dont les axes ne différoient (*art. 2 & 33*) que de la quantité

$\frac{3S}{2p d^3}$ . Si au contraire  $3a\epsilon < b^2$ , le Sphéroïde sera

applati sous l'Astre, & d'autant plus applati, que  $3a\epsilon$  sera plus grand ou plus petit par rapport à  $bb - 3a\epsilon$ : enfin, si  $b = 0$ , la différence des axes sera précisément

ment  $\frac{3S}{2p d^3}$ , telle qu'elle doit être en ce cas par les *art. 2*.

et 33 ; & cet accord peut servir à confirmer la bonté de nos Principes & de notre Théorie.

## SCOLIE V.

56. Si le corps *S* se meut toujours dans le plan de l'Equateur *PAR*, il est évident qu'il sera toujours à la même distance de chacun des deux Pôles, savoir à 90 degrés ; & qu'ainsi le Fluide qui est aux Pôles doit toujours conserver la même hauteur, & de plus, la même vitesse, s'il en a une. Ce qui d'ailleurs se déduit de nos calculs, puisque la vitesse & la hauteur ne changent point dès que *z* est constante : nouvelle remarque qui sert à confirmer encore notre Théorie.

## SCOLIE VI.

57. Si le Fluide est supposé d'abord sphérique, & divisé en cet état en couches sphériques concentriques d'un nombre infini, il est évident que la surface extérieure sera changée (*art.* 55) en une Ellipse, dont la différence des axes sera connue ; toutes les autres couches circulaires intérieures se changeront de même en couches Elliptiques, dont la différence des axes sera toujours proportionnelle à leur distance de la surface supérieure, ce qu'on peut prouver par un raisonnement semblable à celui de l'*art.* 17 : ainsi on trouvera de même que dans cet article, la vitesse & la direction absolue de chaque point.

## S C O L I E VII.

58. Nous avons supposé jusqu'à présent, que la Terre & le Fluide qui la couvroit se mouvoient autour d'un axe commun avec un égal mouvement angulaire, & c'est ce mouvement que nous avons transporté au corps S. Mais si par quelque raison que ce puisse être, la vitesse angulaire de la Terre & celle de l'air qui l'environne n'étoient pas égales, on supposeroit l'excès de la vitesse du Fluide sur celle de la Terre =  $\pm V$ ; & il faudroit donner au corps S cet excès de vitesse angulaire avec un signe & une direction contraire: ce qui ne seroit changer que la quantité constante  $b$  dans les calculs précédens, tout le reste demeurant comme ci-dessus.

## PROPOS. X. LEMME.

59. Soient deux plans ACG, BCG, (Fig. 18) perpendiculaires l'un à l'autre; & soit l'angle ACB un angle droit, aussi-bien que les angles GCB, GCA: soient menées dans les plans AG, BG, les lignes droites CE, CD, qui fassent avec AC, BC, des angles infiniment petits ACE, BCD. Je dis, que l'angle ECD peut être pris pour un angle droit.

Car  $DE^2 = AB^2 + BD^2 - AE^2 = BD^2 - AE^2 + AC^2 + CB^2 = BD^2 - AE^2 + CE^2 - AE^2 + CD^2 - BD^2 = CE^2 + CD^2 - 2AE^2$ . Donc EC ne diffère de  $CE^2 + AE^2$ , que d'une quantité infiniment petite du

second ordre ; donc l'angle  $ECD$  ne diffère d'un angle droit que d'un angle infiniment petit du second ordre : donc l'angle  $ECD$  peut être pris pour un angle droit.

PROPOS. XI. LEMME.

60. Les mêmes choses étant supposées que dans le Lemme précédent ; imaginons que le point  $C$  (Fig. 19) soit sollicité par trois puissances, dont l'une ( $p$ ) agisse suivant  $CG$ , les deux autres ( $\pi$  &  $\omega$ ) agissent, l'une dans le plan  $CGD$  perpendiculairement à  $CG$ , l'autre dans le plan  $GCE$  perpendiculairement à  $CG$  ; soit tirée par un point quelconque  $G$  de la ligne  $CG$  la perpendiculaire  $G\epsilon$  au plan  $ECD$ , & par le point  $\epsilon$ , où cette perpendiculaire rencontre le plan  $ECD$ , soient menées  $\epsilon d$ ,  $\epsilon e$ , perpendiculaires à  $CD$ ,  $CE$  : je dis, que si  $p : \pi :: CG : Cd$ , &  $p : \omega :: CG : Ce$  ; la force résultante des trois forces  $p$ ,  $\pi$ ,  $\omega$ , sera perpendiculaire au plan  $ECD$ .

Les puissances  $\pi$ ,  $\omega$ , qui (*hyp.*) sont perpendiculaires à  $CG$ , peuvent être supposées agir suivant  $CD$  &  $CE$ . Car il ne résultera de cette supposition qu'une erreur infiniment petite du second ordre ou même du troisième, dans la valeur & la direction de la puissance qui doit résulter des trois forces  $p$ ,  $\pi$ ,  $\omega$ . Or l'angle  $ECD$  est droit (*art.* 59) ; de plus, on a  $\pi : \omega :: Cd : Ce$  : donc la force résultante de  $\pi$  & de  $\omega$  sera suivant  $C\epsilon$ , & sera à  $p$ , comme  $C\epsilon$  est à  $CG$  ; donc la force qui résulte de cette dernière & de la force  $p$ , sera parallèle à  $C\epsilon$ , c'est-à-dire

c'est-à-dire perpendiculaire au plan  $ECD$ . *Ce qu'il falloit démontrer.*

## C O R O L L. I.

61. Réciproquement, si le point  $C$  est sollicité par une puissance quelconque, qui agisse perpendiculairement au plan  $ECD$ , on pourra toujours supposer que cette puissance se décompose en trois autres  $p, \pi, \varpi$ , qui agissent suivant  $CG, CD, CE$ , & qui soient entr'elles, comme  $CG, Cd, Ce$ .

## C O R O L L. II.

62. (\*) Les Principes qui viennent d'être démontrés peuvent servir à rendre raison, pourquoi les changemens qui arrivent dans la figure du globe terrestre en vertu des actions réunies du Soleil & de la Lune, sont presque égaux aux sommes des changemens produits par ces actions séparées. Car soient  $AL, AB$ , (Fig. 20) deux arcs infiniment petits, pris dans un grand cercle du globe, & supposons que l'angle des plans  $LAG, ABG$ , soit droit : imaginons ensuite que les points  $A, B, L$ , soient poussés en  $C, D, E$  par quelque force très-petite  $S$ , qui agisse sur les parties du globe suivant une loi quelconque ; & que ces mêmes points  $A, B, L$ , viennent en  $I, O, K$ , par l'action d'une autre force très-petite  $L$ , qui agisse aussi suivant une loi donnée ; je dis que les forces  $S$  &  $L$  agissant ensemble, feront descendre les points

o

$A, B, L$ , en  $P, S, R$ , de maniere que l'on aura  $BD + DS = BD + BO$ ;  $AC + CP = AC + AI$ ;  $LE + ER = LE + LK$ .

Car 1°. comme  $AC$  &  $CP$  sont fort petites (*hyp.*) par rapport à  $AG$ , les forces conjointes  $S, L$ , doivent être censées agir en  $P$ , comme elles agissent en  $C$  & en  $I$ .  
 2°. Soient  $p, \pi, \omega$ , les forces qui agissent sur le point  $C$  suivant  $CG$ , & suivant des lignes perpendiculaires à  $CG$ , dans les plans  $ABG, ALG$ ; on aura  $p : \pi :: AB : BD - AC$ ; &  $p : \omega :: AL : LE - AC$ ; de même, soient  $p', \pi', \omega'$ , les trois forces qui agissent de même sur le point  $I$ , on aura  $p : \pi' :: AB : BO - AI$ ; &  $p : \omega' :: AL : LK - AI$ . Donc  $p : \pi + \pi' :: AB : BS - AP$ ; &  $p : \omega + \omega' :: AL : LR - AP$ . Donc (*art. 60*) le point  $P$  est poussé par une force qui est perpendiculaire au plan  $RPS$ ; donc ce point  $P$  doit être en équilibre.

Quel que soit le nombre des forces  $S, L$  &c. la proposition présente sera toujours vraie, comme il est facile de le voir. Donc le changement total produit par l'action conjointe de ces forces, sera égal à la somme des changemens résultans des actions séparées.

[ On pourroit à la rigueur nous objecter, qu'il n'est pas nécessaire que  $DS = BO, CP = AI, \& ER = LK$ , pour que l'on ait  $p : \pi + \pi' :: AB : BS - AP$ , &  $p : \omega + \omega' :: AL : LR - AP$ ; qu'il suffit que  $DS - CP = BO - AI$ , & que  $ER - CP = LK - AI$ . Mais on remarquera qu'alors l'espace  $SDCER$ , ne seroit point égal à l'espace  $OBALK$ , ce qui est pourtant nécessaire, afin

que le Fluide conserve toujours la même masse & le même volume.

Il est évident par ce Corollaire, que l'action du Soleil & de la Lune sur un Fluide dont la figure diffère peu d'une Sphere, est la même que sur un Fluide sphérique: ce qui confirme ce que nous avons déjà dit dans l'art. 30 ci-dessus.]

PROPOS. XII. LEMME.

63. Soit donné un globe qui ait G (Fig. 21) pour centre; que PE, PA en soient deux grands cercles; AO un arc de petit cercle, dont le plan RAO soit perpendiculaire aux plans des cercles PA, PE: je dis

1°. Que si on fait PA ou PO = u; l'angle APO = A;

PG = 1, on aura AO = A × RO =  $\frac{A(e^{uV-1} - e^{-uV-1})}{2V-1}$ .

2°. Que si on suppose l'Arc infiniment petit Pp = da;

on aura pA - PA = pN =  $\frac{da(e^{AV-1} + e^{-AV-1})}{2}$ ; &

que l'angle NAP =  $\frac{PN}{\sin. PA} = \frac{PN}{AR} = \frac{pp \times \sin. A}{AR} = \frac{da.(e^{AV-1} - e^{-AV-1})}{e^{uV-1} - e^{-uV-1}}$ .

3°. Si on mène AZ perpendiculaire à OR, on aura

$\frac{AZ}{ZR} = \frac{e^{AV-1} - e^{-AV-1}}{V-1(e^{AV-1} + e^{-AV-1})}$ , qui est la tangente de

l'angle APO; & on trouvera que la tangente de l'angle ij

gle  $ApO$  est  $\frac{AZ}{ZR + Pp \times RG} = \frac{AZ}{ZR} - \frac{RG \cdot AZ \cdot Pp}{ZR^2} = \frac{AZ}{ZR} - \frac{RG \cdot AZ \cdot da}{ZR^2}$ . D'où il s'enfuit, que l'angle  $ApO = APO -$

la quantité  $\frac{RG \cdot AZ \cdot da}{ZR^2}$  divisée par  $1 + \frac{AZ^2}{ZR^2}$ ; ou (à cause de  $AZ^2 + ZR^2 = AR^2$ ) que l'on aura . . . . .  
 $ApO = APO - \frac{da \cdot \text{Sin. } A \cdot RG}{\text{Sin. } u} = APO - da \times \frac{(e^{AV-1} - e^{-AV-1}) \cdot (e^{uV-1} + e^{-uV-1})}{2(e^{uV-1} - e^{-uV-1})}$ .

4°. Prenant  $Pp$  pour constante, on aura  $\frac{pN}{Pp} = \text{Cof. } APO$ .

$$\text{Donc } d(pN) = Pp \times \frac{d(e^{AV-1} + e^{-AV-1})}{2} =$$

$$\frac{2da}{e^{AV-1} + e^{-AV-1}} \times \frac{e^{AV-1} - e^{-AV-1}}{2V-1} \times$$

$$\frac{du (e^{AV-1} - e^{-AV-1}) \cdot (e^{uV-1} + e^{-uV-1})}{(e^{AV-1} + e^{-AV-1}) \cdot (e^{uV-1} - e^{-uV-1})} =$$

$$\frac{da^2 \cdot (e^{AV-1} - e^{-AV-1})^2 \cdot (e^{uV-1} + e^{-uV-1})}{V-1 (e^{AV-1} + e^{-AV-1})^2 \cdot (e^{uV-1} - e^{-uV-1})}$$

5°. Soit  $QAK$  un grand cercle quelconque qui passe par le point  $A$ ; soit prise dans ce cercle la ligne  $Aa$  infiniment petite, & en même tems très-petite aussi par rapport à  $Pp$  & à  $pN$ ; soient menées les perpendiculaires  $ai$  sur  $PA$ , &  $ae$  sur  $OA$ ; imaginons ensuite que  $P$  vienne en  $p$ , & il est évident que  $Aa$  demeurant la

même, la ligne  $Ai$  décroîtra d'une quantité  $= Ae \times \text{angl. } PAN$ , & que la ligne  $Ae$  croîtra d'une quantité  $= Ai \times \text{angl. } PAN$ .

COROLLAIRE.

64. Comme  $Aa$  est très-petite par rapport à  $Pp$ , il s'ensuit, que si  $A$  vient en  $a$ , tandis que  $P$  vient en  $p$ , on peut toujours supposer que  $Ai$  décroît à peu près d'une quantité égale à  $Ae \times \text{angl. } PAN$ ; & que  $Ae$  croît au contraire d'une quantité  $= à Ai \times \text{angl. } PAN$ .

PROPOS. XIII. PROBLÈME.

65. Les mêmes choses étant supposées que dans la Prop. 9. art. 47, trouver le mouvement du Fluide, sans supposer que ses parties se meuvent dans les plans des cercles verticaux, qui passent par le corps  $S$ .

I.

Soit  $\epsilon$  la hauteur du Fluide en  $P$ ,  $\epsilon - k$  la hauteur en  $A$ ,  $k$  étant fort petite par rapport à  $\epsilon$ : imaginons que le point  $A$  parcourre  $Aa$ , tandis que  $P$  vient en  $p$ ; il est évident que dans l'instant suivant, ce point  $A$ , si rien ne l'en empêchoit, décroiroit dans le plan du cercle  $QAK$  la ligne  $aa = Aa$ ; de sorte que les lignes  $Ai$ ,  $Ae$ , qui changent de position en  $a$ , seroient à très-peu près

$$(\text{art. 64}) \quad Ai = Ae \times \frac{da (c^{AV-1} - c^{-AV-1})}{c^{uV-1} - c^{-uV-1}},$$

$$\& \quad Ae = + Ai \times \frac{da (c^{AV-1} - c^{-AV-1})}{c^{uV-1} - c^{-uV-1}}.$$

## II.

Maintenant, pour trouver la vitesse & la direction du point  $A$  dans un instant quelconque, il suffit de déterminer la vitesse qu'il aura en cet instant, tant dans le plan vertical par lequel passe le corps  $S$ , que dans le plan du petit cercle perpendiculaire à ce vertical; plans qui changent de position l'un & l'autre à chaque instant.

## III.

Soit donc  $Ai = qda$ ,  $Ae = nda$ ; il est évident que le Problème sera résolu, si on détermine les quantités  $q$  &  $n$ . Or ces quantités, aussi-bien que la quantité  $k$ , ne peuvent être que des fonctions des quantités  $u$  &  $A$ : supposons donc

$$\begin{aligned} dq &= rdu + \lambda dA \\ dn &= \gamma du + \epsilon dA \\ dk &= \rho du + \sigma dA. \end{aligned}$$

## IV.

Imaginant à présent que  $A$  soit parvenu en  $a$ , &  $P$  en  $p$ , la quantité  $nda$ , deviendra à très-peu près (art. 63. n. 2 & 3)  $da \times [n + \gamma \cdot pN + \epsilon \cdot (ApO - APO)] = da \times [n + \frac{\gamma da (e^{AV-1} + e^{-AV-1})}{2} + \epsilon \times \frac{-da (e^{AV-1} - e^{-AV-1}) \cdot (e^{uV-1} + e^{-uV-1})}{2(e^{uV-1} - e^{-uV-1})}] \dots (1)$

V.

Or si le point  $A$  n'étoit animé par aucune force accélératrice suivant  $Ae$ , la petite ligne décrite par le point  $A$  (tandis que le point  $P$  décrit  $pp' = Pp$ ) seroit

$$(n. I. art. pref.) n d\alpha + \frac{g d\alpha^2 \cdot (e^{AV-1} - e^{-AV-1})}{e^{nV-1} - e^{-nV-1}} \dots (2)$$

Donc la différence des quantités (1) & (2) exprime le petit espace que le point  $A$  parcourt en vertu de la force accélératrice qui le pousse suivant  $Ae$ ; si donc on appelle cette force  $\phi$ , il faut (suivant les noms de l'art. 47. n. IV.) que la différence des quantités (1) & (2) multipliée par  $\frac{b^2}{Pp^2}$ , soit à  $2a$ , comme  $\phi$  à  $p$ ; donc comme l'on a

$$\frac{b^2}{Pp^2} = \frac{b^2}{da^2}; \text{ il s'enfuit que } \dots$$

$$(E) \dots \phi = \frac{pb^2}{2ad\alpha^2} \times \left[ \frac{gd\alpha^2 \cdot (e^{AV-1} + e^{-AV-1})}{2} - \frac{gd\alpha^2 \cdot (e^{AV-1} - e^{-AV-1}) \cdot (e^{nV-1} + e^{-nV-1})}{2(e^{nV-1} - e^{-nV-1})} - \frac{gd\alpha^2 \cdot (e^{AV-1} - e^{-AV-1})}{e^{nV-1} - e^{-nV-1}} \right]$$

VI.

Si on appelle  $\pi$  la force accélératrice suivant  $Ai$ , on trouvera par un raisonnement semblable, que . . .

$$(F) \dots \pi = \frac{p b^2}{2 a d a^2} \times \left[ \frac{r d a^2 (e^{AV-1} + e^{-AV-1})}{2} - \lambda d a^2 \times \frac{(e^{AV-1} - e^{-AV-1}) \cdot (e^{uV-1} + e^{-uV-1})}{2 (e^{uV-1} - e^{-uV-1})} + \frac{r d a^2 \cdot (e^{AV-1} - e^{-AV-1})}{e^{uV-1} - e^{-uV-1}} \right].$$

## VII.

Or comme le point  $A$  est sollicité de se mouvoir suivant  $AP$ , par une force égale à  $\frac{3S(e^{2uV-1} - e^{-2uV-1})}{4d^2V-1}$ , & que les forces accélératrices suivant  $Ae$ , &  $Ai$ , sont  $\phi$  &  $\pi$ , il faut (*art. 12. not. (a) §. II.*) que la force  $\frac{3S}{d^2} \times \frac{e^{2uV-1} - e^{-2uV-1}}{4V-1} + \pi$  agissant suivant  $AP$ , fasse équilibre avec la force  $\phi$  agissant suivant  $AO$ , & avec la force  $p$  qui agit suivant  $AG$ . Donc la force qui résulte de ces trois forces doit être perpendiculaire à la surface du Fluide, c'est-à-dire, perpendiculaire à cette partie de la surface supérieure du Fluide, dont  $iAe$  doit être censée la projection sur la surface du globe solide. Donc (*art. 60 & 61*) il faut 1°. que la force résultante de la force  $p$ , & de la force  $\phi$  agissant suivant  $AO$ , soit perpendiculaire à la section de la surface du Fluide, dont  $AO$  est la projection, & qu'elle soit dans le plan  $AeG$ . 2°. Que la force qui résulte de  $p$ , & de  $\frac{3S}{d^2} \times$

(c

$\frac{e^{2n\sqrt{-1}} - e^{-2n\sqrt{-1}}}{4\sqrt{-1}} + \pi$  soit perpendiculaire à la section dont  $PAi$  est la projection, & soit dans le plan  $APG$ : d'où l'on tire les équations suivantes;

$$(G) \dots \dots \frac{3S(e^{2n\sqrt{-1}} - e^{-2n\sqrt{-1}})}{4d\sqrt{-1}} + \pi = p\varphi$$

&

$$\varphi = \frac{p \cdot r \cdot dA}{dA(e^{n\sqrt{-1}} - e^{-n\sqrt{-1}})} \text{ ou } \frac{p \cdot r \cdot dA}{2\sqrt{-1}}$$

$$(H) \dots \dots \varphi = \frac{2p \cdot r \cdot \sqrt{-1}}{e^{n\sqrt{-1}} - e^{-n\sqrt{-1}}}$$

### VIII.

Prenons maintenant quatre points  $A, B, C, D$ , (Fig. 22) infiniment proches l'un de l'autre, qui soient dans les grands cercles  $PA, PB$ , & dans les petits cercles  $BA, DC$  perpendiculaires aux plans  $PA, PB$ ; & supposons que lorsque  $P$  vient en  $p$ , les points  $A, B, C, D$ , viennent en  $a, b, c, d$ ; la quantité dont la hauteur du fluide décroîtra dans le point qui est verticalement élevé au-dessus de  $A$ , fera (art. 46)  $\epsilon \times (\frac{Cu - Ai}{AC} + \frac{Bo - Ae}{AB} +$

$$\frac{Ai \times d(\sin. PA) \cdot AC}{AC \cdot \sin. PA \cdot du}$$

Or  $\frac{Cu - Ai}{AC} = \frac{da \cdot r \cdot AC}{AC} = r da$ ;

$$\& \frac{Bo - Ae}{AB} = \frac{da \cdot (\zeta. AB. 2\sqrt{-1})}{AB(e^{n\sqrt{-1}} - e^{-n\sqrt{-1}})}$$

P

$$(I) \dots \dots \dots \frac{(c^{AV-1} + c^{-AV-1})}{2} \times \frac{e da}{s} -$$

$$\frac{e da \cdot (c^{AV-1} - c^{-AV-1}) \cdot (c^{nV-1} + c^{-nV-1})}{21(c^{nV-1} - c^{-nV-1})} = r d\alpha +$$

$$\frac{c da \cdot 2V-1}{s^{nV-1} - c^{-nV-1}} + q d\alpha \times \frac{d(c^{nV-1} - c^{-nV-1})}{dn(c^{nV-1} - c^{-nV-1})}$$

## I X.

De-là on peut tirer les équations nécessaires pour déterminer le mouvement du Fluide. Car si dans les équations *G*, *H*, on met pour  $\phi$  &  $\pi$  leurs valeurs, données par les équations *E* & *F*, on aura outre l'équation (I) deux autres équations, qui ne contiendront que les inconnues *q*, *n*, *k*, avec les indéterminées *A* & *u*, & leurs différences.

## S C O L I E I.

66. Il paroît difficile de pouvoir déduire de ces équations la détermination du mouvement du Fluide. Cependant elles font connoître, que si on n'avoit aucun égard à la tenacité & à l'adhérence mutuelle des parties du Fluide, on ne pourroit pas faire en même tems les deux hypothéses suivantes : savoir, que le Fluide se meuve toujours dans le plan d'un vertical passant par l'Astie, & que le solide dans lequel la masse du Fluide est changée par l'action du corps *S*, soit un Sphéroïde qui ait pour axe la ligne joignant les centres de la Terre & du

corps  $S$ . En effet, pour que le Fluide ait une figure Sphéroïdale, il faut que  $\sigma dA = 0$ , parce que tous les plans qui passent par l'axe  $PG$ , font alors (*hyp.*) des sections semblables & égales sur la surface du solide. Donc  $\sigma = 0$ , & par l'équation  $H, \phi = 0$ ; donc la partie du mouvement du corps  $A$  qui est perpendiculaire au vertical  $AP$ , aura tout son effet, puisque la force accélératrice ou retardatrice qui agit en ce sens, sera nulle; donc le mouvement du corps  $A$  ne sera pas dans le seul plan vertical  $AP$ .

## S C O L I E II.

67. On peut confirmer la même chose par le raisonnement suivant. Supposons que dans tel instant qu'on voudra la figure du Fluide soit Sphéroïdale, & que la direction d'une particule quelconque  $A$  du Fluide, (Fig. 23) soit dans le vertical correspondant  $AP$ ; la particule  $A$  décrira donc par ex. la ligne  $Aa$ , tandis que  $P$  viendra en  $p$ ; & dans l'instant suivant, elle tendra à décrire la ligne  $aa' = Aa$ . Or imaginons que dans cet instant elle décrive réellement la ligne  $aa$ , dans le plan  $pa$ ; donc, puisque la vitesse  $aa'$  est composée de  $aa$ , & de  $a'a'$ , il s'ensuit que la vitesse  $aa'$  doit être telle qu'elle soit détruite; donc (*art. 60 & 61*) les forces accélératrices représentées par  $oa$ , &  $a'o$  doivent faire équilibre chacune séparément avec la gravité. Or (*hyp.*) la section faite par le plan  $a'o$  est un cercle: donc la force accélératrice  $a'o$  ne peut être anéantie; donc elle

produira nécessairement un certain mouvement ; & ce mouvement ne fera pas le même pour toutes les parties du Fluide , puisque dans le plan  $pPE$  il sera nul , & que de l'autre côté de ce plan , il aura une direction contraire. Donc la masse du Fluide perdra sa figure Sphéroïdale ; & le mouvement du point  $A$  ne pourra être pendant deux instans de fuite dirigé dans les plans verticaux qui passent par le corps  $S$ . De-là il s'ensuit , que l'on ne peut avoir à la fois  $\eta = 0$  , &  $\sigma = 0$ .

## C O R O L L. I.

68. Si on suppose (la figure du Fluide n'étant point Sphéroïdale) que tous ses points se meuvent dans les verticaux correspondans, c'est-à-dire, si on fait  $\eta = 0$  , & par conséquent  $\epsilon = 0$  ,  $\gamma = 0$  ; on aura  $q =$

$$\frac{-4aV^{-1} \cdot r}{b^2(c^{AV^{-1}} - c^{-AV^{-1}})} ; \text{ donc les quantités } r \text{ \& } \lambda \text{ se trouveront en différenciant la quantité } \frac{-4a\sigma V^{-1}}{b^2(c^{AV^{-1}} - c^{-AV^{-1}})}.$$

On substituera ensuite ces valeurs des quantités  $r$  &  $\lambda$  , dans les équations  $F$  &  $I$  , & on en tirera les valeurs des quantités  $\frac{d\sigma}{du}$  &  $\frac{d\sigma}{dA}$  (†) en  $\rho$  & en  $\sigma$ . Donc si on

(†) Par  $\frac{d\sigma}{du}$  &  $\frac{d\sigma}{dA}$  , j'entends les coefficients qu'auroient  $dA$  &  $du$  dans la différentielle de  $\sigma$ . En général , j'entendrai toujours dans la suite par  $\frac{dL}{dA}$  &  $\frac{dL}{du}$  , les coefficients de  $dA$  & de  $du$  , dans

intégrer la seconde de ces équations, en faisant varier  $u$  seulement, & ensuite la première, en ne faisant varier que  $A$ , & en mettant pour  $\frac{d\sigma}{du}$  sa valeur  $\frac{d\sigma}{dA}(\dagger)$ , il faut que la quantité  $\varrho$  soit telle, que les deux valeurs de  $\sigma$  tirées de ces équations, soient les mêmes. De plus, comme  $\varrho du + \sigma dA$  doit être une différentielle complète;

il faut que  $\frac{d\varrho}{dA} = \frac{d\sigma}{du}$ ; donc la quantité  $\varrho$  doit aussi satis-

faire à cette nouvelle condition : or quelle est cette quantité  $\varrho$ ? Est-il même possible de la trouver? c'est de quoi je n'ai pu m'assurer jusqu'à présent, soit faute de tems, soit faute des méthodes analytiques nécessaires.

[Toute la difficulté se réduit à trouver la valeur de  $\varrho$  en  $A$  & en  $u$ . Car comme on peut avoir aisément la valeur de  $\sigma$  en  $\varrho$ , on s'assureroit facilement ensuite, si  $\frac{d\sigma}{du} = \frac{d\sigma}{dA}$  : or pour avoir la valeur de  $\varrho$ , il faut d'abord

mettre dans l'équation  $I$ , au lieu de  $\frac{d\sigma}{du}$  sa valeur  $\frac{d\sigma}{dA}$ , &

l'on tirera de cette équation une valeur de  $\sigma$  en  $A, u, \varrho$ , &  $d\varrho$ ; on différenciera cette valeur, en ne faisant varier que  $A$ , & on égalera cette différentielle à la valeur de  $\frac{d\sigma}{dA} \times dA$ , qu'on tirera de l'équation  $F$ , après y avoir

la différentielle de la variable quelconque  $L$ , que je suppose être une fonction de  $A$  & de  $u$ .

(†) Voyez les Mém. de l'Acad. de Petersb. p. 177. T. 7.

substitué la valeur de  $\pi$  tirée de l'équation  $G$ , & écrit  $\frac{d\epsilon}{dA}$  au lieu de  $\frac{d\sigma}{du}$ . Cette équation sera une équation différentielle du second ordre, qui étant intégrée, en ne faisant varier que  $A$ , donneroit la valeur de  $\epsilon$ . Tout se réduit donc à intégrer cette équation; mais c'est ce qui me paroît difficile.

Au reste, on verra dans l'*art.* 74 *n.* 2. que la supposition de  $\pi = 0$  peut être admise dans le Problème dont il s'agit, sinon Mathématiquement, au moins Physiquement.]

#### COROLL. II.

69. Si on fait maintenant  $\sigma = 0$ ,  $\pi$  n'étant point  $= 0$ , c'est-à-dire, si la figure du Fluide est supposée Sphéroïdale, sans que la direction des parties du Fluide soit dans les verticaux correspondans, on trouvera de même les conditions de ce cas, soit qu'elles soient possibles ou non, ce qui ne me semble pas aisé à déterminer.

#### SCOLIE III.

70. Pour tirer des équations du Problème précédent la vitesse du vent, autant qu'il est possible, on cherchera d'abord la vitesse du vent dans le plan vertical qui passe par l'Astre, & pour parvenir d'abord à la déterminer à peu près, on commencera par traiter dans toutes les équations précédentes, les quantités  $n, \gamma, \epsilon, \lambda, \sigma$ , com-

me nulles, parce qu'on ne considère ici que le mouvement du Fluide dans le seul plan vertical : on aura donc

$$(G') \dots \frac{3S(e^{2nV-1} - e^{-2nV-1})}{4d^2V-1} + \frac{pb^2 \cdot \ln \cdot (e^{AV-1} + e^{-AV-1})}{4adn}$$

$$= \frac{pdk}{dn} ; \&c$$

$$(I') \dots \frac{(e^{AV-1} + e^{-AV-1})}{2} \times \frac{dk}{dn} = \frac{dq}{dn} + q \times$$

$\frac{d(e^{nV-1} - e^{-nV-1})}{dn(e^{nV-1} - e^{-nV-1})}$ . Donc si on traite  $A$  comme constante, & qu'on fasse

$$\frac{2}{e^{AV-1} + e^{-AV-1}} - \frac{b^2}{2ad} \times \frac{(e^{AV-1} + e^{-AV-1})}{2} = \lambda,$$

&  $\frac{2}{e^{AV-1} + e^{-AV-1}} = \frac{1}{F}$  ; on aura (en intégrant comme

dans l'art. 47)  $q = \frac{1S}{1pd^2} \times \frac{2z}{2\lambda + \frac{1}{F}}$  ; ou  $q = \frac{3S2z}{1pd^2} \times$

$$\frac{(e^{AV-1} + e^{-AV-1})}{2 [3 - \frac{b^2 \cdot (e^{AV-1} + e^{-AV-1})^2}{4ad}]}$$

&  $k = \frac{3S2z}{2pd^2} + \frac{3S2zbb}{2pads^2}$

$$\frac{(e^{AV-1} + e^{-AV-1})^2}{4 [3 - \frac{b^2 \cdot (e^{AV-1} + e^{-AV-1})^2}{4ad}]^2} = \frac{3S2z}{2pd^2} \times$$

$$\frac{3}{3 - \frac{b^2 \cdot (e^{AV-1} + e^{-AV-1})^2}{4ad}}$$

[Supposant que le Soleil décrive l'Equateur, & que  $y$  soit le Sinus de la latitude d'un lieu donné, il n'est pas difficile de voir, que les deux limites des valeurs de  $k$ , sont les valeurs de cette quantité, lorsque le Soleil est au Méridien, & lorsqu'il est éloigné de  $90^\circ$  du Zenith du lieu proposé. De plus, il est aisé de se convaincre, que dans le premier cas  $z$  sera égal à  $y$ , & qu'on aura

$$\frac{e^{AV-1} + e^{-AV-1}}{2} = 0, \text{ \& que dans le second cas on}$$

$$\text{aura } z = 1, \text{ \& } \frac{e^{AV-1} + e^{-AV-1}}{2} = \sqrt{1-yy}, \text{ c'est-}$$

à-dire au Sinus du complément de la latitude. Les deux

valeurs de  $k$  feront donc  $\frac{3S\gamma}{2p^{\Delta^3}}$  le premier cas, &  $\frac{3S}{2p^{\Delta^3}} \times$

$\frac{3}{3 - \frac{b^2}{a^2}(1-yy)}$  dans le second. Si on retranche la pre-

miere de ces quantités de la seconde, en supposant

$3 > \frac{b^2}{a^2}(1-yy)$ , on aura pour leur différence  $\frac{3S}{2p^{\Delta^3}} \times$

$(1-yy) \cdot \left(3 + \frac{2\gamma b^2}{a^2}\right)$   
 $\frac{3 - \frac{b^2}{a^2}(1-yy)}$ , qui est proportionnelle à la va-

riation du Barometre dans les lieux où  $3 > \frac{b^2}{a^2}(1-yy)$ .

Si au contraire  $3 < \frac{b^2}{a^2}(1-yy)$ , il faudra ajouter ensemble les deux valeurs de  $k$ , après avoir changé les signes

signes du dénominateur de la seconde, afin de la rendre positive, & l'on aura

$$\frac{(1-yy) \cdot (3 + \frac{yyb^2}{a^2})}{-3 + \frac{bb}{a^2}(1-yy)},$$

quantité proportionnelle à la variation du Barometre. Donc

1°. Si  $a = 850 \times 32$ , de maniere que  $3a^2 < b^2$ , il y aura entre l'Equateur & le Pôle un parallèle où les variations du Barometre seront fort considérables, savoir celui où  $1 - yy$  sera égal à  $\frac{3a^2}{b^2}$ .

2°. Depuis ce parallèle jusqu'à l'Equateur, le Barometre baissera à mesure que le Soleil approchera du Méridien; dans les autres parallèles jusqu'au Pôle, il haussera à mesure que le Soleil approchera du Méridien.

3°. L'expression que nous avons trouvée, & qui représente la variation du Barometre, se peut changer en

$$(1-yy) \times (1 + \frac{b^2}{a^2 [3 - \frac{b^2}{a^2}(1-yy)]})$$

laquelle est d'autant moindre que  $y$  est plus grande, si  $3 > \frac{b^2}{a^2}(1-yy)$ .

4°. Si on suppose  $a = 850 \times 32$ , comme ci-dessus, on aura  $3a^2 = 1224000$ , &  $b^2 = (1427)^2 = 2036329$ ,

par conséquent  $3a^2 < b^2$ ; & faisant  $y < \text{ou} = \frac{1}{2}$ , on

aura  $3a^2 > b^2(1-yy)$ : ainsi dans nos climats la variation du Barometre diminuera à mesure qu'on approchera du Pôle. On trouvera par le calcul, que vers le

milieu de la Zône tempérée que nous occupons, la variation du Barometre doit être à peu près égale à la variation sous l'Equateur. Or comme (*art.* 52) cette dernière ne va guères qu'à 3 lignes, il s'ensuit que la variation du Barometre doit être assez petite dans nos climats, entant qu'elle est causée par l'action du Soleil & de la Lune.

5°. Il est évident (*art.* 48), que si  $s = 850 \times 32$ , on aura un vent d'Est perpétuel sous l'Equateur, & que dans les endroits dont la latitude est telle que  $3as > b^2 (1 - y^2)$  ce vent d'Est se changera, pour l'Hémisphère Boreal, en vent d'Ouest & de Sud l'après-midi, & d'Ouest & de Nord le matin, & pour l'Hémisphère Austral, en vent d'Ouest & de Nord l'après-midi, & en vent d'Ouest & de Sud le matin. Nous laissons au Lecteur à pousser plus loin ces détails & à les comparer avec les observations, avec lesquelles il me paroît que nos calculs s'accordent assez bien, autant que le permettent les causes accidentelles, & la chaleur ainsi que le ressort de l'air dont nous faisons abstraction ici.]

## S C O L I E IV.

71. De ces valeurs de  $q$  & de  $k$ , il s'ensuit évidemment, 1°. que si l'angle  $A$  est infiniment petit, auquel cas

$$\frac{e^{AV-1} + e^{-AV-1}}{2} = 1, \text{ on aura } q = \frac{3Sxz}{p^2d^3} \times \frac{1}{3 - \frac{b^2}{a^2}}; \text{ \&}$$

$$k = \frac{3Sxz \times 3a^2}{2p^2d^3 \times (3a^2 - b^2)}; \text{ ce qui s'accorde avec l'art. 47.}$$

2°. Si  $A = 90^{\text{degr.}}$ , c'est-à-dire, si on chetche la viteſſe du vent lorsque l'Aſtre eſt au Méridien, on aura  $\frac{e^{AV-1} - e^{-AV-1}}{2} = 0$ : donc  $q = 0$ , &  $k = \frac{35z}{2p d^2}$ ; d'où

il s'enſuit, que quand le Soleil, par exemple, eſt au Méridien, la viteſſe du vent dans le ſens de ce cercle doit être nulle, & que la hauteur de l'air à un point quelconque du Méridien doit être la même, qu'elle feroit (*art. 2 & 33*) ſi le Soleil étoit en repos. Ce qui d'ailleurs paroît en effet devoir être ainſi, comme on peut le prouver par le raifonnement ſuivant: le Soleil ne change point ſenſiblement de hauteur & de diſtance, par rapport aux lieux qui ſont ſitués ſous un Méridien, pendant un certain intervalle de tems, avant & après ſon paſſage par ce Méridien; donc l'air qui eſt au-deſſus de ce Méridien eſt alors à peu près dans le même cas, que ſi le Soleil étoit immobile; donc il doit prendre & conſerver pendant quelque tems la figure qu'il auroit, ſi le Soleil étoit véritablement en repos.

S C O L I E V.

72. Ayant trouvé les premieres expreſſions des valeurs de  $q$  & de  $k$ , on ſubſtituera dans ces valeurs

$\frac{e^{uV-1} - e^{-uV-1}}{2V-1}$ , au lieu de  $z$ ; on différenciera ces quantités,

en faiſant varier  $u$  &  $A$ ; par la différenciation de  $k$ , on aura la quantité  $\sigma$ , & par l'équation  $H$ , la quantité  $\phi$ ; enſuite par l'équation  $(I)$  on trouvera  $\xi$ ; & com-  
q ij

me  $\gamma du + \epsilon dA$  doit être une différentielle complète, on aura facilement  $\gamma$ ; car  $\frac{d\gamma}{dA} = \frac{d\epsilon}{du}$ : donc  $\gamma = \int dA \times \frac{d\epsilon}{du}$ ; ainsi on aura  $n = \int \gamma du + \epsilon dA$ , & par conséquent on connoîtra à peu près (†) la vitesse du vent dans un plan perpendiculaire au vertical de l'Astre.

Cette première valeur de  $n$  servira à déterminer plus exactement les valeurs de  $q$  & de  $k$ , en prenant toujours  $A$  pour constante, comme dans le premier calcul: ensuite on tirera de ces nouvelles valeurs de  $q$  & de  $k$  une valeur encore plus exacte de  $n$ , de même qu'on a tiré la première valeur de  $n$ , des premières valeurs de  $q$  & de  $k$ .

## S C O L I E VI.

73. Il suit de ce qui précède, que la vitesse du vent, (abstraction faite de la tenacité & du frottement des parties du Fluide) est nulle quand l'Astre est au Méridien; quelle est la plus grande qu'il est possible à l'Equateur; que de plus, les sections du Fluide dans le plan de l'Equateur & du Méridien ne sont point des Ellipses semblables & égales: donc si on veut supposer (comme dans

---

(†) On pourroit encore avoir  $\epsilon$  par l'équation  $E$ ; & comme la valeur qu'on aura par cette équation sera différente de celle que donne l'équation  $(I)$ , il me semble qu'on pourroit conclure de-là, que le Problème dont il s'agit a plusieurs solutions. On se confirmera dans cette pensée, si on fait attention à ce que contient le Scolie VII. suivant, art. 74.

*l'art. 47*) qu'en vertu de la tenacité des parties, la figure du Fluide est Sphéroïdale, & que le Fluide se meut toujours dans le vertical de l'Astre, il paroît que le seul parti qu'on puisse prendre, c'est de faire la vitesse du vent, & la section du Fluide dans un vertical quelconque, égales à la vitesse & à la section du Fluide moyenne entre l'Equateur & le Méridien; c'est-à-dire, qui répond à l'angle  $A$  de  $45^\circ$ . Donc faisant  $\frac{c^{AV-1} + c^{-AV-1}}{2} = V^{\frac{1}{2}}$ ; on

$$\text{aura } q = \frac{3Sxz}{1pd^3} \times \frac{1}{V^2 \times (3 - \frac{b^2}{2a^2})}; \text{ \& } k = \frac{3Sxz}{1pd^3} \times \frac{3}{3 - \frac{b^2}{2a^2}}.$$

S C O L I E VII.

74. Si on cherche les valeurs des quantités  $n, q, k$ , dans les lieux qui sont près de l'Equateur, c'est-à-dire dans les lieux où  $A$  est infiniment petit, on remarquera que ces quantités  $n, q, k$  sont des fonctions de  $u$  & de  $A$ , telles, que quand  $A=0$ ,  $n$  est  $=0$ , &  $q$  &  $k$  des fonctions de  $u$ . Donc si on réduit les valeurs de  $n, q, k$ , en suites infinies, on aura, lorsque  $A$  est infiniment petit,

$$n = V \cdot A^n$$

$$q = V^m + V^{m'} A^h$$

$$k = V^l + V^{l'} A^r$$

$V, V', V'', V^l, V^{l'}$ , &c. marquant des fonctions de  $u$ , &  $n, h, r$ , des exposans positifs. On differentiera ces trois quantités pour avoir  $r, \gamma, \lambda, \epsilon, \rho, \sigma$ , & on substituera  $q, ij$

tuera pour  $\frac{e^{AV-1} + e^{-AV-1}}{2}$  sa valeur qui est presque 1,

& pour  $\frac{e^{AV-1} - e^{-AV-1}}{2V-1}$  sa valeur qui est presque  $A$ ,

lorsque  $A$  est fort petit: négligeant ensuite tous les termes qui peuvent se négliger, on aura . . . . .

$$(a) \dots \frac{3S}{4p d^3 V-1} \times (e^{2NV-1} - e^{-2NV-1}) + \frac{b^2}{2A} \times \frac{dV''}{dU} = \frac{dV'}{dU}$$

$$(b) \dots \left[ \frac{b^2 dV}{2A \cdot dU} - \frac{nb^2}{2A} \times \frac{V(e^{NV-1} + e^{-NV-1}) \times 2V-1}{e^{NV-1} - e^{-NV-1}} \right] \times$$

$$A^n = \frac{bbV'' A \cdot 2V-1}{2A(e^{NV-1} - e^{-NV-1})} = \frac{2bV'' A^{n-1} V-1}{e^{NV-1} - e^{-NV-1}}$$

$$(c) \dots \dots \dots \frac{dV'}{dU} = \frac{dV''}{dU} + \frac{nV \cdot A^{n-1} \cdot 2V-1}{e^{NV-1} - e^{-NV-1}} + \frac{V'' d(e^{NV-1} - e^{-NV-1})}{dU(e^{NV-1} - e^{-NV-1})}$$

Il faut observer que dans la seconde équation, je n'ai point négligé les termes où sont  $A^{n-1}$  &  $A^n$ , parce que si on supposoit  $n = 2$ , &  $n = 1$ , les termes où sont ces quantités seroient homogènes au terme . . .

$\frac{-b^2 V'' AV-1}{A(e^{NV-1} - e^{-NV-1})}$ : c'est pour la même raison, que dans

l'équation (c) je n'ai point négligé le terme où est  $nA^{n-1}$ .  
De plus, si on décomposoit la force accélératrice

par laquelle l'Astre agit sur les parties du Fluide, en deux autres forces, dont l'une fût parallèle à l'Equateur, & l'autre lui fût perpendiculaire; il est évident que cette dernière force seroit infiniment petite du premier ordre par rapport à l'autre: donc si elle produit un effet, on peut supposer que cet effet est toujours infiniment petit du premier ordre par rapport à l'effet de l'autre force. Pour le bien voir, on remarquera que  $A$  étant infiniment petit du premier ordre, on peut supposer en même tems, ou que  $n$  est proportionnel à  $A$ , & que par conséquent  $V \cdot A^n = V \cdot A$ , ou que  $n$  est absolument nulle. Car si la quantité  $n$  est, ou absolument nulle, ou  $= V \times A^{n-1}$  ( $p$  désignant un nombre positif quelconque) alors les termes dans lesquels  $V$  entre, doivent être traités comme nuls: en ce cas, la force qui agit dans le sens du cercle  $AO$  (Fig. 21), sera telle, qu'elle sera équilibre avec  $p$ ; c'est ce qui arrivera, si dans l'équation ( $b$ ) on suppose  $m = 2$ ,  $2V^n = -\frac{bbv''}{2a}$ ; &  $V$ , &  $\frac{dv}{du} = 0$ , ou bien si on suppose simplement  $A^n > A$ . Donc  $A^n$  doit être supposée  $= 0$ , ou  $= A$ .

1°. Si on a  $m = 2$ ,  $n = 1$ ; les deux équations ( $a$ ), ( $c$ ) donneront une valeur de  $V$  en  $u$  & en  $V''$ , & cette valeur étant substituée dans l'équation ( $b$ ) produira une équation différentielle du second ordre, qui contiendra les inconnues  $V'''$  &  $V''$ . Ainsi la solution du Problème sera différente, selon les différentes valeurs que l'on voudra donner à l'une ou à l'autre de ces quantités.

2°. Si l'on a  $\varpi = 2$ , &  $V = 0$ ; on aura pour  $V''$  & pour  $V'''$  les mêmes valeurs que dans l'*art.* 47, & outre cela on trouvera  $V''' = -\frac{bV'}{4a}$ .

On déterminera de la même manière les valeurs de  $V''$  & de  $V'$ , selon les différentes hypothèses qu'on fera sur les exposans  $\varpi$  &  $n$ , & sur les quantités  $V$  &  $V''$ .

D'où l'on voit que le Problème qui consiste à trouver la vitesse & la direction du vent est en quelque sorte indéterminé: ce qui ne doit pas paroître absolument surprenant, puisque dans les autres hypothèses dont on a déjà fait mention dans les *art.* 39 & 50, on a trouvé pour l'expression de la vitesse du vent, des quantités qui contenoient des constantes indéterminées, & d'où il résulroit que le Problème pouvoit avoir plusieurs solutions.

[ Dans cette incertitude cependant, il me semble que nous pouvons nous déterminer pour l'expression de la vitesse du vent, que nous venons de trouver dans le cas de  $V = 0$ , & de  $\varpi = 2$ , parce que cette expression s'accorde d'ailleurs avec celle que nous avons trouvée dans l'*art.* 47, & qui, comme nous l'avons prouvé, doit être assez exacte pour les lieux qui sont proches de l'Equateur: d'ailleurs cette même expression que nous venons de trouver pour la vitesse du vent, dans le cas de  $V = 0$ , &  $\varpi = 2$ , a beaucoup de rapport avec celles que nous avons déjà trouvées *articles* 39 & 50 dans d'autres hypothèses; de sorte qu'il paroît constant que la vitesse du vent doit être à peu près comme le quarré

quarré du Sinus de la distance au corps  $S$ , puisque ce rapport résulte de toutes ces différentes formules.

Ainsi nous croyons pouvoir prendre pour l'expression de la vitesse du vent proche l'Equateur, celle qui a été trouvée dans l'*art.* 47, en négligeant entièrement la vitesse du vent dans le sens perpendiculaire aux cercles verticaux; car on peut toujours supposer, soit Physiquement, soit Mathématiquement, que cette vitesse est nulle. D'où il s'ensuit, que comme la vitesse du vent dans le sens du cercle  $AO$  perpendiculaire au vertical  $PA$ , est nulle proche de l'Equateur, & qu'elle est aussi nulle proche des Pôles (*art.* 72) le mouvement de l'air dans une direction perpendiculaire aux cercles verticaux, est peu considérable. On peut donc négliger tout-à-fait ce mouvement, & n'avoir égard qu'à la seule vitesse de l'air dans le plan du cercle vertical. Ainsi les formules de l'*art.* 70, qu'on pourra, s'il est nécessaire, rendre plus approchées, exprimeront assez bien la vitesse du vent en un endroit quelconque du globe terrestre. ]

Au reste, il est à propos d'observer que dans les lieux même qui sont très-proches de l'Equateur, l'angle  $A$  ne doit pas être regardé comme fort petit pendant tout le tems d'une révolution. Car lorsque l'Astre est, par exemple, au Méridien d'un lieu situé proche l'Equateur, l'angle  $A$  qui est alors l'angle du Méridien avec l'Equateur, est de  $90^{\text{deg}}$ ; il n'y a que les seuls points de l'Equateur pour lesquels  $A$  soit exactement  $= 0$ , parce que  $A$  exprime toujours l'angle du vertical avec l'Equateur. De-

là on peut conclure, que dans la valeur de  $q$  déterminée *art.* 70, la quantité  $\frac{e^{AV-1} + e^{-AV-1}}{2}$  doit toujours être prise positivement; car dans l'Equateur, où  $A=0$ , on a toujours  $\frac{e^{AV-1} + e^{-AV-1}}{2} = 1$ , & par conséquent positif: or dans les lieux voisins de l'Equateur, le mouvement doit être à peu près le même que dans l'Equateur; d'où il s'enfuit que  $\frac{e^{AV-1} + e^{-AV-1}}{2}$  doit être pris positivement.

SCOLIE GENERAL.

75. Si donc on demande la vitesse & la direction du vent, dans l'hypothese que le globe terrestre soit couvert d'un air homogene, rare, & sans ressort; on peut la déterminer de la maniere suivante.

1°. Si on n'a point d'égard à l'adhérence & au frottement des parties du Fluide, on ne sçauroit donner une autre solution que celle qui a été trouvée dans les *art.* 70 & 72, en résolvant par approximation les équations du Problème.

2°. Si on a égard à la tenacité & au frottement, hypothese qui est peut-être plus conforme à la nature, que la précédente; alors pour trouver le mouvement de l'air dans les endroits voisins de l'Equateur, on peut se servir de la méthode qui a été donnée dans l'*art.* 69, & il paroît qu'on peut négliger entièrement, pour les raisons

qui ont été déjà rapportées dans l'*art.* 74, la vitesse du vent dans les plans perpendiculaires aux plans verticaux de l'Astre. De plus, si on suppose dans ce cas l'adhérence des parties telle, que tous les lieux également distans de l'Astre, aient la même vitesse, & que le Fluide ait une forme Sphéroïdale, alors il faudra se servir des expressions qui ont été trouvées dans l'*art.* 73. Voilà, ce me semble, ce qu'on peut donner de plus approché sur la vitesse des vents. C'est ainsi qu'on doit résoudre le Problème pour le cas où le Soleil parcourt l'Equateur. S'il ne décriroit point ce grand cercle, mais un des parallèles, alors les équations nécessaires pour trouver le mouvement du Fluide deviendroient plus composées, & il faudroit avoir recours à l'*art.* 42, pour trouver l'expression de la véritable action du corps *S*: cependant comme la direction du vent ne doit s'éloigner que peu du plan vertical de l'Astre, il ne doit y avoir presque rien à changer aux solutions précédentes, pour les appliquer au cas dont il s'agit, & nous croyons qu'on ne s'écartera pas beaucoup du vrai, en prenant le parallèle décrit par le Soleil pour l'Equateur, & en supposant que *A* soit toujours l'angle du vertical avec le parallèle, & que *b* soit proportionnelle à la vitesse du corps *S* dans le parallèle, vitesse qui est toujours à la vitesse dans l'Equateur, comme le Cosinus de la déclinaison est au Sinus total.

## PROPOS. XIV. LEMME.

76. Soit un globe solide PCE (Fig. 24) couvert d'un Fluide EKkPE, dont la partie VSPE soit d'une densité donnée & uniforme; & dont la partie VSkK soit composée d'une infinité de tranches Ll, Ii, Kk, qui diffèrent entr'elles par leur densité. Supposons, de plus, que la hauteur EK de ce Fluide mixte, soit fort petite par rapport à CP, que tous les points du Fluide tendent vers le centre C par une force =  $p$ , & qu'outre cela ils soient sollicités dans une direction perpendiculaire au rayon, par une force qui soit différente selon la différente densité des parties, & selon leurs différentes distances à la surface PDE; de sorte que tous les points de la colonne homogène NA soient animés par une force =  $\omega$ , tous les points de la ligne infiniment petite NO par une force =  $\omega'$  &c. & ainsi de suite, jusqu'au point R de la surface extérieure Kk, dont on suppose que la force sollicitatrice soit  $\omega''$ ; on demande quelles sont les conditions nécessaires pour que le Fluide soit en équilibre.

1°. Il est évident que la force qui résulte de  $\omega''$  & de  $p$  doit être perpendiculaire à la surface Rr en R: donc  $(Dr - AR) \times p = AD \times \omega''$ . 2°. Si on appelle  $\delta$  la densité du Fluide homogène NnDA,  $\delta'$  la densité du Fluide qui est immédiatement au-dessus de celui-ci, & qu'on suppose être fort différente de la densité  $\delta$ ; il est facile de voir que la force de la particule Nn suivant Nn, étant qu'elle appartient au Fluide inférieur, fera  $[p \times (NA - Dn) - \omega \cdot AD] \times \delta$ ; & on peut prouver

avec une égale facilité, que la force de la même particule  $Nn$  suivant  $Nn$ , entant qu'elle appartient au Fluide qui est immédiatement au-dessus du Fluide  $VNS$ , est  $[p \times (NA - Dn) - \omega' \cdot AD] \times \delta'$ . Or ces deux forces doivent être égales l'une à l'autre : car sans cela, les deux Fluides de différentes densités qui se touchent immédiatement par la surface  $VNS$ , ne pourroient être en équilibre ; on aura donc . . . . .  
 $(\delta p - \delta' p) \times (NA - Dn) = (\omega \delta - \omega' \delta') \times AD$ .

[ Il est évident, que plus le Fluide inférieur sera dense par rapport au Fluide supérieur, plus aussi la force  $\omega$  sera petite par rapport aux forces  $\omega'$ ,  $\omega''$ , &c. Car l'effort de  $Nn$  suivant  $Nn$ , doit être dans chaque couche en raison inverse de la densité. Or cet effort est composé de la pesanteur  $p$ , & de la force  $\omega$ , ou  $\omega'$ , ou  $\omega''$  &c. Donc &c. ]

3°. Par les loix connues de l'Hydrostatique, il faut que les parties du Fluide contenues dans l'espace rectangle renfermé entre les colonnes verticales  $NQ, nq$ , & entre les parties de couches,  $Nn, Qq$ , soient en équilibre entr'elles. Donc le poids de  $qn$ , moins celui de  $QN$ , doit être égal à la force de la particule  $Qq$  suivant  $Qq$ , moins la force de la particule  $Nn$  suivant  $Nn$ .

PROPOS. XV. PROBLÈME.

77. Les mêmes choses étant supposées que dans le Lemme précédent ; trouver le mouvement que doit exciter dans le

*Fluide mixte*  $EKk\rho$ , l'action d'un corps  $S$ , qui se meut autour du globe dans le plan d'un grand cercle.

Nous ferons ici la même hypothèse, que dans l'article 47; c'est-à-dire, nous supposons que chaque particule se meuve dans le plan d'un grand cercle vertical passant par le Soleil, & que le Fluide a une figure Sphéroïdale. [ La première de ces hypothèses est, comme nous l'avons remarqué dans l'art. 74, très-approchante de la vérité; à l'égard de la seconde, nous verrons dans la suite jusqu'à quel point on peut la regarder comme exacte ]. Or nous avons prouvé dans l'art. 55, que le Fluide  $EKkP$  étant supposé homogène & très-rare, la surface  $Kk$  du Fluide est toujours une Ellipse, & que la vitesse de tous les points d'une couche quelconque concentrique à la terre, est comme le carré du Sinus de la distance de ces points au corps  $S$ . Nous allons faire voir que ces deux hypothèses peuvent aussi avoir lieu dans le cas dont il s'agit ici, & qu'elles s'accrochent fort bien aux calculs. Ainsi nous supposons encore ici, que toutes les couches  $Kk$ ,  $Ii$ ,  $Ll$ , &c. qui joignent les parties d'une même densité, sont des Ellipses différentes entr'elles, & que la vitesse des points de chaque couche est proportionnelle au carré du Sinus de leur distance au corps  $S$ .

## I.

Soit donc  $PS = r$ ,  $PA = u$ ;  $Si = x$ ;  $AN =$   
 $r - \frac{u(r^{n\sqrt{-1}} - r^{-n\sqrt{-1}})}{-4}$ ; l'espace décrit horizontale-

ment par les points *A* ou *N*, (tandis que le corps *S* décrit  $Pp = du = \frac{m \mu (\epsilon^{nV-1} - \epsilon^{-nV-1})^2}{-4}$ ); l'espace décrit dans ce même tems par le point *N*, (entant qu'il appartient au fluide *LISV*) =  $\frac{\mu du (\epsilon^{nV-1} - \epsilon^{-nV-1})^2}{-4}$  ( $\alpha, m, \mu$ , signifiant des constantes inconnues); l'espace décrit horizontalement par un point quelconque *Q* durant le même tems, =  $\frac{x du (\epsilon^{nV-1} - \epsilon^{-nV-1})^2}{-4}$ , *X* marquant une fonction inconnue de *x*;  $NQ = x - \frac{\xi (\epsilon^{nV-1} - \epsilon^{-nV-1})^2}{-4}$ ,  $\xi$  marquant aussi une fonction inconnue de *x*; enfin, soit *D* la densité d'une couche quelconque *QI*, laquelle doit être donnée au moins à peu près par une fonction de *x*.

II.

Cela posé, comme tous les points de la colonne homogène *NA* doivent avoir la même vitesse horizontale suivant *AD*, on aura  $\frac{2 \mu du}{4^{1V-1}} \times (\epsilon^{2nV-1} - \epsilon^{-2nV-1}) = \frac{2 m du}{4^{V-1}} \times (\epsilon^{2nV-1} - \epsilon^{-2nV-1}) + \frac{m du (\epsilon^{2nV-1} - \epsilon^{-2nV-1})}{4^{V-1}}$ ; cette équation répond à l'équation (*A*) de l'art. 47. D'où l'on tire  $2 \alpha = 3 m \epsilon \dots \dots \dots (M)$ .

De même, comme l'on a  $QO = dx - \frac{d\xi (\epsilon^{nV-1} - \epsilon^{-nV-1})^2}{-4}$ , & que tous les points de la co-

lomme infiniment petite  $QO$  doivent avoir la même vitesse horizontale, on aura  $\frac{1}{a} \frac{d\epsilon}{dx} = 3X \dots (N)$ .

## III.

L'attraction que le Fluide  $VEPS$  de la densité  $\delta$  exerce sur le point  $N$ , est  $\frac{4n\delta \times \epsilon a}{3 \times \gamma} \times \frac{(e^{2nV-1} - e^{-2nV-1})}{4V-1}$ , entant que cette attraction agit perpendiculairement à  $CN$ ; nous n'avons ici aucun égard à l'attraction du Fluide supérieur  $VKkS$ , que nous avons supposé très-rare par rapport au Fluide  $VEPS$ .

La force qui accélère le point  $N$  parallèlement à  $AD$ ; est  $\frac{pbb \times 2m(e^{2nV-1} - e^{-2nV-1})}{2a \cdot 4V-1}$ , entant qu'elle appartient au Fluide inférieur dont la densité est  $\delta$ ; & elle est  $\frac{pbb}{2a} \times \frac{2\mu r(e^{2nV-1} - e^{-2nV-1})}{4V-1}$ , entant qu'elle appartient au Fluide supérieur dont la densité est  $\delta'$ . Or le point  $N$  est sollicité suivant  $AP$  par la force  $\frac{15r(e^{2nV-1} - e^{-2nV-1})}{4a^2V-1}$ ; il faut donc (*art. 12. not. (a) §. II.*) que le point  $N$  demeure en équilibre, étant sollicité par les puissances  $p$ , &  $(\frac{15}{a^2} + \frac{4n\delta \cdot \epsilon a}{3 \times \gamma} + \frac{pbb}{2a} \times 2m) \times \frac{e^{2nV-1} - e^{-2nV-1}}{4V-1}$  perpendiculaires l'une à l'autre, aussi-

bien

bien que par les forces  $p$ , &  $(\frac{3S}{d^1} + \frac{4n\delta \times 6a}{3 \times 5} + \frac{pbb \cdot 2\mu}{2a}) \times$   
 $(\frac{c^{2uv-1} - c^{-2uv-1}}{4^{v-1}})$ . Donc (art. 76 n. 2) on aura  
 $(\frac{\mu b^2 p}{a} + \frac{4n\delta \cdot 6a}{3 \times 5} + \frac{3S}{d^1}) \times \delta - p \cdot 2a\delta = (\frac{\mu b^2 p}{a} +$   
 $\frac{4n\delta \cdot 6a}{3 \cdot 5} + \frac{3S}{d^1}) \times \delta' - 2p\alpha\delta' \dots \dots \dots (O)$ .

IV.

Maintenant, comme l'excès du poids de  $QN$  sur  $qn$ ,  
 est  $2p du \int \frac{Dd\xi (c^{2uv-1} - c^{-2uv-1})}{4^{v-1}}$ , & que cet excès  
 doit être égal (art. 76 n. 3.) à l'excès du poids de  $Nn$   
 sur  $Qq$ , c'est-à-dire, à  $(\frac{\mu b^2 p}{a} + \frac{4n\delta \cdot 6a}{3 \cdot 5} (\dagger) + \frac{3S}{d^1} - 2p\alpha) \times$   
 $\delta' du \frac{c^{2uv-1} - c^{-2uv-1}}{4^{v-1}}$ , moins la quantité  $du [\frac{b^2 p X D}{a} +$   
 $\frac{4n\delta \cdot 6a D}{3 \cdot 5} + \frac{3S \cdot D}{d^1} - 2pD \cdot (\xi + \alpha)] \times \frac{c^{2uv-1} - c^{-2uv-1}}{4^{v-1}}$ ;  
 il s'enfuit que  $2p f D d\xi = \frac{\mu \delta' p b^2}{a} + \frac{4n\delta' \delta \cdot 6a}{3 \cdot 5} + \frac{3S \delta'}{d^1} -$   
 $2p\alpha\delta' - \frac{b^2 p X D}{a} - \frac{4n\delta \cdot D \cdot 6a}{3 \cdot 5} - \frac{3S \cdot D}{d^1} + 2pD \times$   
 $(\xi + \alpha) \dots \dots \dots (P)$ .

---

(†)  $RN$  étant (*hyp.*) très-petite par rapport à  $CN$ , on peut sup-  
 poser que l'attraction en  $R, Q, O$ , &c. est la même qu'en  $N$ .

## V.

Enfin, si on suppose, que faisant  $x = Pk$ , on ait  $D = \mathfrak{S}$ ,  $X = A$ ,  $\xi = \chi$ ; on aura la force accélératrice du point  $R = \frac{2b^2 A \cdot (e^{2uv-1} - e^{-2uv-1})}{4uv-1}$  : or il est nécessaire (art. 76 n. 1.) que le point  $R$  sollicité par les forces  $p$ , &  $(\frac{2b^2 A}{a} + \frac{3S}{d^3} + \frac{4n\delta \cdot 6a}{3 \cdot 5}) \times \frac{e^{2uv-1} - e^{-2uv-1}}{4uv-1}$  perpendiculaires l'un à l'autre, tende perpendiculairement à  $Rr$ , c'est-à-dire, que le poids de l'élément  $Rr$ , animé par ces forces, soit nul. Donc on aura  $\frac{b^2 \mathfrak{S} p A}{a} + \frac{4n\delta \cdot \mathfrak{S} \cdot 6a}{3 \cdot 5} + \frac{3S\mathfrak{S}}{d^3} - 2p\mathfrak{S}(\chi + a) = 0 \dots \dots (Q)$ .

## VI.

Des cinq équations  $M, N, O, P, Q$ , on peut déduire la solution du Problème, les intégrations & les quadratures étant supposées. Car si dans l'équation  $(P)$  on met pour  $X$  la valeur  $\frac{2d\xi}{3dx}$ , tirée de l'équation  $(N)$ , qu'ensuite on différencie l'équation  $(P)$ , & qu'on fasse  $\xi + a = \frac{4n\delta \cdot 6a}{3 \cdot 5 \cdot 2p} - \frac{3S}{2pd^3} = \mathfrak{g}$ ; on aura  $3\mathfrak{g} - \frac{bbd\xi}{adx} - \frac{Dbbdd\xi}{adxdD} = 0 (R)$ .

Cette équation étant intégrée, (& elle le peut être au moins en certains cas), on aura deux constantes indéterminées, par ex.  $F, G$ , d'où l'on tirera la valeur de  $\xi$ . Or cette valeur de  $\xi$  doit être telle, que  $\xi = 0$  lorsque

$x = 0$ ; ainsi on aura une équation pour déterminer une des inconnues  $F, G$ , & par conséquent on pourra en faire évanouïr une. De plus,  $\xi$  étant connue, on connoïtra aussi 1°.  $X = \frac{2 d\xi}{3 dx}$ ; 2°. on connoïtra  $\mu$ , puisque  $\mu$  est la valeur de  $X$ , lorsque  $x = 0$ . 3°. On connoïtra  $A$  &  $\chi$ , puisque ce sont les valeurs de  $X$  & de  $\xi$ , lorsque  $x = Pk = 1$ . Donc, si dans les équations  $M, O, Q$ , on substitue au lieu de ces quantités leurs valeurs en  $G$  ou en  $F$ , il ne restera plus à déterminer que trois inconnues  $a, m$ , &  $G$  ou  $F$ , dont les expressions pourront se déduire des trois équations  $M, O, Q$ .

S C O L I E I.

78. L'intégration de l'équation (R) dépend beaucoup de la valeur de la quantité  $D$ , c'est-à-dire de la loi des densités du Fluide  $V K k S$ .

Par exemple, si on suppose avec le commun des Physiciens, que  $\frac{dD}{D} = \frac{-dx}{g}$ ; c'est-à-dire que les densités soient en raison des poids comprimans: l'équation R se changera en celle-ci,

$$\frac{3 a \xi dx^2}{b b g} + d d \xi - \frac{d \xi dx}{g} = 0.$$

Pour intégrer cette équation, soit  $\frac{d\xi}{\xi} = \frac{p dx}{h h}$  ( $h h$  est une constante arbitraire); & on aura

$$dx = \frac{-dp \cdot hh}{pp - \frac{p \cdot hh}{g} + \frac{3ah^4}{bbg}} \dots \dots \dots (S)$$

$$\& \frac{d\xi}{\xi} = \frac{-pdp}{pp - \frac{p \cdot hh}{g} + \frac{3ah^4}{bbg}} \dots \dots \dots (T)$$

On intégrera chacune de ces deux équations par Logarithmes, suivant les méthodes connues des Geomètres,

$$\& \text{faisant } M = \frac{hh}{2\sqrt{[\frac{h^4}{4gg} - \frac{3ah^4}{bbg}]}}; N = \frac{-hh}{2g} +$$

$$\sqrt{[\frac{h^4}{4gg} - \frac{3ah^4}{bbg}]}; T = \frac{-hb}{2g} - \sqrt{[\frac{h^4}{4gg} - \frac{3ah^4}{bbg}]}; \&$$

R = à la valeur de  $p$  quand  $x = 0$ ; on aura . . .

$$(T) \dots \dots \dots x = M \times \log. \left[ \frac{(p+N) \cdot (R+T)}{(p+T) \cdot (R+N)} \right];$$


$$\& \frac{\xi + a \left( 1 - \frac{4nd \cdot c}{3 \cdot 2 \cdot 5p} \right) - \frac{1S}{2pd^3}}{a \left( 1 - \frac{4nd \cdot c}{3 \cdot 5 \cdot 2p} \right) - \frac{1S}{2pd^3}} = \frac{\sqrt{[RR - \frac{Rhh}{g} + \frac{3ah^4}{bbg}]}}{\sqrt{[pp - \frac{p \cdot hh}{g} + \frac{3ah^4}{bbg}]}} \times$$

$$\left[ \frac{(p+N) \cdot (R+T)}{(p+T) \cdot (R+N)} \right]^{\frac{M}{2g}} \dots \dots \dots (V)$$

On substituera dans cette dernière équation au lieu de  $p$  sa valeur en  $x$ , qu'on tirera de l'équation T: ensuite on

prendra 1°. la valeur de  $X = \frac{2d\xi}{3dx}$ ; 2°. la valeur de  $\mu$ ,

en mettant 0 pour  $x$  dans la valeur de  $X$ ; 3°. la valeur de  $A$  & celle de  $\chi$ , en mettant dans les valeurs de  $X$  & de  $\xi$ , au lieu de  $x$ , la quantité  $\mu$ , ou ce qui revient



1

2

3


4

5

6

7

8





presque au même, la hauteur  $s$  que devoit avoir le Fluide  $V K k S$ , s'il n'étoit agité par aucune force extérieure. Enfin, on substituera dans les équations  $M, O, Q$ , les valeurs de  $\mu, A, \chi$ , & il restera trois inconnues  $R, a, m$ , qui pourront se déterminer par le moyen de ces trois équations, & qui étant connues, donneront les valeurs de  $\mu, A, \chi$ .

S C O L I E. II.

79. Il peut arriver 1°. que  $\frac{1}{4s} = \frac{1}{bb}$ ; en ce cas, l'équation ( $S$ ) est absolument intégrable, & l'équation ( $T$ ) est en partie intégrable absolument, & en partie reducible aux Logarithmes. 2°. Que  $\frac{1}{4s} < \frac{1}{bb}$ ; en ce cas,  $N$  &  $T$  sont des grandeurs imaginaires, & l'intégration se réduit à des arcs de cercle. Cependant on peut regarder la solution précédente comme générale, soit que  $N$  &  $T$  soient des quantités réelles ou non; parce qu'on peut toujours faire disparaître les quantités imaginaires. Car il est certain qu'une quantité algébrique quelconque, composée de tant d'imaginaires qu'on voudra, peut toujours se réduire à  $A + B\sqrt{-1}$ ,  $A$  &  $B$  étant des quantités réelles; d'où il s'ensuit, que si la quantité proposée doit être réelle, on aura  $B = 0$ .

(\*) Pour démontrer cette vérité, il faut remarquer,

1°. Que  $\frac{a + b\sqrt{-1}}{s + b\sqrt{-1}} = A + B\sqrt{-1}$ ; puisque  $a =$

$$gA - hB; b = Ah + gB; \text{ d'où l'on tire } A = \frac{bh + ag}{bb + gg};$$

$$\& B = \frac{bg - ah}{bb + gg}.$$

2°. Que  $[a + b\sqrt{-1}]^{g+h\sqrt{-1}} = A + B\sqrt{-1}$ .  
 Car faisant varier  $A$  &  $B$ , aussi-bien que  $a$  &  $b$ , & prenant les différentielles Logarithmiques, on a  $(g+h)\sqrt{-1} \times \frac{da + db\sqrt{-1}}{a + b\sqrt{-1}} = \frac{dA + dB\sqrt{-1}}{A + B\sqrt{-1}}$ ; c'est-à-dire (n. I. arith. prof.)

$$\frac{AdA + BdB + (ADB - BdA)\sqrt{-1}}{AA + BB} =$$

$$\frac{gada + gbdb - ahdb + bhda}{aa + bb} +$$

$$\frac{(hada + hbdb + gadb - gbda) \times \sqrt{-1}}{aa + bb};$$

$$\text{donc } AA + BB = [aa + bb]^g \times c^{-hf} \frac{adb - bda}{aa + bb}$$

$$\& \int \frac{ADB - BdA}{AA + BB} = h \log. V[aa + bb] + g \int \frac{adb - bda}{aa + bb}.$$

Or  $\int \frac{adb - bda}{aa + bb}$ , &  $\int \frac{ADB - BdA}{AA + BB}$  sont des expressions des

angles dont les tangentes sont  $\frac{b}{a}$  &  $\frac{B}{A}$ : donc  $B$  &  $A$  sont les Sinus & Cofinus d'un angle dont le rayon est

$$V[aa + bb]^g \times c^{-hf} \frac{adb - bda}{aa + bb}, \& \text{ dont la valeur est } h$$

$$\log. V[aa + bb] + g \int \frac{adb - bda}{aa + bb}.$$

3°. Il est évident, que  $a + b\sqrt{-1} \pm (g + h\sqrt{-1}) = A + B\sqrt{-1}$ ; & que  $(a + b\sqrt{-1}) \times (g + h\sqrt{-1}) = A + B\sqrt{-1}$ .

4°. Par le moyen de ces trois propositions, il sera facile de réduire toujours à la forme  $A + B\sqrt{-1}$ , une quantité composée de tant & de telles sortes d'imaginaires qu'on voudra. Car en allant de la droite vers la gauche, on fera évanouir l'une après l'autre toutes les quantités imaginaires, excepté une seule : la quantité proposée se réduira donc à  $A + B\sqrt{-1}$ ; & si elle doit être une quantité réelle,  $B$  fera nécessairement  $= 0$ .

S C O L I E III.

80. (\*) L'équation  $\frac{1 a g d x^2}{b b g} + d d g - \frac{d g d x}{g} = 0$  auroit pû s'intégrer par une autre méthode, que j'exposerais ici en peu de mots, parce qu'elle peut servir à l'avancement de l'Analyse. Soit en général . . . .

$$g + \frac{1 d g}{d x} + \frac{f d d g}{d x^2} = 0 \dots \dots \dots (1)$$

On peut toujours supposer, en introduisant une nouvelle indéterminée  $r$ , que cette équation vienne des deux suivantes . . . . .

$$d g - r d x = 0 \dots \dots \dots (2)$$

$$g + \frac{1 d g}{d x} + \frac{f d r}{d x} = 0 \dots \dots \dots (3)$$

Car faisant  $d g = r d x$ , l'équation (1) se change en l'équation (3).

Maintenant, on multipliera la première (2) de ces deux équations par un coefficient indéterminé  $v$ , ensuite on ajoutera ensemble les deux équations (2) & (3); & l'on aura  $v d\varrho + s d\varrho + f dt + \varrho dx - vt dx = 0$ ; ou  $[v + s] \cdot d\varrho + f dt + [\varrho - vt] \cdot dx = 0$ . (4). On supposera ensuite  $v$  telle, que  $\varrho - vt$  soit en raison constante quelconque avec  $[v + s] \cdot \varrho + ft$ , & on aura  $\frac{v}{v+s} = \frac{-f}{\varrho}$ ; d'où l'on tirera la valeur de  $v$ , & l'équation (4) se changera en  $dx + \frac{(d\varrho - vt) \cdot (v + s)}{\varrho - vt} = 0$ . Donc on aura  $\varrho - vt = X$ ,  $X$  marquant une fonction de  $x$ ; donc  $t = \frac{\varrho - X}{v}$ ; & l'équation (2) se changera en  $d\varrho - \frac{\varrho dx}{v} + \frac{X dx}{v} = 0$ , dont l'intégration est facile: on connoîtra donc la valeur de  $\varrho$ .

Cette méthode que je ne fais qu'exposer ici à la hâte & en passant, est fort utile pour intégrer un nombre quelconque  $n$  d'équations différentielles, dont chacune seroit d'un degré quelconque, & qui contiendroient  $n + 1$  variables  $x, y, z, u$ , &c. dont la première eût sa différence  $dx$  constante, & dont les autres  $u, y, z$ , &c. & leurs différences ne parussent que sous une forme linéaire; c'est-à-dire, ne fussent ni mêlées entr'elles, ou avec  $x$ , &  $y$ , ni élevées à aucune puissance autre que l'unité, mais seulement multipliées par des puissances convenables de  $dx$ . L'intégration n'auroit même aucune difficulté de plus,

plus, si dans chacune de ces équations il y avoit un terme quelconque composé & formé comme on voudroit, de  $x$ , de  $dx$  & de constantes.

## S C O L I E IV.

81. (\*) L'équation  $\frac{-dx}{z} = \frac{dD}{D}$ , que nous avons prise pour exemple, est fondée sur l'hypothese que la densité des couches de l'air soit proportionnelle au poids de l'air supérieur qui les comprime. Car soit  $y$  la hauteur de l'air depuis la surface supérieure, jusqu'à un point quelconque,  $D$  la densité en ce point; la masse de l'air supérieur sera  $\int D dy$ , &  $p \int D dy$  sera son poids. Or faisant  $D dy$  constante, on aura  $dy$  comme  $\frac{1}{D}$ , & comme  $\frac{1}{\int D dy}$ ; donc  $\int D dy$  est comme  $D$ , &  $\frac{dD}{D}$  comme  $dy$ , c'est-à-dire que  $\frac{dD}{D} = \frac{-dx}{z}$ ; parce que  $-dx = dy$ . Or cette hypothese renferme quelque espece de contradiction, parce que la hauteur de l'air devoit être  $= \infty$ , & la densité nulle ou  $= 0$ , à la surface supérieure.

Mais il faut remarquer, que l'équation  $\frac{-dx}{z} = \frac{dD}{D}$ , a lieu encore dans un autre cas, dans lequel la hauteur de l'air pourroit être finie, & aussi la densité finie à la surface supérieure; savoir dans le cas où l'on supposeroit que la densité des couches fût proportionnelle au poids

comprimant, augmenté d'un poids constant quelconque. Car supposant que ce poids constant =  $P$ ,  $\frac{1}{D}$  seroit comme  $\frac{1}{p \int D dy + P}$ ; donc  $\frac{dD}{D} = -\frac{dy}{s}$ : or cette hypothese est beaucoup moins éloignée du vrai que la précédente; en effet, il n'est pas possible qu'une particule de l'air n'ait quelque densité, même lorsqu'elle n'est comprimée par aucun poids. Ainsi la densité ne sauroit être tellement proportionnelle au poids comprimant, qu'elle devienne nulle, lorsque le poids comprimant est nul.

[ Il est évident, que dans cette supposition on aura  $D = c \frac{x}{s} \times d'$ , en appelant  $d'$  la densité de l'air à sa partie

supérieure; d'où l'on tirera  $\int p D dx = p d' (g c \frac{x}{s} - g)$ ;

on aura aussi  $D = d c \frac{-y}{s}$ , en appelant  $d$  la densité de l'air à sa partie inférieure, &  $y$  les distances des différentes couches à la surface de la Terre: d'où l'on voit

que  $\int p D dx + P$  sera proportionnelle à  $d c \frac{-y}{s}$ . Donc si on a trois observations du Barometre, l'une au niveau de la Mer, où  $y = 0$ , l'autre à la hauteur  $a$  au-dessus de la surface de la Terre, l'autre à la hauteur  $c$ , & que les hauteurs du Barometre observées, soient  $h$ ,

$h'$ ,  $h''$ , on aura  $h - h' : h - h'' :: 1 - c \frac{-a}{s} : 1 - c \frac{-c}{s}$ ; il

faut remarquer que  $c \frac{-a}{s}$ , &  $c \frac{-c}{s}$ , expriment les quanti-

tés ou nombres dont les Logarithmes font  $-a$  &  $-c$ ,  $g$  étant la soutangente de la Logarithmique : (& comme la soutangente de la Logarithmique des tables est de 4342945 parties, il s'en suit, que si  $g$  étoit donnée, ces nombres seroient ceux qui auroient pour Logarithmes

correspondans  $\frac{-a \times 4342945}{g}$  &  $\frac{-c \times 4342945}{g}$ ). Or ces nom-

bres exprimées en suites font  $1 - \frac{a}{g} + \frac{a^2}{2g^2} - \frac{a^3}{3 \cdot g^3}$  &c.

&  $1 - \frac{c}{g} + \frac{c^2}{2g^2} - \text{\&c.}$  Mettant donc ces valeurs dans la

proportion précédente, on en déduira la valeur approchée de  $g$ . Cette valeur étant connue, on trouvera  $P$ , c. à d. la hauteur  $H$  du Mercure, répondante à  $P$ , par

cette proportion  $h + H : h' + H :: 1 : c \frac{-a}{g}$ ; de plus, si on nomme  $s'$  la hauteur de l'air, l'équation  $\int p D dx = p d' g (c \frac{x}{s} - 1)$  donnera  $h : h' :: c \frac{s'}{s} - 1 : c \frac{s' - a}{s} - 1$ .

De-là on pourra tirer la valeur de  $s'$ ; car écrivant  $c \frac{s'}{s} \times \frac{-a}{s}$  au lieu de  $c \frac{s' - a}{s}$ , on aura pour lors facilement la

valeur de  $c \frac{s'}{s}$ , & par conséquent celle de  $s'$ : la valeur de  $s'$  étant connue, on aura le rapport de  $d'$  à la den-

sité du Mercure  $= \frac{h}{g c \frac{s'}{s} - g}$ ; & le rapport de  $d$  à  $d' =$

$c \frac{i}{s}$ . Donc le rapport de  $\delta$  à la densité du Mercure, est

$$\frac{h c \frac{i}{s}}{g (c \frac{i}{s} - 1)}$$

Je mets ici ces formules , parce qu'elles sont différentes de celles qu'on a données jusqu'à présent , pour trouver la hauteur & la densité de l'Atmosphère , en supposant la densité de chaque couche proportionnelle au poids comprimant. C'est , au reste , à l'expérience à décider , si on peut regarder ces nouvelles formules comme assez exactes. Pour s'en assurer , il suffira de faire quatre observations du Barometre , au lieu de trois , & on verra si la quatrième observation combinée avec les deux premières , donne les mêmes valeurs de  $g$  ,  $H$  ,  $\delta$  ,  $\delta'$  , que les trois premières combinées ensemble. Quoi qu'il en soit , il ne faut pas espérer , que par cette méthode ni par aucune autre on puisse parvenir à connoître bien exactement la hauteur de l'air. Car dans les calculs précédens , nous avons supposé que la hauteur du Barometre étoit toujours proportionnelle à  $\int p D dx$  , c'est-à-dire au poids de l'air. Or , nous avons déjà remarqué dans l'art. 77 de notre Traité des Fluides , que la suspension du Mercure est principalement l'effet du ressort de l'air , & qu'ainsi elle n'est pas uniquement due au poids de l'air , mais généralement à toutes les causes , constantes ou variables , qui peuvent influer sur son Elasticité. ]

## S C O L I E V.

82. Soit en général  $\frac{dD}{D} = Xdx$ ,  $X$  marquant une fonction quelconque de  $x$ ; l'équation (R) se changera dans la suivante, après avoir fait  $\xi = e^{\int k dx}$ , suivant la méthode du célèbre M. Euler,

$$\frac{3^a x dx^a}{4^b} - k X dx - dk - k k dx = 0.$$

Il seroit trop long d'examiner ici les cas d'intégrabilité de cette équation : d'ailleurs ces cas sont fort limités, parce qu'ils supposent de certaines équations entre les coefficients.

## S C O L I E VI.

83. Comme l'action du Soleil & de la Lune ne produit qu'un fort petit changement dans la figure de l'Atmosphère, il est évident que les particules de l'air ne changent point sensiblement de densité en vertu de cette action ; ainsi quoique leur densité vienne du poids de l'air supérieur, & qu'elle soit par conséquent variable dans chaque particule, cependant on peut regarder comme constante & invariable la densité de chaque couche. Donc si  $x'$  est la hauteur d'une des couches intérieures dans le cas de la sphéricité, & qu'on demande quelle doit être la hauteur  $x$  de cette même couche dans le cas présent, on mettra  $x'$  au lieu de  $x$  dans la valeur de  $\xi$ ; ensuite on fera  $\int D dx' \times 2nr r = \int D dx x$   
t iij

$$2nr - fD d\xi \times \frac{2nr}{3}; \text{ donc } fD dx = fD dx' + f \frac{D d\xi}{3},$$

$$\& dx = dx' + \frac{d\xi}{3}: \text{ donc } x = x' + \frac{\xi}{3}.$$

## S C O L I E VII.

84. Nous n'avons donné jusqu'ici que l'expression de la vitesse du vent, qui doit souffler proche de l'Equateur. Pour trouver sa vitesse dans les lieux éloignés de ce grand cercle, on ne peut supposer  $Pp = du$ ; mais en traitant  $A$  comme constante, on aura facilement les équations qui conviennent à ce cas, comme dans l'article 70; ce qu'il me paroît inutile d'expliquer ici plus au long, puisque l'introduction de  $A$ , traitée comme constante, ne fait naître aucune nouvelle variable dans le calcul.

Au reste, il faut remarquer que les valeurs de  $\alpha, m, \mu, \xi$  &  $X$  seront telles, que le Fluide perdra sa forme Sphéroïdale; cependant il est nécessaire de supposer qu'il ait cette forme, pour pouvoir faire l'attraction =  $\frac{4n^2 \times 6\alpha}{3 \cdot 5}$ . Ainsi, pour avoir un calcul plus approchant de la vérité, on résoudra d'abord le Problème sans avoir égard à l'attraction, ensuite on mettra dans la quantité  $\frac{4n^2 \cdot 6\alpha}{3 \cdot 5}$ , au lieu de  $\alpha$  sa valeur moyenne, qui répond à l'angle  $A$  de  $45^\circ$ , & on recommencera le calcul. C'est, ce me semble, tout ce qu'on peut trouver de plus exact dans un Problème aussi difficile & aussi compliqué.

On peut encore se servir dans cette recherche de la méthode suivante. Nous avons fait voir dans l'art. 28, que si les Astres étoient en repos, la force  $\phi$  ou  $\frac{3sz\sqrt{rrr-2z}}{rrd}$  devoit être augmentée en raison de 1 à

$1 - \frac{3\delta}{5\Delta}$ , dans le cas où on auroit égard à l'attraction des parties. Ainsi dans la supposition que les Astres soient en mouvement, il est à croire qu'on ne s'écartera pas beaucoup de la vérité, en cherchant le mouvement du Fluide, abstraction faite de l'attraction de ses parties, & mettant ensuite dans l'expression de ce mouvement,  $\frac{3s}{d^2(1 - \frac{3\delta}{5\Delta})}$  au lieu de  $\frac{3s}{d^2}$ .

[Mais de toutes les méthodes qu'on peut employer pour résoudre le Problème dont il s'agit, la meilleure seroit sans doute celle où on calculeroit l'attraction du Fluide, en le regardant, non comme un solide de révolution, mais seulement comme un solide dont toutes les coupes fussent des Ellipses, sans que ces Ellipses fussent semblables ni égales. Nous croyons donc qu'on ne fera pas fâché de voir ici ce que l'Analyse peut nous apprendre sur ce sujet.

Soit  $OCK$  (Fig. 28) un quart d'Ellipse, dont  $OC$ ,  $CK$  soient les deux demi-axes,  $KCY$  un autre quart d'Ellipse, dont  $CK$ ,  $CY$  soient les deux demi-axes : imaginons un solide renfermé entre ces deux quarts d'El-

lipse, & tel que les coupes  $OMT$  faites par  $OC$ , soient des Ellipses qui aient pour demi axes  $OC, CT$ ; joignant à ce solide sept autres solides semblables, de maniere que quatre de ces solides soient au-dessous du plan  $CKY$ , & quatre au-dessus de ce plan, on formera un espece de Sphéroïde connu par les Geomètres sous le nom d'*Ellipsoïde*, & qui ne sera point, à la vérité, un solide de révolution, mais dont toutes les coupes par l'axe  $OC$  seront des Ellipses. Or si on nomme  $\delta$  la densité de ce Sphéroïde,  $OC, r, CK, r - a, CY, = r - a - \epsilon; a, \epsilon$ , étant supposées très-petites par rapport à  $r$ ; on trouvera facilement.

$$1^{\circ}. \text{ Que l'attraction en } O \text{ est } \frac{4nr\delta}{3} - \frac{16na\delta}{15} - \frac{8n\epsilon\delta}{15}.$$

$$2^{\circ}. \text{ Que l'attraction en } K \text{ est } \frac{4nr\delta}{3} - \frac{12na\delta}{15} - \frac{8n\epsilon\delta}{15}.$$

$$3^{\circ}. \text{ Que l'attraction en } Y \text{ est } \frac{4nr\delta}{3} - \frac{12na\delta}{15} - \frac{4n\epsilon\delta}{15}.$$

4<sup>o</sup>. L'attraction en un point quelconque  $M$ , peut toujours être regardée comme composée de trois forces, dont l'une agisse suivant  $Mo$  parallèle à  $OC$ , une autre parallèlement à  $CK$  ou  $oS$ , une autre enfin parallèlement à  $CY$ : ainsi pour trouver l'attraction en  $M$ , la difficulté se réduit à trouver chacune de ces forces.

5<sup>o</sup>. Si on fait passer par le point  $o$  un solide Ellipsoïde semblable au grand, & que par ce point  $o$  on mene  $oR$  parallèle à  $CY$ , aussi-bien que  $oS$  parallèle à  $CK$ , on verra facilement par les Principes de *M. Mac-Laurin*, dans

dans sa Dissertation sur le Flux & Reflux de la Mer, que l'attraction du point *M* parallèlement à *KC*, est égale à l'attraction d'un Ellipsoïde, qui passant par *R* seroit semblable à l'Ellipsoïde donné, & qu'ainsi cette

$$\text{attraction est } \frac{CR}{CK} \times \left[ \frac{4nr^d}{3} - \frac{12na^d}{15} - \frac{8n^2c^d}{15} \right] = \text{à peu}$$

$$\text{près } \frac{CR}{r} \times \frac{4nr^d}{3} + \frac{4nr^d}{3} \times \frac{a \cdot CR}{r^2} - \frac{12na^d \cdot CR}{15r} - \frac{8n^2c^d \cdot CR}{15r} =$$

$$\frac{4n^2d \cdot CR}{3} + \frac{8na^d \cdot CR}{15r} - \frac{8n^2c^d \cdot CR}{15r}.$$

6°. L'attraction du point *M* parallèlement à *CY*, est égale à l'attraction d'un Ellipsoïde, qui passant par *S* seroit semblable à l'Ellipsoïde donné, & ainsi cette attraction est  $\left( \frac{4nr^d}{3} - \frac{12na^d}{15} - \frac{4n^2c^d}{15} \right) \times \frac{CS}{CI} =$  à peu près

$$\frac{CS}{r} \times \frac{4nr^d}{3} + \frac{8na^d \cdot CS}{15r} + \frac{16n^2c^d \cdot CS}{15r}.$$

7°. On peut changer ces deux forces en deux autres; l'une suivant *MV* parallèle à *Co*, l'autre suivant une ligne parallèle à la droite *CZ*, qui est supposée perpendiculaire à *CT* dans le plan *CKY*. On trouvera donc

$$\text{que la premiere de ces forces est } \frac{4n^2d \cdot Co}{3} + \frac{8na^d \cdot Co}{15r} -$$

$$\frac{8n^2c^d \cdot Co}{15r} + \frac{24n^2c^d \cdot Co}{15r} \times \text{Sin. } KCT, \text{ \& que la seconde est}$$

$$\frac{24n^2c^d \cdot CS}{15r} \times \text{Cof. } KCT.$$

8°. A l'égard de la force suivant *Mo*, on trouvera

qu'elle est égale à l'attraction d'un Ellipsoïde, qui passant par  $V$ , seroit semblable au proposé. Donc la force

$$\text{suivant } Mo = \left( \frac{4n\delta r}{3} - \frac{16n\alpha\delta}{15} - \frac{8n\zeta\delta}{15} \right) \times \frac{CV}{r}.$$

9°. En combinant ensemble les forces suivant  $MV$  &  $Mo$ , & faisant le Sinus de l'angle  $oCM = z$ , pour le rayon  $r$ , & le Sinus de l'angle  $KCT = A$ , on trouvera que la force perpendiculaire au rayon  $CM$  dans le

$$\text{plan } OMTc, \text{ est } \frac{z\sqrt{rr-zz}}{rr} \times \left[ \frac{4n\delta r}{3} \right] \times \left[ \frac{6\alpha}{5r} + \frac{6\zeta}{5r} \times \frac{A^2}{rr} \right],$$

$$\text{\& que la force parallèle à } CZ, \text{ est } \frac{4n\delta r}{3} \times \frac{A\sqrt{rr-AA'}}{rr} \times$$

$$\frac{6\zeta}{5} \times \frac{\sqrt{rr-zz}}{r}.$$

10°. De-là il s'ensuit, pour le dire en passant; que la force qui résulte des forces suivant  $MV$  &  $Mo$ , & de la force qui agit sur le point  $M$  parallèlement à  $CZ$ , n'est point perpendiculaire à la surface de l'Ellipsoïde en  $M$ . Car, en premier lieu, il faudroit pour cela, (*art. 61*) que la force perpendiculaire au rayon  $CM$  dans le plan

$OMTc$ , combinée avec la force  $\frac{4n\delta r}{3}$  qui agit vers  $C$ ,

fût perpendiculaire à la courbe  $OMT$  au point  $M$ ;

$$\text{c'est-à-dire, que } \frac{z\sqrt{rr-zz}}{rr} \times \left[ \frac{6\alpha}{5r} + \frac{6\zeta \cdot A^2}{5r^2} \right] \text{ fut } = k,$$

en prenant pour  $k$  le rapport de la différence de deux rayons de l'Ellipse  $OMT$  infiniment proches, à l'arc que ces rayons comprennent. Or (*art. 1*) cette différence

de deux rayons infiniment proches =  $(OC - CT) \times \frac{z \, dz}{r r}$  =  $(OC - CK + CK - CT) \times \frac{z \, dz}{r r}$  =  $(a + \frac{c \cdot A^2}{r r}) \times \frac{z \, dz}{r r}$ ; & l'angle compris =  $\frac{r \, dz}{v [r r - z z]}$ . Donc  $k = \frac{z \, dz}{r r} \times \frac{r \, dz}{v [r r - z z]} \times (\frac{c \cdot a}{s r} + \frac{c \cdot A^2}{s r^2})$ ; donc  $k$  n'est pas égale à  $\frac{z \, dz}{r r} \times [\frac{c \cdot a}{s r} + \frac{c \cdot A^2}{s r^2}]$ . En second lieu, il faudroit encore (*art. 61*) que la force parallèle à  $CZ$  étant combinée avec la force  $\frac{4n \, dr}{3}$  qui agit vers  $C$ , fût perpendiculaire à l'Ellipse qui passeroit par  $M$ , & par le plan  $MCZ$ ; & qu'ainsi  $\frac{A \, v [r r - A A]}{r r} \times \frac{c \cdot c}{s r} \times \frac{v [r r - z z]}{r}$  fût =  $k'$ , en prenant  $k'$  pour le rapport entre la différence de deux rayons infiniment proches dans cette Ellipse, avec l'angle qu'ils comprennent. Or il n'est pas difficile de voir que la différence de  $CM$  & de  $CT$ , est  $(a + \frac{c \cdot A^2}{r r}) \times \frac{z \, z}{r r}$ ; & que si on fait tourner le plan Elliptique  $OMT$  sur  $OC$ , le plan  $MCZ$  demeurant immobile,  $CT$  deviendra  $\frac{c \cdot (A^2 - z \, A \, A)}{r r}$ , que  $z$  ne changera que d'un infiniment petit du second ordre, & qu'enfin l'angle entre la ligne  $CM$  dans sa première position, & la ligne  $CM$  dans sa position nouvelle, sera à

v ij

l'angle  $\frac{rdA'}{\sqrt{rr - AA'}} :: \sqrt{rr - zz} : r$ ; de-là il s'ensuit que  $k' = \frac{2CA'dA'.zz}{r^4}$  divisé par  $\frac{dA'.\sqrt{rr - zz}}{\sqrt{rr - AA'}} = \frac{2CA'\sqrt{rr - AA'}}{r^3} \times \frac{zz}{r\sqrt{rr - zz}}$ ; donc  $k'$  n'est pas égal à  $\frac{6CA'\sqrt{rr - AA'}}{5rr} \times \frac{\sqrt{rr - zz}}{r^2}$ . Donc &c.

11°. Si le solide proposé n'est pas par-tout de la même densité, mais qu'il renferme un noyau dont  $C$  soit le centre, & dont les rayons  $r'$ ,  $r' - a'$ ,  $r' - a' - c'$  soient peu différens des rayons correspondans  $CO$ ,  $CK$ ,  $CY$ ; alors nommant  $p$  la force ou la pesanteur en  $M$  suivant  $MC$ , &  $\Delta$  la densité du noyau intérieur, on aura  $p = \frac{4n\delta r}{3} + \frac{4n\delta r'}{3} - \frac{4n\delta r'}{3} =$  à peu près  $\frac{4n\Delta r}{3}$ ; & on trouvera que la force perpendiculaire au rayon  $CM$  dans le plan  $OMTC$ , est  $(\frac{4n\delta r}{3} \times [\frac{6a}{5r} + \frac{6c.A'^2}{5r^3}] + [\frac{4n\Delta r}{3} - \frac{4n\delta r}{3}] \times [\frac{6a'}{5r'} + \frac{6c'.A'^2}{5r'^3}]) \times \frac{z\sqrt{rr - zz}}{rr}$ ; & le rapport de cette force à la force  $p$  sera égal à  $k$ , si  $\delta(\frac{a}{r} + \frac{c.A'^2}{r^3}) + (\Delta - \delta) \times (\frac{a'}{r'} + \frac{c'.A'^2}{r'^3}) = \frac{5\Delta}{3}(\frac{a}{r} + \frac{c.A'^2}{r^3})$ . A l'égard de la force perpendiculaire à  $CM$  dans le plan  $MCZ$ , elle sera  $\frac{6CA'\sqrt{rr - AA'}}{5r^3} \cdot \sqrt{rr - zz} \times [\frac{4n\delta r}{3} \times 6 + (\frac{4n\Delta r - 4n\delta r}{3}) \times 6']$ ; & le rapport de cette

force à  $p$ , ne fera égal à  $k'$ , que quand  $\frac{\sqrt{[rr - zz]}}{sr} \times$   
 $[\frac{\delta\epsilon + (\Delta - \delta)\epsilon'}{\Delta}]$  fera égal à  $\frac{\epsilon z z}{3r\sqrt{[rr - zz]}}$ . D'où il  
 est facile de conclure, que pour que la surface du so-  
 lide proposé soit en équilibre en vertu de la seule at-  
 traction de ses parties, lorsque  $\alpha' = 0$ , il faut que  
 $3\delta = 5\Delta$ , & que  $\epsilon = 0$ , &  $\epsilon' = 0$ , c'est-à-dire, que la  
 densité du noyau, qui pour lors est sphérique, soit à celle  
 de la partie Fluide, comme 3 à 5, & que le noyau  
 & le Fluide forment l'un & l'autre des solides de révo-  
 lution autour de  $OC$ . Dans ce cas, la différence de  $OC$   
 & de  $CK$ , pourra être tout ce qu'on voudra, pourvu  
 qu'on la suppose très-petite. C'est ce que nous avons déjà  
 remarqué *art.* 31.

12°. Si on fait attention à la formule du *n.* 9 précé-  
 dent, qui exprime la force perpendiculaire à  $CM$  dans  
 le plan  $OMT$ , on verra qu'en faisant  $\alpha' = 0$ , elle de-  
 viendra la même que celle de l'*art.* 24: d'où il s'ensuit  
 que l'attraction perpendiculaire à un rayon quelconque  
 de l'Ellipse  $OK$  est la même, que si le solide proposé  
 étoit un solide formé par la révolution de l'Ellipse  $OK$   
 autour de  $OC$ .

14°. De-là il s'ensuit, que la solution du Problème  
 précédent, *art.* 77, est exacte pour les lieux qui sont  
 près de l'Equateur, pourvu qu'on suppose que les par-  
 ticules de l'Air & de l'Océan se meuvent toujours dans  
 les plans des verticaux correspondans, & qu'on néglige

les forces qui agissent perpendiculairement à ces plans verticaux, & qui sont insensibles proche de l'Equateur.

15°. On voit aussi (*nomb.* 11), que l'attraction perpendiculaire aux rayons de la courbe  $OK$ , c'est-à-dire l'attraction perpendiculaire à  $CM$ , lorsque  $A = 0$ , est la même que dans le cas du solide de révolution, pourvu que  $\alpha' = 0$ , c'est-à-dire, pourvu que la coupe du noyau intérieur dans le plan  $OCK$  soit un cercle. Or comme l'Equateur terrestre est un cercle, il est évident que la remarque faite dans le nombre précédent, s'applique aussi au cas où le globe terrestre est supposé un Sphéroïde, & qu'ainsi la solution du Problème de l'*art.* 77, peut passer pour exacte à l'égard des lieux qui sont proches de l'Equateur. Au reste, il est certain (*art.* 30) que la vitesse & la direction de l'air sera toujours à peu près la même, quelque figure qu'on suppose au globe terrestre, pourvu que cette figure diffère peu de la sphérique.

16°. Si donc on veut que toutes les coupes du solide Fluide, faites par un plan qui passe par le centre de la Terre & par le corps  $S$  (*Fig.* 17), ne soient point des Ellipses semblables & égales, mais seulement qu'elles soient des Ellipses, il faudra mettre dans les calculs

des *art.* 65, 70, 72 &c, au lieu de  $\frac{3S}{d^3}$  la quantité

$$\frac{3S}{d^3} + \frac{4n^2 r}{3} \times \left[ \frac{6m}{5r} + \frac{6c}{r^2} \frac{(e^{AV-1} - e^{-AV-1})^2}{-4} \right],$$

parce que l' $A$  des nombres précédens est ici le Sinus de l'angle  $A$

que chaque coupe fait avec l'Equateur ; on aura ainsi dans les *art.* 70, 72, les valeurs au moins approchées, de  $k$  & de  $q$ , en  $a$ ,  $\ell$ , & en constantes, & on déterminera ensuite  $a$  &  $\ell$ , en faisant attention que  $a$  est ce que devient  $k$ , lorsque  $A = 0$ , &  $z = 1$ , &  $\ell$ , ce que devient  $k$  lorsque  $A = 90^\circ$  &  $z = 1$ . Par ce moyen, on aura des formules très-approchées pour le Flux & Reflux de la Mer.

17. On trouvera par une méthode semblable dans le cas de l'*art.* 77, la vitesse du vent dans les lieux éloignés de l'Equateur, en se conformant d'ailleurs à ce qui a déjà été remarqué au commencement du présent *art.* 84 ; c'est-à-dire, en ne supposant point  $Pp = du$ , mais en traitant  $A$  comme une constante ; par-là on aura le mouvement de la Mer & de l'Air qui lui est contigu.

J'avoue que toutes ces estimations peuvent encore s'éloigner un peu de l'exaétitude, non-seulement à cause du petit mouvement que les Fluides peuvent avoir perpendiculairement aux cercles verticaux ; mais encore, parce que la coupe du solide Fluide, faite perpendiculairement à ces verticaux, par le centre  $C$ , & éloignée de  $90^\circ$  de l'endroit où est le corps  $S$ , n'est pas rigoureusement une Ellipse, comme il seroit nécessaire qu'elle le fût pour l'entière & parfaite exaétitude. Quoiqu'il en soit, voilà, ce me semble, tout ce que le secours de l'Analyse peut nous donner sur cette matière de plus approché.]

85. Le Problème précédent renferme tous les cas possibles. Car si, par exemple, on suppose que le Fluide inférieur soit nul, & que par conséquent il n'ait aucune attraction; les équations  $M, O$ , doivent être entièrement supprimées, & il faut effacer dans les autres équations les termes où se trouvent  $\alpha, m, n$ ; & on aura le mouvement d'un Fluide rare & de densité variable, qui seroit immédiatement contigu au globe terrestre.

Par-là il sera facile de connoître quelle doit être la différence entre le mouvement de l'air, lorsqu'il est séparé du globe terrestre par un Fluide dense & homogène, & le mouvement qu'il doit avoir, lorsqu'il est immédiatement contigu au globe terrestre.

Pour donner là-dessus un léger essai de calcul, nous supposerons que le globe terrestre soit couvert de deux Fluides homogènes placés l'un au-dessus de l'autre immédiatement, & qui soient assez peu denses, pour qu'on en puisse négliger l'attraction. Soient  $d'$  &  $d$  les densités du Fluide supérieur & inférieur: soit aussi nommée  $\epsilon$  la hauteur du Fluide inférieur en  $P$ , &  $\epsilon'$  celle du Fluide supérieur; on aura  $2\alpha = 3m\epsilon$ ;  $2\chi = 3\mu\epsilon'$ ; & il faut remarquer que  $\chi$  est ici une constante qui répond à la quantité  $\xi$  de l'article 77. Outre cela, on aura . . .

$$\left(\frac{mbbp}{a} + \frac{3s}{d^3} - 2p\alpha\right) \times d = \left(\frac{\mu b b p'}{a} + \frac{3s'}{d'^3} - 2p\alpha'\right) \times d'$$

$$\& \frac{b b d' p \mu}{a} + \frac{3s d'}{d^3} - 2p\chi d' - 2p\alpha d' = 0. \text{ D'où } \\ \text{l'on}$$

l'on tire . . . . .

$$m = \frac{\frac{3s}{pd'} \times (3s' - \frac{3s'd'}{d} - \frac{bb}{a})}{\frac{bb}{a} [\frac{bb}{a} - 3(s + s')] + 2s's (\frac{d-d'}{d})}$$

$$\& \mu = \frac{3ms - \frac{3s}{pd'}}{\frac{bb}{a} - 3s'}$$

Si  $d = d'$ , c'est-à-dire, s'il n'y a qu'un seul Fluide dont la hauteur soit  $s + s'$ ; on aura  $m = \mu = \frac{3s}{pd'} \times \frac{x}{3(s + s') - \frac{bb}{a}}$ ;

ce qui s'accorde avec l'art. 47, parce que  $s + s'$  est ici la hauteur du Fluide.

[ Si  $d'$  est fort petite par rapport à  $d$ , c'est-à-dire, si la densité du Fluide inférieur est fort grande par rapport à celle du Fluide supérieur, comme la densité de l'eau de la Mer par rapport à celle de l'Air, on aura à très-peu près

$$m = \frac{3s}{pd' (3s - \frac{bb}{a})}, \text{ précisément comme s'il}$$

n'y avoit point de Fluide au-dessus ; & . . . .

$$\mu = \frac{3sbb}{pd'a (3s - \frac{bb}{a}) \cdot (\frac{bb}{a} - 3s')}; \text{ d'où l'on voit 1}^\circ. \text{ que}$$

le mouvement des eaux de la Mer ne doit être que très-peu altéré par l'air qui les couvre. 2<sup>o</sup>. Que la vitesse de l'air sur la surface de l'Océan, doit être

à sa vitesse sur la Terre ferme, comme  $-\frac{bb}{a}$  est à  $3\epsilon - \frac{bb}{a}$ ,  $\epsilon$  exprimant la hauteur des eaux. 3°. Que  $\mu - m$  qui représente la vitesse respective des deux Fluides, est  $\frac{3s}{p d^i} \times \frac{3\epsilon'}{(3\epsilon - \frac{bb}{a}) \cdot (\frac{bb}{a} - 3\epsilon')}$ , & que cette vitesse

respective est à la vitesse absolue de l'air sur la Terre ferme, comme  $-3\epsilon'$  à  $3\epsilon - \frac{bb}{a}$ . On voit donc que le *vent de Mer* doit être fort différent du *vent de Terre*, toutes choses d'ailleurs égales. C'est ce que nous avons déjà fait voir (art. 45) dans d'autres hypothèses.]

## S C O L I E IX.

86. (\*) Nous ne devons point omettre ici une remarque très-importante & très-utile dans l'Hydrostatique.

Dans l'article 76, sur lequel toute la Théorie précédente est fondée, nous avons dit que le Fluide supérieur ne pouvoit être en équilibre avec l'inférieur, à moins que le poids d'une particule quelconque  $Nn$  ne fût le même, soit enant qu'elle appartenoit au Fluide supérieur, soit enant qu'elle appartenoit au Fluide inférieur. D'où nous avons tiré l'équation . . . . .  
 $(p[NA - Dn] - \varpi \cdot AD) \times d = (p[NA - Dn] - \varpi' \cdot AD) \times d'$ .

Ne faudroit-il pas de plus, pourra-t-on nous objecter,

que le poids de la particule  $Nn$  suivant  $Nn$  soit nul? c'est-à-dire, que la force qui résulte de  $\omega$  & de  $p$  soit perpendiculaire à la surface  $Nn$ , aussi-bien que la force qui résulte de  $\omega$  & de  $p$ ? Ce qui paroît confirmé par l'expérience; puisque l'on voit tous les jours que des Fluides d'inégale densité, mêlés ensemble, se séparent & se disposent de manière, que leurs surfaces soient de niveau.

Je réponds 1°. que dans toutes les expériences que nous pouvons faire, les surfaces de différens Fluides se mettent de niveau, parce que les forces  $\omega$  &  $\omega'$  sont toujours égales dans ces Fluides, souvent même  $= 0$ . Or comme  $d$  &  $d'$  sont différentes, l'équation précédente ne peut avoir lieu, lorsque  $\omega = \omega'$ , à moins que chaque membre ne soit  $= 0$ .

2°. Pour démontrer invinciblement, qu'il n'est pas nécessaire que chaque membre de l'équation soit toujours  $= 0$ , supposons que le Fluide  $VKkS$  soit homogène; & que le poids de l'élément  $Nn$  soit nul: comme le poids de  $Rr$  doit être nécessairement nul, il est clair que les colonnes  $RN, rn$ , se feront mutuellement équilibre, & par conséquent seront égales entr'elles; & comme cela se doit dire de tous les autres points, il s'en suit, que si les deux Fluides sont mis par l'action du corps  $S$ , le Fluide supérieur ne doit avoir d'autre mouvement, que de se hausser & de se baisser alternativement & verticalement au-dessus du Fluide inférieur. Or cela est impossible: il est donc incontestable, que non-

seulement on ne doit pas, mais qu'on ne peut pas même supposer les deux membres de l'équation précédente, égaux à zero, dans le Problème de l'art. 76.

[ En général, il est évident que si deux Fluides pour être en équilibre, devoient nécessairement & dans toutes sortes d'hypothèses, être chacun de niveau, dans tous les points de la surface commune qui les sépare; en ce cas, les deux Fluides étant supposés en mouvement, le Fluide supérieur, quelle que fût la force qui agit sur lui, ne devoit faire autre chose que de s'élever & s'abaisser alternativement au-dessus du Fluide inférieur, sans que ses particules eussent d'ailleurs aucun mouvement dans aucune autre direction; ce qui est absurde. Donc &c. ]

PROPOS. XVI. PROBLÈME.

87. Soient données deux quantités . . . . .  
 $ads + \epsilon du$

$$\& \rho adu + \nu \epsilon ds + du \Delta u, s + ds \Gamma u, s$$

dans lesquelles  $\rho$  &  $\nu$  désignent des constantes données,  $\Delta u, s$ , &  $\Gamma u, s$ , des fonctions quelconques données de  $u$ , & de  $s$ ; supposons, outre cela, que ces deux quantités soient l'une & l'autre des différentielles exactes & complètes de quelque fonction de  $u$  & de  $s$ ; on demande une méthode pour déterminer  $a$  &  $\epsilon$ , & par conséquent l'intégration des deux différentielles proposées.

On divisera d'abord par la constante  $\rho$ , tous les termes de la seconde différentielle; & le Problème se ré-

duira à faire enforte , que les deux quantités . . .

$$a ds + \epsilon du$$

$$\& adu + \frac{\epsilon ds}{\epsilon} + \frac{du \Delta u, s}{\epsilon} + \frac{d\Gamma u, s}{\epsilon}$$

soient l'une & l'autre une différentielle complete:

Soit  $\frac{s}{\epsilon} = n$ ; ayant divisé la seconde différentielle par  $\sqrt{n}$ , on écrira les deux différentielles , comme il suit :

$$\epsilon \sqrt{n} \cdot \frac{du}{\sqrt{n}} + a ds$$

$$\frac{a du}{\sqrt{n}} + \epsilon \sqrt{n} \cdot ds + \frac{du \Delta u, s}{\epsilon \sqrt{n}} + \frac{d\Gamma u, s}{\epsilon \sqrt{n}}$$

Maintenant , chacune des deux différentielles devant être complete, il faut que leur somme & leur différence soit aussi une différentielle complete. Donc

1°. Si on les ajoute ensemble , & qu'on fasse  $u + \epsilon \sqrt{n} = m$ ; &  $\frac{u}{\sqrt{n}} + s = t$ ; on aura la transformée

(A) . . . . .  $m dt + dt \Psi t, s + ds \Pi t, s$  qui doit être une différentielle complete. ( J'appelle  $\Psi t, s$ , &  $\Pi t, s$ , les fonctions de  $t$  & de  $s$ , qui viennent de la substitution de  $(t - s) \sqrt{n}$  au lieu de  $u$ , dans  $\Delta u, s$ , &  $\Gamma u, s$ . Or par le Theorème de M. Euler (tom. 7.

des Mém. de Petersb. p. 177) on a  $\frac{dm}{dt} + \frac{d\Psi t, s}{ds} = \frac{d\Pi t, s}{dt}$

(j'entends en général par  $\frac{dA}{ds}$  le coefficient de  $ds$  dans la différentielle de A). Donc prenant  $s$  pour variable

& pour constante, on aura  $m = -\Psi r, s + \varphi r$  (†) +  
 $\int ds \times \frac{d\Psi r, s}{ds}$ .

2°. Si de la première des quantités proposées, on ôte la seconde, & qu'on fasse  $\frac{m}{n} - s = y$  &  $\mathcal{C}\sqrt{n - a} = \mu$ ; ou, ce qui revient au même, si on multiplie la seconde des deux quantités par  $-1$ , & qu'on les ajoute ensuite ensemble, on aura la transformée . . . . .  
 (A') . . . . .  $\mu dy + dy \Gamma y, s + ds \Xi y, s$   
 qui doit être une différentielle complète. D'où l'on tire  
 $\frac{d\mu}{ds} + \frac{d\Gamma y, s}{ds} = \frac{d\Xi y, s}{dy}$ ; &  $\mu = -\Gamma y, s + \Sigma y + \int ds \times$   
 $\frac{d\Xi y, s}{dy}$ . De ces deux valeurs des quantités  $\mu$  &  $m$ , on tirera la valeur des quantités  $a$  &  $\mathcal{C}$ ; car  $a + \mathcal{C}\sqrt{n} = m$ ;  
 &  $\mathcal{C}\sqrt{n - a} = \mu$ : donc  $a = \frac{m - \mu}{2}$  &  $\mathcal{C} = \frac{m + \mu}{2\sqrt{n}}$ .

## S C O L I E.

88. Quand même la quantité  $\sqrt{n}$  seroit imaginaire, cela ne nuiroit point à l'intégration; car (art. 79) on pourra toujours faire évanouir les imaginaires de  $a$  &  $\mathcal{C}$ , si ces quantités doivent être réelles.

---

(†)  $\varphi r$  désigne une fonction de  $r$ .

PROPOS. XVII. PROBLÈME.

89. Soient données les quantités . . . . .

$$a ds + \epsilon du$$

&c

$\rho a du + \rho \epsilon du + \gamma \epsilon ds + m a ds + du \Delta u, s + ds \Gamma u, s$   
 qui doivent être l'une & l'autre une différentielle exacte.  
 On demande les quantités  $a$  &  $\epsilon$ .

Solution. On fera  $ku + rs = gy, fu + \delta s = ht,$   
 ( $k, r, f, \delta, g, h$ , sont des constantes indéterminées);

& on aura  $u = \frac{g\delta y - hrt}{k\delta - rf}; s = \frac{gfy - hkt}{rf - \delta k}$ . On substituera

ces valeurs, en faisant auparavant  $\mu = \frac{g\delta}{k\delta - rf}; \nu = \frac{-hr}{k\delta - rf};$

$\lambda = \frac{gf}{rf - \delta k}; \phi = \frac{-hk}{rf - \delta k}$ ; & on aura . . . . .

$$\text{La première différ.} = a\lambda dy + a\phi dt \\ + \epsilon\mu dy + \epsilon\nu dt$$

Et la seconde dif-  
 férentielle multi-  
 pliée par un coef-  
 ficient indéterminé }  
 $\left. \begin{array}{l} + \rho a \mu \\ + \rho \epsilon \nu \\ + \gamma \epsilon \lambda \\ + m a \lambda \end{array} \right\} n dy \left. \begin{array}{l} + \rho a \nu \\ + \rho \epsilon \nu \\ + \gamma \epsilon \phi \\ + m a \phi \end{array} \right\} n dt$   
 n deviendra  $+ n dy \Delta y, t + n dt \Psi y, t$

Or dans la solution du Problème précédent, nous sommes arrivés à la détermination des quantités  $a$  &  $\epsilon$ , parce que, faisant  $\frac{n}{\nu n} + s = t, \& \frac{n}{\nu n} - s = y, \& \text{ajoutant ensemble}$

ble après cette transformation les quantités différentielles données, dont l'une étoit multipliée successivement par  $\frac{1}{v_n}$  &  $-\frac{1}{v_n}$ , nous avons eu par ce moyen deux transformées, dans lesquelles les différentielles  $dy$  &  $dt$  se sont trouvées délivrées l'une après l'autre des inconnues  $a$  &  $\epsilon$ . Ainsi en suivant la même méthode, il est facile de voir que dans le cas présent, on pourra avoir les valeurs de  $a$  & de  $\epsilon$ , si ajoutant ensemble les deux transformées que l'on vient de trouver, on a  $a\lambda + \epsilon\mu + \rho\alpha\mu\eta + p\epsilon\mu\eta + \gamma\epsilon\lambda\eta + m\alpha\lambda\eta = 0$ , & (prenant une autre valeur de  $\eta$ )  $a\phi + \epsilon\nu + \rho\alpha\nu\eta + p\epsilon\nu\eta + \gamma\epsilon\phi\eta + m\alpha\phi\eta = 0$ . Or, pour que la première de ces équations ait lieu, quelles que soient les valeurs de  $a$  & de  $\epsilon$ , il faut que  $\lambda + \rho\mu\eta + m\lambda\eta = 0$ , &  $\mu + p\mu\eta + \gamma\lambda\eta = 0$ : donc  $\frac{\lambda}{\mu} = \frac{-\rho\eta}{1+m\eta} = \frac{1+p\eta}{-\gamma\eta}$ . D'où l'on tirera une valeur de  $\eta$  telle, que  $a\lambda + \epsilon\mu + \rho\alpha\mu\eta + p\epsilon\mu\eta + \gamma\epsilon\lambda\eta + m\alpha\lambda\eta = 0$ . De même, pour que  $a\phi + \epsilon\nu + \rho\alpha\nu\eta + p\epsilon\nu\eta + \gamma\epsilon\phi\eta + m\alpha\phi\eta$ , soit  $= 0$ ; il faut que  $\phi + \rho\nu\eta + m\phi\eta = 0$  &  $\nu + p\nu\eta + \gamma\phi\eta = 0$ : donc  $\frac{\phi}{\nu} = \frac{-\rho\eta}{m\eta+1} = \frac{1+p\eta}{-\gamma\eta}$ ; ainsi on aura la même équation pour trouver  $\eta$  qu'on avoit auparavant. On résoudra donc l'équation  $\frac{-\rho\eta}{1+m\eta} = \frac{1+p\eta}{-\gamma\eta}$ , qui donnera deux valeurs de  $\eta$ ; on multipliera la seconde différentielle transformée, premierement

micrement par une des deux valeurs de  $n$ , ensuite par l'autre; puis on ajoutera successivement la seconde différentielle à la première, en faisant  $\frac{\lambda}{\mu} = \frac{-\xi^2}{1+m^2}$  &  $\frac{\rho}{\gamma} = \frac{-\xi^2}{1+m^2}$ ; & on aura deux différentielles qui seront faciles à intégrer.

Il faut remarquer que dans la détermination des valeurs de  $\frac{\lambda}{\mu}$  & de  $\frac{\rho}{\gamma}$ , on ne doit pas prendre la même valeur de  $n$ , mais deux valeurs différentes: autrement il arriveroit que  $\frac{\lambda}{\mu}$  seroit  $= \frac{\rho}{\gamma}$ ; & qu'ainsi  $n$  seroit en raison constante avec  $s$ , ce qui limiteroit trop la solution du Problème.

(\*) Il ne peut y avoir de difficulté, que dans le seul cas où l'équation  $\frac{-\xi^2}{1+m^2} = \frac{1+p^2}{-\gamma^2}$  qui se change en

$$\left. \begin{array}{l} \xi \gamma \\ -mp \end{array} \right\} n^2 - \left. \begin{array}{l} m^2 \\ p^2 \end{array} \right\} n - 1 = 0$$

ne montera point au second degré, ou bien sera impossible à résoudre. Le premier de ces deux cas arrivera, si  $\xi \gamma = mp$ , car alors  $n$  n'aura qu'une seule valeur; le second, si  $\xi \gamma - mp = 0$ , &  $m = -p$ , car alors on aura  $-1 = 0$ , ce qui est impossible.

Or 1°. si  $\xi \gamma - mp = 0$ , soit  $p = \xi K$ , on aura  $\gamma = Km$ ; ainsi les deux différentielles proposées se changeront, la première en  $a ds + \xi du$ , & la seconde

y

en  $(\varrho du + m ds) \times (\alpha + K\epsilon) + du\Delta u, s + ds\Gamma u, s$ .  
 Or si on fait  $\varrho u + ms = t$ , &  $\alpha + K\epsilon = \mu$ , la seconde  
 de ces différentielles deviendra  $\mu dt + ds\psi u, s +$   
 $dt\Xi u, s$ ; d'où l'on tirera par la méthode du Problème  
 précédent la valeur de  $\mu$ , c'est-à-dire, la valeur de  
 $\alpha + K\epsilon$  en  $u$  & en  $s$ ; & au lieu de  $\alpha ds + \epsilon du$ , on aura

$$\alpha ds + \frac{\mu - \alpha}{K} \times \left( \frac{dt - m ds}{\epsilon} \right) \text{ ou}$$

$$\alpha \left( \frac{+ ds}{K\epsilon} - \frac{dt}{K\epsilon} \right) + \frac{\mu dt}{K\epsilon} - \frac{m\mu ds}{K\epsilon}.$$

Si donc on fait  $s \left( 1 + \frac{m}{K\epsilon} \right) - \frac{t}{K\epsilon} = y$ , & qu'on transfor-  
 me cette différentielle, on déterminera  $\alpha$  par  $\mu$ , de la  
 même manière qu'on a déjà déterminé la quantité  $\mu$ .

2°. Si on a  $p = -m$ , &  $\varrho\gamma - mp = 0$ , rien n'em-  
 pêchera qu'on ne puisse faire usage alors de la méthode  
 que nous venons de donner pour le cas où l'on a seu-  
 lement  $\varrho\gamma - mp = 0$ : ainsi il n'y aura à cela aucune  
 difficulté nouvelle.

[ On pourra encore être embarrassé, lorsque l'équation  
 en  $y$  aura deux racines égales, ce qui arrivera, si  $-4$   
 est égal à  $\frac{(m+p)^2}{4(\varrho\gamma - mp)}$ ; c'est-à-dire, si  $-4\varrho\gamma = (m-p)^2$ .

Quoique l'examen de ce cas ne soit pas absolument né-  
 cessaire pour ce que nous avons à dire dans la suite, il  
 ne fera pas inutile de nous arrêter ici à le discuter.

Je dis donc, que dans ce cas il faudra se contenter  
 de faire  $\alpha\lambda + \epsilon\mu + \varrho\alpha\mu\eta + p\epsilon\mu\eta + \gamma b\lambda\eta + m\alpha\lambda\eta$

= 0 : d'où l'on tirera la valeur de  $\frac{\Delta}{\mu}$ , & l'équation qui

doit servir à trouver la valeur de  $u$ . On substituera ensuite cette valeur de  $u$  dans le coefficient de  $dt$ , c'est-à-dire dans  $a\phi + \mathcal{C}r + \&c.$  en prenant pour  $\phi$  & pour  $r$  tout ce qu'on voudra, & la transformée deviendra de cette forme  $(Ma + N\mathcal{C})dt + ndy\Delta y, t + ndt\psi y, t$ , dans laquelle  $M$  &  $N$  sont des constantes données. Ensuite supposant cette transformée une différentielle exacte, on trouvera facilement la valeur de  $Ma + N\mathcal{C}$  en  $y$ , & en  $t$ , ou, ce qui revient au même, en  $s$  & en  $u$ . On pourra donc supposer  $a = \Xi s, u, + K\mathcal{C}$ ,  $K$  étant une constante connue ; & substituant cette valeur dans  $ads + \mathcal{C}du$ , qui doit être une différentielle complète, on aura la transformée  $(Kds + du)\mathcal{C} + ds\Xi s, u$ ; en supposant  $Ks + u = r$ , on la changera en  $\mathcal{C}dr + ds\Xi s, r$ , qui doit être une différentielle complète. De là on tirera facilement par les méthodes précédentes, la valeur de  $\mathcal{C}$ , en  $s$ , & en  $r$ , ou, ce qui est la même chose, en  $s$ , & en  $u$ .

Il faut remarquer que cette méthode que nous venons de donner pour un cas particulier & unique, est cependant générale, & peut s'appliquer à quelque cas que ce soit : mais la première méthode que nous avons donnée, & qui consiste à faire les deux coefficients de  $dy$  & de  $dt$  égaux à zero, a l'avantage d'être plus simple, quoiqu'il y ait quelques cas où elle ne puisse s'appliquer, comme ceux dont nous venons de faire mention. Il y a en-

y ij

core un cas où cette dernière méthode ne réussit point, c'est celui de  $\varrho = 0$ . Mais alors il faudra écrire la seconde différentielle de cette manière  $ma ds + m\epsilon du + (p\epsilon - m\epsilon) du + \gamma\epsilon ds + \&c.$  & il est évident, que comme  $a ds + \epsilon du$  doit être une différentielle complete (hyp.) la partie restante  $(p\epsilon - m\epsilon) du + \gamma\epsilon ds + \&c.$  doit être une différentielle complete. Or en faisant  $(p - m)u + \gamma s = t$ ; cette partie restante se change en  $\epsilon dt + dt \Psi, t, s, + ds \Delta t, s$ , dans laquelle on peut aisément déterminer  $\epsilon$ .

Si  $\gamma$  étoit  $= 0$ , alors on auroit pour seconde différentielle  $pads + p\epsilon du + (ma - pa) ds + \varrho adu + \&c.$  de laquelle retranchant  $pads + p\epsilon du$ , on trouveroit facilement  $a$  par la même voie, par laquelle nous venons d'enseigner à trouver  $\epsilon$ .

Au reste, la méthode dont nous venons de nous servir pour résoudre le présent Problème, peut aussi être employée avec succès dans plusieurs autres cas. Mais ce n'est pas ici le lieu de nous étendre là-dessus.]

*Du mouvement de l'Air renfermé entre des montagnes.*

I.

90. Soit en premier lieu une chaîne de montagnes parallèles, sous l'Equateur; imaginons que ces montagnes soient plus hautes que l'Atmosphère, & qu'elles environnent le globe terrestre de manière qu'il n'y ait entr'elles qu'une Zone assez étroite, & supposons que

l'Atmosphère soit un fluide homogène ; il est évident, que l'air renfermé entre ces montagnes doit se mouvoir à peu près comme il feroit dans un plan circulaire : ainsi, conservant les mêmes noms que dans les *art.* 47

et 50, on aura  $q = \frac{1^s}{\lambda \rho \times 2d} \times (z^r \pm mm)$  ; cette quan-

tité exprime la vitesse & la direction du fluide. On peut donc appliquer ici ce qui a été déjà remarqué dans les *art.* 50 et 51.

## II.

Si l'Astre se meut dans un parallèle quelconque *SG*, (Fig. 25) & que pendant ce tems l'air, supposé homogène & rare, se meuve dans une chaîne de montagnes parallèles situées sous un parallèle quelconque, & qui environnent la Terre de tous côtés, on pourra résoudre le Problème par la même méthode, que dans le *n. I. du présent article*. Car soient *KAk*, *KSk*, deux Méridiens, *KE* l'Equateur, & la constante  $GE = B$  ; l'action du corps *S* en *A* suivant *AP*, sera exprimée par une fonction de  $AP = u$ , & des constantes  $AG(A)$

&  $EG(B)$ . Donc si on fait  $q = \frac{1^s}{d^3} \times [(\text{Sin. } SA)^2 \pm mm] \times$

$M$  ; &  $k = \frac{1^s}{d^3} [(\text{Sin. } SA)^2 - (\text{Sin. } SP)^2] \times N(M \&$

$N$  sont des constantes indéterminées) on aura . . .  
y ii.

$$\frac{dk}{i} = \frac{dq}{d(SA)} \times nd(SA); (\dagger) \&$$

$$\frac{pdk}{d(SA)} \times n \times \frac{d(SA)}{d(SG)} = \frac{3S}{d} \left( \frac{c^{2SAV-1} - c^{-2SAV-1}}{4V-1} \right) \times$$

$$\frac{d(SA)}{d(SG)} \times n + \frac{2pb^2M}{2a} \times \frac{3S}{d^3} \times \frac{d(SA)}{d(SG)} \cdot \frac{c^{2SAV-1} - c^{-2SAV-1}}{4V-1};$$

donc  $\frac{N}{i} = nM$ , &  $2pnN = n + \frac{2pb^2M}{2a}$ ; donc  $M =$

$$\frac{n}{\left( 2n^2 - \frac{bb}{a} \right) \times p}.$$

[ Si l'Athmosphère qui est supposée couvrir l'Equateur ou un des parallèles, n'étoit pas homogène, mais qu'elle fut composée de couches de différentes densités, on résoudroit alors le Problème dont il s'agit ici, en se servant de celui de l'article 77, comme on s'est servi de l'art. 47 pour résoudre le Problème de l'art. 50, qui est le même que celui des *n. I. & II. du présent article.*

Il est facile de comparer par le moyen des art. 47 & 50, la vitesse du vent dans l'air libre, à sa vitesse entre une chaîne de montagnes parallèles. Par exemple, si dans l'art. 50 on suppose  $m = 0$ , &  $3a \varepsilon < b^2$ , on trouvera que la vitesse du vent en plein air, est à sa vitesse entre des montagnes ::  $b^2 - 2a\varepsilon : b^2 - 3a\varepsilon$ , c'est-à-dire, qu'elle est plus grande dans l'air libre qu'entre

---

(†)  $n$  est le rapport du rayon du cercle  $SG$  au rayon du cercle  $AP$ .

des montagnes ; ce seroit le contraire, si  $2as$  étoit  $> b^2$ . Mais si  $3as > b^2$  &  $2as < b^2$  ; alors la vitesse du vent en plein air, sera à sa vitesse entre des montagnes, comme  $b^2 - 2as : 3as - b^2$ , & par conséquent la premiere de ces vitesses sera plus grande, ou plus petite, ou égale à la seconde, selon que  $b^2$  sera plus grand, ou plus petit, ou égal à  $\frac{3as}{2}$ . ]

III.

Si la ligne  $PA$  tomboit sur le Méridien  $KAG$ , il faudroit alors faire  $SG = u$  ; & on auroit . . . . .

$$\frac{dk}{du} du = \frac{dq}{dA} du, \text{ \&c}$$

$$\frac{pdk}{dA} du = \frac{3S}{d^2} \varphi u \times A \times du + \frac{dq}{du} du \times \frac{pbb}{2a}$$

donc si on suppose  $dk = \alpha du + \mathcal{C}dA$ , on aura  $dq =$

$$\frac{\alpha dA}{\epsilon} + \frac{2\alpha du}{bb} (\mathcal{C} - \frac{3S}{pd^2} du \varphi u, A) : \text{ ainsi on trouvera } \alpha \text{ \&c}$$

$\mathcal{C}$  par la méthode expliquée dans l'art. 89.

IV.

Les solutions précédentes devoient être à peu près les mêmes, quand la hauteur des montagnes seroit moindre que celle de l'Athmosphère : car la vitesse des parties supérieures de l'air qui seroient libres, devoit en ce cas être la même que celle de la portion inférieure,

renfermée entre les montagnes, ou du moins ne devoit en différer que d'une quantité constante. En effet, les parties inférieures de la portion de l'air qui est libre, étant homogènes (*hyp.*) aux parties supérieures de la portion d'air renfermée entre des montagnes, elles doivent nécessairement être animées de la même force pour être en équilibre. Donc elles doivent avoir (*art. 12 nor. (a) §. I.*) la même force accélératrice. Donc la solution doit être à peu près la même, soit que les montagnes aient plus de hauteur que l'Athmosphère, ou non : seulement la vitesse de l'air supérieur pourra différer d'une quantité constante de la vitesse de l'air inférieur.

## V.

Maintenant, si la chaîne de montagnes parallèles que nous avons supposée sous l'Equateur, étoit fermée en deux endroits par deux montagnes éloignées l'une de l'autre d'une certaine distance, de manière qu'on eût une chaîne de montagnes dont la base (Fig. 26) fût  $RSTQ$  ( $RS, TQ$ , étant des arcs du cercle) & qui s'étendit jusqu'au haut de l'Athmosphère ; en ce cas, la vitesse du point  $A$  ne pourroit être qu'une fonction de  $AT$  & de  $PA$ . Soit donc  $PA = u$  ;  $AT = s$  ; on auroit alors

$$\frac{dk}{du} = \frac{dq}{ds} + \frac{dq}{du}, \text{ \&}$$

$$p \left( \frac{dk}{ds} + \frac{dk}{du} \right) = \frac{3s}{2} \times \frac{(e^{2uv-1} - e^{-2uv-1})}{4v-1} + \frac{2hk}{2a} \times \frac{dq}{du}$$

Donc si on fait

$dk$

$$dk = \epsilon du + \alpha ds$$

on aura . . .  $dq = (\epsilon + \alpha) du \cdot \frac{2a}{bb} - \frac{2adn}{bb} \times \frac{3s}{pd^2} \times$   
 $\left( \frac{\epsilon^{2n\sqrt{-1}} - \epsilon^{-2n\sqrt{-1}}}{4\sqrt{-1}} \right) + \frac{\epsilon ds}{s} - \left[ \epsilon + \alpha - \frac{3s}{pd^2} \phi u \right] \frac{2adn}{bb} :$

D'où l'on tirera la valeur de  $\alpha$  & de  $\epsilon$ , par la méthode de l'art. 89. Or la valeur de  $q$  doit être telle, qu'elle soit = 0, quand  $s = 0$ , & quand  $s = TQ$ , quelle que soit la valeur de  $u$ . Si on ne peut satisfaire à cette condition, en prenant l'expression la plus générale de  $q$ ; c'est une marque que  $q$  ne sauroit être exprimée par une fonction des quantités  $u$  &  $s$ , & qu'ainsi le Problème, pris dans ce sens, est impossible.

V I.

Les Problèmes précédens deviennent beaucoup plus difficiles, au moins quant à l'intégration des équations, si les montagnes ne sont point parallèles entr'elles.

Cherchons d'abord quelle devoit être la vitesse du vent dans un canal qui n'auroit pas par-tout la même largeur, en supposant que cette vitesse fût uniforme, si les montagnes étoient parallèles.

Le Problème se réduit donc à déterminer la vitesse d'un Fluide, qui coule dans un canal dont la largeur n'est pas par-tout la même. Pour résoudre cette question, soit  $CA = x$  (Fig. 27);  $AB = y = \phi x$ ; la hauteur du Fluide en  $A = z$ ;  $q ds$  l'espace que le point  $A$

z

parcourt dans le tems  $dt$ ; on aura  $\frac{dz}{z dx} \cdot q dt + \frac{dq}{dx} dt +$

$$\frac{d\phi x}{dx} \times \frac{q dt}{dx} = 0, \& -pdz = \frac{p\theta\theta}{2ad^2} \times \frac{dq dt}{dx} \times dx \times q dt.$$

Imaginons que le canal varie peu dans sa largeur; nous aurons  $z = \varepsilon + a$ ;  $\phi x = \varepsilon' + X$ ;  $q = \mathcal{C} + \delta$ ; ( $\varepsilon, \varepsilon', \mathcal{C}$ , étant des constantes, &  $a, X, \delta$ , des quantités variables, mais fort petites par rapport à  $\varepsilon, \varepsilon', \mathcal{C}$ ). Par conséquent . . . . .

$$\frac{-da}{\varepsilon dx} \times \mathcal{C} dt = \frac{dX}{\varepsilon dx} \times \mathcal{C} dt + \frac{d\delta}{dx} dt; \& -pda = \frac{p\theta\theta}{2ad^2} \times \frac{d\delta}{dx} \cdot dx \cdot \mathcal{C} dt^2. \text{ D'où l'on tire } \frac{dX}{\varepsilon} + \frac{d\delta}{\mathcal{C}} = \frac{\theta\theta d\delta}{2a}; \& d\delta = \frac{\varepsilon dX}{\left(\frac{\theta\theta \mathcal{C}}{2a} - \frac{1}{\mathcal{C}}\right)}$$

croissant,  $\delta$  peut croître aussi, si  $\theta^2 \mathcal{C}^2 > 2a\varepsilon$ , & que  $X$  décroissant,  $\delta$  peut décroître, si  $\theta^2 \mathcal{C}^2 > 2a\varepsilon$ . Soit  $g$  la vitesse presque uniforme du Fluide, &  $M$  l'espace

qu'il parcourt dans le tems  $\theta$ , on aura  $\frac{M dt}{\theta} = \mathcal{C} dt$ ; donc

$\theta^2 \mathcal{C}^2 > 2a\varepsilon$  deviendra  $M^2 > 2a\varepsilon$ . [Donc si la vitesse du Fluide est telle que l'espace qu'il parcourt en une seconde, soit  $> \sqrt{[2 \cdot 15 \cdot \varepsilon]}$  pieds,  $\varepsilon$  étant la hauteur du Fluide en pieds, son mouvement s'accéléra dans les endroits où le lit s'élargira, & se ralentira dans les endroits où le lit se resserrera.]

On aura aussi  $da = -\frac{v^2 c}{2a} \times \frac{dx}{v \left( \frac{v^2 c}{2a} - \frac{v}{c} \right)}$ . D'où il s'en-

suit 1°. que la vitesse du Fluide croissant, la hauteur décroît; & au contraire. 2°. Qu'il n'est pas toujours nécessaire que le Fluide s'éleve dans les endroits où le lit est resserré, & qu'il doit même s'abaisser, si  $M^2 < 2ac$ . [3°. On voit aussi que dans le cas de  $\theta^2 c^2 > 2ac$ ,  $\frac{da}{v}$  pris positivement, est plus grand que  $\frac{dx}{v}$ ; c'est-à-dire, que le Fluide perd plus en hauteur qu'il ne gagne en largeur, ou gagne plus en hauteur qu'il ne perd en largeur. Il n'est donc pas surprenant qu'il s'accélère alors dans les endroits où son lit a plus de largeur, & qu'au contraire il ralentisse son mouvement dans les endroits où son lit a moins de largeur. Car dans le premier cas, l'espace par lequel il doit passer est plus étroit; & dans le second cas, cet espace est plus large.]

Maintenant, si on cherche la vitesse de l'air, mis en mouvement par l'action du Soleil, dans un canal inégalement large; il est évident qu'en faisant la distance de l'Astre à un point quelconque =  $u$ , & le chemin du vent dans l'instant  $dt = q du$ , on aura les quantités  $q$  &  $z$  exprimées par des fonctions de  $u$  & de  $x$ , & que ces fonctions devront être déterminées au moyen de deux équations qu'on trouvera facilement par l'application des Principes précédens. Cependant je crois qu'on peut avoir assez bien la vitesse du vent, si on cherche

z ij

d'abord la vitesse que le vent auroit à l'endroit proposé dans le cas du parallélisme des montagnes, & qu'ensuite, prenant cette vitesse pour constante, on détermine l'augmentation ou la diminution qu'elle doit avoir dans la partie resserrée du canal, qui répond à l'endroit proposé.

## VII.

Les mêmes choses étant supposées, que dans l'*art. prés. n. I*, imaginons que toutes les parties de chaque colonne de l'air, tendent à se mouvoir horizontalement avec une vitesse donnée; supposons, outre cela, que la figure de l'air soit telle qu'on voudra, pourvu qu'elle diffère peu d'un cercle, & qu'enfin le corps *S* parte d'un point donné *D* (Fig. 5); & cherchons quelle doit être la vitesse & la hauteur de l'air en un lieu quelconque *M* après un tems quelconque *t*, écoulé depuis le moment où le corps *S* a commencé à se mouvoir.

Soit  $MP = s$ , le complément de la distance du lieu *M* à l'Astre, dans le moment que l'Astre part; *q* l'espace que le point *M* décrit dans ses oscillations pendant le tems *t*; *a* la hauteur dont la colonne d'air qui est au-dessus du point *M*, décroît ou croît dans le tems *t*; on voit que les quantités *a* & *q* ne peuvent être que des fonctions de *s* & de *t*.

$$\text{Soit donc } dq = k dt + r ds$$

$$da = v dt + g ds$$

&, prenant *s* pour la hauteur de la colonne *NM* au pre-

mier instant, il est clair par ce qui précède, qu'on aura  $\frac{ds}{dt} = \frac{dk}{dt} \times dt$  ou  $s = \frac{dk}{dt}$  ou  $\frac{ds}{dt}$ . Donc  $\frac{da}{dt} = \frac{dr}{dt}$ ; donc  $a = sr + S'$ , ( $S'$  étant une fonction indéterminée de  $s$ ).

De plus, l'Astre décrivant l'arc  $\frac{bt}{g}$  suivant  $GN$  pendant le tems  $t$ ; on aura  $s = \frac{bt}{g}$  pour le complément de la distance du lieu  $M$  à l'Astre, & l'action de l'Astre sur le

point  $M = \frac{3S}{dt} \times \left( \frac{(1s - \frac{2b}{g})\sqrt{-1} - (1s - \frac{2b}{g})\sqrt{-1}}{4\sqrt{-1}} \right)$ . Si

on retranche de cette force, la force accélératrice  $\frac{g^2}{2a} \times \frac{dk}{dt}$ , il faut que la force restante soit telle, qu'elle ne produise aucun mouvement dans le Fluide (*art. 12. not. (a)* §. I.) c'est-à-dire, qu'elle soit proportionnelle au Sinus du complément de l'angle que fait la colonne  $NM$  avec la surface extérieure du Fluide. Or si  $\Sigma$  est le Sinus du complément de cet angle au premier instant, on aura  $\Sigma = \frac{da}{dt}$  pour le Sinus du complément après le tems  $t$ ;

donc . . . . .  $\Sigma = \frac{da}{dt} = \frac{3S}{4p dt \sqrt{-1}} \times$   
 $\left[ \frac{2\sqrt{-1}(1 - \frac{bt}{g})}{-c} - \frac{2\sqrt{-1}(1 - \frac{bt}{g})}{-c} \right] - \frac{g^2}{2a} \times \frac{dk}{dt}$   
z ii]

Donc, si on fait  $dk = v dt + \mathcal{C} ds$ ;

on aura  $dr = \mathcal{C} ds + \frac{v}{2at} ds - \frac{ds'}{t} + \frac{\Sigma ds}{t} - \frac{ds}{t} \times \frac{3s}{4p d^3 v - 1} \times$

$(e^{2(s-\frac{bt}{\theta})v-1} - e^{-2(s-\frac{bt}{\theta})v-1})$ . Il faut donc que ces

deux différentielles soient l'une & l'autre des différentielles complètes, & on peut les trouver par l'article 87.

Pour rendre le calcul plus facile, on supposera que

$\theta^2 = 2at$ , ce qui est permis ici, & on aura  $\frac{v}{2at} = 1$ ; en-

suite on fera  $v + \mathcal{C} = m$ ;  $v - \mathcal{C} = \mu$ ;  $t + s = u$ ;

$t - s = y$ ,  $1 + \frac{b}{\theta} = k$ ,  $1 - \frac{b}{\theta} = h$ ; & il viendra

$$k = \varphi u + \Delta y + \frac{3s}{p d^3} \times [e^{2(s-\frac{bt}{\theta})v-1} + e^{-2(s-\frac{bt}{\theta})v-1}] \times$$

$$\left( \frac{1}{2 \cdot 8k} - \frac{1}{2 \cdot 8h} \right); \text{ \& . . . . .}$$

$$\alpha = \varphi u - \Delta y + \frac{3s}{p d^3} \times [e^{2(s-\frac{bt}{\theta})v-1} - e^{-2(s-\frac{bt}{\theta})v-1}] \times$$

$$\left( \frac{1}{2 \cdot 8k} + \frac{1}{2 \cdot 8h} \right) + f \Sigma ds.$$

Soit  $k = G$ , lorsque  $t = 0$ , c'est-à-dire, soit  $G$  l'expression de la vitesse avec laquelle le Fluide tend à se mouvoir dans le premier instant, laquelle expression est différente pour les différens points du Fluide; il faut donc que  $t = 0$ , donne  $G = \varphi s + \Delta - s +$

$\frac{3S}{\rho d^3} \times (e^{2.21V-1} + e^{-2.21V-1}) \times (\frac{1}{2.8k} - \frac{1}{2.8b})$ . Outre cela, il faut que  $a = 0$ , quand  $t = 0$ ; d'où l'on tire  $\varphi s - \Delta - s + \frac{3S}{\rho d^3} \times (\frac{1}{2.8k} + \frac{1}{2.8b}) \times (e^{2.21V-1} + e^{-2.21V-1}) + \int \frac{\Sigma ds}{s} = 0$ .

Ajoutant ensemble ces deux équations, on aura  $G = 2\varphi s + \frac{3S}{\rho d^3} \times \frac{1}{8k} (e^{2.21V-1} + e^{-2.21V-1}) + \int \frac{\Sigma ds}{s}$ ; &  $\varphi s = \frac{G}{2} - \frac{3S}{\rho d^3} \times \frac{1}{16k} \times (e^{2.21V-1} + e^{-2.21V-1}) - \int \frac{\Sigma ds}{2s}$ .

Ainsi, comme  $G$  doit être donné en  $s$ , si dans le second membre de l'équation on écrit  $t + s$  au lieu de  $s$ , on aura la valeur de  $\varphi (t + s)$ .

De même, si l'on soustrait l'une de l'autre les deux équations précédentes, on aura  $G = 2\Delta - s - \frac{3S}{\rho d^3} \times \frac{1}{8b} \times (e^{2.21V-1} + e^{-2.21V-1}) - \int \frac{\Sigma ds}{s}$ , donc on a  $\Delta - s = \frac{G}{2} + \frac{3S}{\rho d^3} \times \frac{1}{16b} \times (e^{2.21V-1} + e^{-2.21V-1}) - \int \frac{\Sigma ds}{2s}$ .

Le second membre de cette équation est une fonction de  $s$ , & cette fonction, quelle qu'elle soit, peut toujours se changer en une fonction de  $-s$ ; car une fonction de  $s$  ne peut être composée que de termes qui renferment des puissances de  $s$ : or  $a \times s^n = -s^n \times a$ , quand  $n$  est un nombre pair, &  $= -s^n \times -a$ , quand  $n$  est un

nombre impair. On traitera donc le second membre de l'équation précédente, comme une fonction de  $-s$ ; ensuite on y substituera  $t - s$  au lieu de  $-s$ ; & on aura la valeur de  $\Delta (t - s)$ .

## VIII.

Si le mouvement de l'air étoit arrêté par des montagnes élevées perpendiculairement à l'horizon, & dont les distances au point  $P$ , fussent  $a, a', a''$ , &c. il est évident que la valeur de  $k$  devrait alors être telle, qu'elle fût nulle lorsque  $s$  seroit  $= a$ , ou  $= a'$ , ou  $= a''$ , &c.  $t$  ayant une valeur quelconque. Or cela ne peut arriver que dans les cas où  $G$  aura certaines valeurs: dans tous les autres cas le Problème sera impossible. Ainsi il n'est pas surprenant qu'il y en ait plusieurs où l'on ne puisse déterminer le mouvement oscillatoire de l'air entre des montagnes.

## IX.

Par l'expression de la valeur de  $k$ , qui donne la vitesse du vent pour un instant quelconque  $dt$ ; il est évident que cette vitesse sera non-seulement une fonction de  $s - \frac{bt}{g}$ , complément de la distance à l'Astre, mais aussi de  $t + s$  & de  $t - s$ ; ou, ce qui revient au même, il est clair que cette quantité  $k$  sera une fonction de  $s$  & de  $s - \frac{bt}{g}$ ; puisque  $t + s = -\frac{g}{b} \times (s - \frac{bt}{g}) + s(1 + \frac{g}{b})$ ,  
 &c

&  $t - s = -\frac{t}{b} \times (s - \frac{bt}{a}) + s(\frac{t}{b} - 1)$ . Donc la vitesse du vent dans un tems quelconque, sera une fonction de la distance où l'Astre est alors du Zenith, & de celle où il étoit lorsqu'il a commencé à se mouvoir.

D'où il s'ensuit, que dans l'hypothese présente, la vitesse du vent ne dépend presque jamais de la seule distance de l'Astre au Zenith, comme nous l'avons supposé dans tout le cours de cette Dissertation. Il faut cependant observer que nous avons eu raison de le supposer ainsi ; 1°. parce qu'il n'y a point de raison pour imaginer que l'Astre soit parti d'un point plutôt que d'un autre. 2°. Parce qu'il y a un cas, (savoir celui où  $\phi s = \sigma$  &  $\Delta - s = 0$ ) dans lequel la vitesse est donnée par une fonction seulement de la distance à l'Astre. C'est ce qui doit arriver, lorsque . . . . .

$$f \Sigma ds = -\frac{1S}{p \, d^2} \times \left( \frac{1}{2.8k} + \frac{1}{2.8h} \right) \times$$

$$(e^{21V-1} + e^{-21V-1}) ; \& G = \frac{3S}{p \, d^2} \times \left( \frac{1}{2.8k} - \frac{1}{2.8h} \right) \times$$

$$(e^{21V-1} + e^{-21V-1}) .$$

[ Au reste, la solution générale que nous venons de donner, ne doit être regardée comme exacte, que dans les cas où le Fluide fait des oscillations alternatives sans se mouvoir d'un seul & même côté ; car supposant, comme nous l'avons fait, que  $s$  soit le complément de la distance d'un point quelconque à l'Astre au commence-

ment du mouvement, & que durant le tems  $t$  l'Astre parcourt un espace  $= \frac{bt}{t}$ , on ne peut prendre  $s - \frac{bt}{t}$  pour le complément de la distance après le tems  $t$ , que dans le cas où les particules du Fluide s'écartent peu de leurs places, & ne font que de petites oscillations. Cependant il faut observer, que si  $z$  est le Sinus de la distance à l'Astre, la valeur générale de  $k$  dans le cas de  $\varphi s = 0$ , &  $\Delta - s = 0$  se changera en  $\frac{3Sb}{2p d^3} \times \frac{1}{1 - \frac{b^2}{2at}} \times (zz - \frac{1}{2})$ ;

& qu'en général, si  $\varphi s$  &  $\Delta - s$  sont supposés des constantes, le rapport de la vitesse du Fluide à celle de l'Astre, sera  $\frac{3S}{2p d^3} \times \frac{zz}{1 - \frac{b^2}{2at}} + K$ , comme le donne la

formule de l'art. 50, quoique suivant cette formule il y ait une infinité de cas, où le Fluide va toujours du même côté sans faire d'oscillations.

## X.

Si au lieu d'un seul Fluide, il y en avoit deux contigus l'un à l'autre, dont les densités fussent  $\delta, \delta'$ , les hauteurs  $e, e'$ , & que  $q, q'$  fussent les espaces parcourus par chacun de ces Fluides pendant le tems  $t$ , &  $\alpha, \alpha'$  les quantités dont décroissent ou croissent leurs hauteurs pendant le même tems  $t$ ; faisant  $dq = k dt + r ds$ , &

$dq' = k'dt + r'ds$ , on auroit comme ci-dessus  $a = sr + S'$  &  $a' = s'r' + \sigma$ . Supposant, de plus, pour abrégér le calcul, que les deux Fluides eussent au commencement de leur mouvement une figure circulaire, on auroit (art. 76. n. 2 & 3) les deux équations suivantes . . .

$$(3 S \Delta(t, s) - \frac{p \delta \delta}{2a} \times \frac{dk}{dt}) \times \delta' + \delta' p \frac{da}{dt} = (3 S \Delta(t, s) - \frac{p \delta \delta}{2a} \times \frac{dk'}{dt}) \times \delta' + \delta' p \frac{da'}{dt};$$

$$\& - \frac{da'}{dt} + \frac{da}{dt} = \frac{3 S \Delta(t, s)}{p} - \frac{\delta \delta}{2a} \times \frac{dk'}{dt}.$$

Donc si on fait  $dk = ydt + \zeta ds$  . . . . . (A)

&  $dk' = y'dt + \zeta' ds$  . . . . . (B)

on aura  $dr = \zeta dt - \frac{ds}{r} - \frac{3 S [\Delta(t, s)] ds}{p r} + \frac{\delta \delta}{2 a s} \times \frac{\delta y ds}{\delta - \delta'}$   
 $\frac{\delta \delta' y ds}{2 a s (\delta - \delta')}$  . . . . . (C)

$$\& dr' = \zeta' dt - \frac{3 S \Delta(t, s) ds}{p r'} - \frac{ds}{r'} + \frac{\delta \delta' y ds}{2 a s'} + \frac{ds'}{r'} + \frac{3 S \Delta(t, s) ds}{p r'} - \frac{\delta \delta' y ds}{2 a s' (\delta - \delta')} + \frac{\delta \delta' y' ds}{2 a s' (\delta - \delta')} . . . . . (D)$$

XI.

Si dans l'art. VIII l'Astre étoit supposé en repos, c'est-à-dire, si  $b$  étoit = 0, alors le Problème seroit beaucoup plus simple. Car il se réduiroit à rendre  $m du - ds \Gamma s$ , &  $\mu dy + ds \Gamma s$ , des différentielles complètes; on auroit donc  $m = \phi u$ , ou  $\phi (s + s)$ , &  $\mu = \Delta y$  ou  
 aa ij

$\Delta (t - s)$ . Ainsi on trouveroit le mouvement que produiroit dans l'Athmosphere l'action du Soleil ou de la Lune, supposés en repos, ou la force centrifuge résultante de la rotation de la Terre, pourvû que dans l'un & l'autre cas l'Athmosphere fût réduite au plan de l'Equateur.

## XII.

Si on vouloit savoir le mouvement que la force centrifuge donneroit à l'Athmosphere, dans l'hypothese qu'elle fût homogene & d'une figure quelconque au commencement de son mouvement, & qu'elle couvrît un globe solide, on trouveroit, conservant les mêmes noms que ci-dessus, que . . . . .

$$\frac{v dt}{\epsilon} = \frac{dk dt}{ds} + \frac{k dt (\epsilon^2 \sqrt{-1} + \epsilon^{-2} \sqrt{-1}) \sqrt{-1}}{\epsilon^2 \sqrt{-1} - \epsilon^{-2} \sqrt{-1}},$$

$$\& \Sigma - \frac{da}{ds} = \frac{F(\epsilon^{2s} \sqrt{-1} - \epsilon^{-2s} \sqrt{-1})}{4 \sqrt{-1} \cdot p} = \frac{F^2}{2a} \times \frac{dk}{ds}; F$$

étant la force centrifuge en  $E$ . Si donc on fait  $dk =$

$$v dt + \epsilon ds, \text{ on aura } da = \epsilon \epsilon dt + \epsilon k dt \Delta s + \frac{F^2 v ds}{2a} +$$

$\Sigma ds + \Psi s \cdot ds$ ; d'où il est évident que le Problème se réduit, à trouver  $k$ , telle que  $dk = v dt + \epsilon ds$ , & que  $\epsilon dt + v ds + k dt \Delta s$  soit aussi une différentielle exacte. Or nous avons donné (article 12 & 16.) la méthode pour trouver la vitesse du Fluide, lorsqu'au commencement de son mouvement il a une figure, ou

Sphérique, ou d'une certaine Ellipticité. Ainsi il y a du moins quelques cas où l'on peut trouver dans l'hypothese présente, les intégrales qui donnent les valeurs de  $k$  & de  $\alpha$ . A l'égard de la solution générale, je la laisse à chercher à ceux qui aiment ces sortes de calculs.]

PROBLÈME GENERAL.

91. *Déterminer la vitesse & la direction du vent dans un endroit quelconque, en supposant que la Terre soit environnée de tous côtés d'un profond Ocean.*

Imaginons d'abord, qu'il n'y ait qu'un seul Astre qui agisse sur l'air; on peut résoudre le Problème, dans l'hypothese que les parties de l'air ne se nuisent point, ou ne se nuisent que très-peu dans leurs mouvemens: en ce cas, on trouvera par les *art.* 39 & 45 la vitesse & la direction du vent.

Ou bien, si on suppose que les parties de l'air se nuisent les unes aux autres, & que la direction du vent soit toujours dans le plan vertical qui passe, par l'Astre, on aura la solution par l'*art.* 77, ou en général par les *art.* 47, 70, 72, en regardant l'air comme homogene.

Enfin, on peut considérer séparément le mouvement de l'air dans chaque parallèle à l'Equateur, & dans le Méridien correspondant; & si on cherche séparément chacun de ces mouvemens par l'*art.* 90. n. II & III, & qu'en suite on trouve le mouvement composé qui en résulte;

on aura assez exactement la vitesse & la direction du vent dans un instant quelconque.

[ Si on demande à laquelle de toutes ces formules je crois devoir donner la préférence, je répondrai

1°. Que dans le cas où l'air est supposé homogène, & contigu à la surface solide du globe terrestre, les formules de l'*art.* 70, me paroissent celles dont on doit se servir.

2°. Qu'elles paroissent même pouvoir être d'usage dans le cas où l'air seroit imaginé formé de couches différemment denses. Car supposons, pour un moment, que l'air en cet état se meuve de manière, que tous les points d'une même colonne verticale aient le même mouvement horizontal; il est certain que l'air ayant peu de densité, la force qui pourroit déranger ce mouvement seroit fort petite. De plus, il est facile de voir que cette force donneroit aux parties supérieures un autre vitesse qu'aux parties inférieures, c'est-à-dire que les couches inférieures devroient se mouvoir en vertu de cette force, avec une vitesse angulaire différente de celle des couches supérieures: or il faudroit pour cela que les couches surmontassent leur adhérence mutuelle, qui est très-grande. On pourroit donc supposer que la force dont nous parlons n'ait aucun effet, & que l'air se meuve comme s'il étoit homogène. Sinon on aura recours à l'*art.* 85.

3°. Si on imagine que l'air couvre la surface de la Mer, alors, soit qu'on le prenne pour homogène, ou non,

on trouvera son mouvement par les *articles* 77 & 84.

Au reste, c'est à l'expérience à décider, laquelle de toutes ces formules mérite le plus d'être suivie dans la pratique. Il me suffit ici de les présenter toutes ensemble au Lecteur.]

Après avoir trouvé la vitesse du vent en vertu de l'action d'un seul Astre, on trouvera de même sa vitesse en vertu de l'action de l'autre Astre, & combinant ensemble ces deux vitesses, on aura le mouvement & la direction absolue que l'on cherche.

S C O L I E I.

92. Il est presque inutile d'avertir que les quantités *b* & *d*, qui sont proportionnelles à la vitesse & à la distance de l'Astre, ne sont point absolument constantes, quoique nous les ayons supposées telles dans tout le cours de cet Ouvrage. Mais on ne s'écartera pas beaucoup du vrai, si on prend pour les quantités *b* & *d*, leurs valeurs moyennes & constantes, ou bien les valeurs qu'elles ont à chaque instant, & qui se trouveront facilement par les Tables, soit du Soleil, soit de la Lune.

S C O L I E II.

93. Nous n'avons fait jusqu'à présent aucune mention du mouvement que la chaleur peut produire dans l'air :

parce que l'action & la cause de la chaleur étant inconnue, ses effets ne sauroient être soumis au calcul. Cependant, pour ne pas entièrement passer cet article sous silence, nous remarquerons que deux endroits quelconques de la Terre, également éloignés du Soleil, l'un vers l'Orient, l'autre vers l'Occident, doivent éprouver une chaleur semblable, laquelle doit seulement être un peu plus grande dans celui des deux qui est vers l'Orient, parce que le Soleil l'échauffe depuis plus long-tems.

Ainsi il faut ajouter à la force  $\frac{3S(c^{2u\sqrt{-1}} - c^{-2u\sqrt{-1}})}{4d^3\sqrt{-1}}$

une autre force qui soit comme une fonction de  $u$ , (†) & exprime une chaleur égale dans ces endroits. On peut supposer, de plus, à cause de la différente chaleur des deux Hémisphères, que l'air se meut au moins pendant quelque tems vers l'Ouest avec une vitesse constante, mais qui est tout-à-fait indéterminable. Toutes ces hypothèses ne rendront pas plus difficile la solution analytique du Problème de l'art. 47, (a) comme il est facile de

(†) Par exemple, on peut supposer cette force proportionnelle à  $\frac{(c^{u\sqrt{-1}} - c^{-u\sqrt{-1}})^2}{-4}$ , c'est-à-dire au carré du Sinus de

l'arc  $u$ ; ce qui s'accorde assez avec les principes de la Physique, suivant lesquels la chaleur Solaire peut être supposée en raison des carrés des Sinus des distances de cet Astre au Zenith.

(a) Je dis la *solution analytique*, & non pas la *solution absolue*; car il y a sur ce Problème une remarque importante à faire.

le conclure des *art.* 47 & 58. Ce seroit, à mon avis, entreprendre un travail inutile, que de tenter sur ce sujet des calculs plus exacts. [ Ce qu'on auroit de mieux à faire, seroit de chercher le mouvement que le Soleil donneroit à la masse de l'air, dans les hypothèses les plus générales qu'il seroit possible de faire sur la chaleur & l'élasticité, & de s'appliquer ensuite à déter-

Si l'expression de la vitesse du Fluide déduite de la force accélératrice de ses parties, & représentée par une fonction de la distance de l'Astre au Zenith, est telle, qu'en augmentant cette distance, ou de la circonférence entière, ou du double de la circonférence, ou du triple &c. l'expression de la vitesse ne soit pas la même dans tous ces cas, il n'est pas permis alors de supposer que la vitesse soit donnée par une fonction de la distance de l'Astre au Zenith, & le Problème est impossible, au moins pris en ce sens. Ainsi supposons pour nous faire entendre dans un cas simple, que dans l'hypothèse de l'*art.* 39 la force accélératrice soit proportionnelle à  $z z$ , la vitesse sera proportionnelle à  $\int \frac{z z dz}{\sqrt{1-zz}}$ ,

dont l'intégrale est  $Az\sqrt{1-zz} + B\int \frac{dz}{\sqrt{1-zz}}$ ,  $B$  &  $A$  marquant des constantes faciles à trouver. Or si on augmente d'un multiple  $nc$  de la circonférence, l'arc dont le Sinus est  $z$ , cette intégrale augmentera de la quantité  $Bnc$ .

De-là il s'enfuit en général, que la force accélératrice & la vitesse qu'elle produit, doivent toujours être exprimées par des fonctions du Sinus  $z$ ; supposant donc, par exemple, la chaleur proportionnelle à  $z z$ , on voit qu'outre la difficulté Physique, il se rencontreroit encore dans le Problème une difficulté analytique, peut-être insurmontable.

miner par les observations, quelles seroient celles d'entre ces hypothèses auxquelles on devroit s'arrêter par préférence. Mais cette discussion demanderoit une Dissertation beaucoup plus longue que ne l'est celle-ci; je pourrai en faire un jour l'objet de mes recherches, quand les travaux dont je suis occupé maintenant, m'en auront laissé le loisir.]



MEDITATIONES

BK2

11. 11. 1833


II Libro

125

**MEDITATIONES**  
**DE GENERALI**  
**VENTORUM CAUSA.**

**In quibus tentatur solutio Problematis ab**  
**Illustrissimâ Academiâ Berolinensî**  
**propositi.**

*Hæc ego de ventis : dùm ventorum ocyor alis  
Palantes pellit Populos FREDERICUS, & orbi,  
Insignis lauro, ramum prætendit olive.*



# MEDITATIONES DE GENERALI VENTORUM CAUSA,

*In quibus tentatur solutio Problematis ab Illustrissimâ  
Academiâ Berolinensi propositi.*

## ANALYSIS OPERIS.



UÆSTIO ab Illustrissimâ Academiâ proposita hæc est : *Invenire ordinem & legem venti, si Terra undique profundo Oceano circumdetur : adeò ut pro quovis tempore & loco, definiri possit venti directio & velocitas.* Huic quæstioni ut responderem,

saltem quantum rei natura ferre visa fuit, Dissertationem sequentem composui, quæ in tres partes dividi potest.

## ANALYSIS PARTIS PRIMÆ.

*Ab art. 1 ad art. 39.*

In hac primâ parte supponitur Terram esse globum fo-

A ij

lidum ; nullis impeditum inæqualitatibus , coopertumque aëre admodum raro , homogæneo & non elastico , qui primo in statu figuram sphericam habeat. Supponuntur omnes hujusce Fluidi partes urgeri à viribus quæ ad axem perpendiculares sint , & distantiis ab axe proportionales ; & non solum determinatur figura Fluidi hinc oriunda ; sed etiam ( *art. 12* ) inveniuntur oscillationes partium Fluidi , dum ex figurâ sphericâ quam antè habebat , ad novam figuram spheroidicam transit ; cujus modi oscillationes nemo adhuc videtur calculo subjecisse. Idem deinde solvitur Problema ( *art. 28* ) supponendo Fluidum quod globo incumbit , esse homogænum , sed non rarum , & attractionis materiæ rationem haberi. His inventis , facilè determinantur ( *art. 33* ) oscillationes quas iniret aër ex rotatione Terræ circa suum axem , si primùm aëris figura spherica fuisset ; inveniuntur pariter ejus oscillationes ex actione Solis ac Lunæ oriundæ , si Sol & Luna quiescerent. Fatendum reverâ est , si Sol & Luna quiescant , & rotetur Terra circa suum axem , partes aëris , figuram , quam ex hâc triplâ actione habere debent , brevi induturas , si eam ab initio non habuissent : proinde oscillationes aut nullas fore , aut saltem parùm diuturnas. Tamen de iis hîc differere non inconfulum duxi , tum quòd inde Theoria nova & curiosaf nascatur , tum quòd principia quibus hæc Theoria superstruitur , hîc applicatu facillima , maximæ utilitatis ad sequentia esse debeant.

## DE GENERALI VENTORUM CAUSA. 5

## ANALYSIS PARTIS SECUNDÆ.

*Ab art. 39 ad 90.*

In hâc secundâ parte inquiritur motus aëris ex actione Luminarium motorum ortus. Ad hunc determinandum ut perveniam, suppono primùm (*art. 39*) Terram esse globum solidum circumdatum lamellâ aëris sive homogenei, sive heterogenei, cujus partes sibi mutuò in motibus suis nocere non possint, adeòque ab actione astrorum omnem accipiant motum, quem possunt accipere; undè pro quovis loco definitur venti directio ac velocitas, explicaturque inter alia, quomodò fieri possit, ut ventus sub Æquatore perpetuus flet ab Ortum in Occasum. Deinde, cæteris ut antea manentibus, globus solidus (*art. 45*) in globum fluidum mutatur, aut saltem in globum solidum fluido denso & attractivo coopertum, ut aquâ maris; determinaturque in hâc hypothesis velocitas venti, & demonstratur hanc multùm diversam esse debere ab eâ, quæ vento super globum solidum flanti competit.

Inquiritur deinde (*art. 47*) velocitas venti, supponendo, ut reverâ est, partes aëris sibi mutuò in motibus suis nocere; & determinatur primùm velocitas aëris rari & homogenei globo solido incumbentis. Probatur directionem venti non multùm distare debere à plano verticali per astrum transeunte; & per calculum hæc velocitas determinatur, quæ quidem sub Æquatore invenitur dirigi semper ab Ortum in Occasum; ostenditur, (*art. 49*) quod valdè paradoxum est, plurimos esse casus in qui-

A iij.

bus fluidum, vi attractionis motum, sub astro debeat subsidere; cum contra extolli debere videretur.

Quæstio deinde generalissimè solvitur, & determinatur (*art. 65*) æquationes pro invenienda venti velocitate, non supponendo directionem venti esse in plano astri verticali; quæ quidem æquationes tam valdè sunt intricatæ atque compositæ, licet in casu omnium simplicissimo, ut ex iis per approximationes solùm erui posse videantur, quæ ad ventorum Theoriam pertinent.

Postea, (*art. 77*) assumitur rursus hypothesis, de directione venti in plano astri verticali, & determinatur venti velocitas, considerando Terram ut globum solidum, coopertum, 1°. Fluido attractivo homogeneo, aquâ nempe maris. 2°. Fluido raro cujus partes densitate inter se differant.

#### ANALYSIS PARTIS TERTIÆ.

*Ab art. 90 ad 93.*

In hâc parte nonnulla delibantur circà velocitatem venti, montibus, aut aliis obstaculis impediti. Dantur (*art. 90*) regulæ pro determinando venti motu, sub Æquatore, aut sub parallelo quolibet, aut etiam sub Meridiano quovis, intrâ montium parallelorum seriem flantis; sive montes illi usque ad superficiem Atmosphæræ ultimam extendantur, sive non. Postea exhibentur æquationes quarum ope possit haberi motus venti oscillantis in spatio montibus undique intercluso.

*DE GENERALI VENTORUM CAUSA.* 7

Tandem tentantur nonnulla circa velocitatem venti, intra seriem montium non parallelorum flantis; terminaturque hæc pars per solutionem Problematis haud inelegantis, quo inquiritur quænam esse debeat velocitas venti, posito 1°. Terram ad planum Æquatoris reductam esse, aut, quod idem est, Æquatorem montibus altissimis & parallelis esse coopertum. 2°. Athmosphæram primo motus instanti figuram quamlibet habere, modo à circulari parùm differat. 3°. Unicuique Athmosphære parti velocitatem quamlibet imprimi primo motus instanti. 4°. Dari locum ex quo astrum moveri incipit, & tempus ex quo movetur.

*Monitum.*

In totius operis cursu semper supposui, fluidum, aut fluida, sive homogœna, sive heterogœna, Terræ incumbētia, altitudinis esse satis parvæ respectu radii terrestris: quod nec experientiæ adversatur (siquidem aër non ultrà leucas paucissimas sese extendit, altitudo vero Oceani media  $\frac{1}{4}$  mill. circiter habetur) nec contradicit quæstioni propositæ ab Illustrissimâ Academiâ, quâ assumitur terra profundo Oceano cooperta; siquidem positâ altitudine Oceani, v. g. unius leucæ, Oceanus licet profundissimus, parvæ tamen altitudinis foret respectu radii terrestris.

Parum rationis habui motûs aëris, oriundi ex calore quem Sol in variis hujus partibus producit: cùm enim caloris causa, & vis Solis aërem calefaciens, tum in prin-

cipio, tùm in aëtionis ordine & effectu prorsùs ignotæ  
 sint, inde nihil deduci posse mihi visum est, unde venti  
 directio & velocitas pro quovis loco determinaretur, ut  
 Academia postulat. Contemplatus igitur sum solam velo-  
 citatem aëris, ex cã Solis & Lunæ aëtionem natam, quam  
 definire Newtonus docuit; quam præterea Illustrissimæ  
 Academiæ Programma, ut præcipuam ventorum causam  
 videtur indicare, his verbis: *Le mouvement des vents ne se-  
 roit peut-être déterminé que par ces trois causes; savoir, le  
 mouvement de la Terre, la force de la Lune, & l'activité  
 du Soleil. Comme ces trois choses suivent un ordre certain,  
 les effets qu'elles produisent, doivent aussi subir des change-  
 mens dans un ordre semblable.* Quibus verbis, ni fallor, Lu-  
 na, quæ non potest aërem calefacere, tamen ut motùs  
 aëris causa, saltem æqualis Soli, videtur assignari. Præ-  
 terea postulatur velocitas & directio venti oriunda ex  
 causis quæ ordinem sequantur certum: quas inter causas  
 vis Solis aërem calefaciens videtur non posse recenseri,  
 quippe quæ, ordinem, si non certum, saltem ignotum  
 sequatur. Fateor plurimos hætenùs fuisse authores, qui  
 præcipuam ventorum causam à calefaciente Solis aëtionem  
 oriri contenderunt: sed, præterquàm quòd aëtio hæc sen-  
 sibilem non producit effectum, nisi in aërem terræ vici-  
 nissimum, ut constat experimentis suprã altissimos mon-  
 tes factis; ideò tantùm ab hæc præcipuè causã ventum  
 nasci crediderunt, quod aliter explicari non posse visum  
 est ventus Orientalis perpetuus flans sub Æquatore in-  
 ter Tropicos; nos vero ex unicã Solis & Lunæ attractio-  
 ne

DE GENERALI VENTORUM CAUSA. 9

ne deduci posse ventum illum ostendemus.

Ne tamen circà Problema propositum desiderari aliquid posse videretur, nonnulla in finem Dissertationis subjuncti de aëris motu, quatenùs à diversarum hujus partium calore oriri potest.

Elasticitatis autem aëris, saltem quatenùs à Solis & Lunæ attractivâ actione intendi aut remitti potest, nullam, in ventis determinandis, rationem habendam esse demonstravi. (*art. 37. n. 2.*)

Quod atinet ad ventos irregulares, ex vaporibus, aut ex nubibus, aut ex terrarum situ, aut ex aliis causis prosùs incognitis oriundos, de iis nullam omninò mentionem feci, utpote quorum causa & calculus, fatente Illustrissimâ Academiâ, jure exigi non potest.

Antequam autem huic Præfatiunculæ finis sit, inconsultum non duco admonere, nonnulla huc & illuc passim esse inserta, quæ, licet ad quæstionem propositam directè ac strictè non pertineant, tamen ex quæstionis solutione nata, conducere posse visa sunt, sive ad Mechanicæ, sive ad Hydrodynamicæ, sive ad Analyseos incrementum ac perfectionem. Hujus modi sunt inter alia 1°. quæ in *art. 31* de figurâ terræ exhibui, in quo articulo nonnulla circà hanc materiam paradoxa demonstrantur. 2°. Examen causæ ob quam actio Solis & Lunæ nullum in Barometro sensibilem producant effectum, (*art. 35*) simulque rationum, quibus Clarissimus *Daniel Bernoulli*, idem Phænomenon explicare conatus est. 3°. Principium generale (*art. 12*) ad omnia, sive Dy-

B

namicæ, sive Hydrodynamicæ Problemata solvenda, maximi futurum emolumenti. 4°. Annotationes in articulo 79 insertæ, circâ quantitates imaginarias, & methodus singularis art. 80 exposita, pro integrandis quibusdam æquationibus, ut & solutio Problematum analyticorum (art. 87 & 89); hæc autem omnia, ne iudicibus moram nimiam legendo injicerent, ab articulis absolutè necessariis, stellulâ (\*) distinguere libuit.

Id unum jam restat, ut cogitata hæc Illustrissimæ Academicæ iudicio submittam, quæ quidem absolutè perficere, & in debitum ordinem accuratè redigere, mihi non licuit, tum temporis angustiis devincto, tum laboribus aliis impedito atque distracto.

PROPOS. I. LEMMA.

1. Sit Ellipseos quadrans  $gnd$  (Fig. 1) qui à circulo quam parùm differat: dicatur semi axis minimus  $Cg$ ,  $r$ , differentia semi axium  $a$ , & sinus anguli  $gCn$ ,  $z$ , pro sinu toto  $r$ : dico fore  $Cn - Cg = \frac{a z z}{r r}$  quàm proximè.

Descripto enim circulo  $gO\omega$ , & ductâ ordinatâ  $nKS$ , erit, ob triangula similia  $nKO$ ,  $SnC$ ;  $nO$  seu  $Cn - Cg = \frac{nK \times nS}{nO} = \frac{a \cdot nS^2}{r r}$ . Ergo &c.

PROPOS. II. PROBLEMA.

2. Detur globus solidus  $PEpV$ , (Fig. 2) conflatus ex variis superficiebus circularibus  $PEp$ ,  $KcT$ ,  $OF\sigma$ , soli-

dis, & diversæ, si libuerit, densitatis: coopertus sit globus iste fluido homogeneo & non elastico, DEPGIV<sub>p</sub>HD; hujus fluidi particule omnes N, sollicitentur à viribus quæ agant secundum NA parallelam ad DC, quæque sint sinibus respondentibus NS proportionales: præterea urgeantur partes fluidi versùs centrum C, vi, quæ sit ut functio quæcumque distantie, & longè major quàm est vis secundum NA; quaeritur curvatura gnd, (Fig. 3) quam fluidi superficies induere debet, ut sit in æquilibrio.

Patet, 1°. curvam gnd esse quàm proximè circula-rem; 2°. gravitatem secundum nC in quovis puncto n posse assumi pro constante, & supponi = p; 3°. vim ortam ex gravitate p secundum nC & vi datâ secundum nA, perpendicularem esse debere ad curvam gnd in n; 4°. si appelletur φ vis in d, parallela, & respondens ipsi vi secundum nA, erit vis secundum nA (hyp.) =  $\frac{\phi z}{v}$ . Unde

vis secundum nv, quàm proximè =  $\frac{\phi z \sqrt{rr - zz}}{rr}$ : qua-

re, descripto circulo gOω, erit, ob æquilibrio, ,

$p : \frac{\phi z \sqrt{rr - zz}}{rr} :: \frac{rdz}{v[rr - zz]} : d(nO)$  quàm proximè:

proinde  $nO = \frac{\phi z z}{2pr}$ . Ergo  $Cn - Cg = \frac{\phi z z}{2pr}$ ; quamobrem

(art. 1) curva gnd est Ellipsis, cujus axium differentia

$$a = \frac{\phi r}{2p}$$

## COROLLARIUM I.

3. Ut habeatur linea  $Gg$ , seu distantia inter punctum  $G$  circuli  $GND$ , & superficiem  $gnd$ , advertendum est, solidum per  $GND\omega g(a)$  æquale esse debere solido per  $gd\omega g$ . Porro si appelletur  $2n$  ratio circumferentiæ ad radium, &  $Gg, k$ ; solidum prius est  $k \cdot 2nr.r$  quàm proximè: posterius verò est æquale valori ipsius  $\int \frac{r dz}{z}$   $\times$   $2nz \times \frac{rdz}{\sqrt{rr-zz}}$ , cum  $z = r$ , hoc est  $\frac{r}{p} \times \frac{2nr^2}{3}$ . Erit ergo  $k = \frac{pr}{3p}$ .

## SCOLIUM I.

4. Patet hanc quantitatem  $k$  non debere esse majorem ipsâ  $GP$ , sive, factâ  $GP = 1$ , non debere esse  $1 < \frac{pr}{3p}$ : secus eveniret, ut, fluido ad æquilibrium composito, aliqua superficiem  $PE$  pars nuda remaneret, nec eadem esse deberet solutio præcedens.

## SCOLIUM II.

(\*) 5. Si quæratur quænam esse debeat solutio Problematis in casu quo  $k$  invenitur major quam  $GP$ , (Fig. 4)

(a) Per hæc verba, *solidum per  $GND\omega g$* , & similia, deinceps intelligam solidum revolutione figuræ  $GND\omega g$  circa  $CP$  generatum.

fiat  $GP = \epsilon$ ; assumaturque ob calculi facilitatem,  $\epsilon$  quantitas parva, respectu ipsius  $r$ : deinde fluidum, in statu æquilibrium, supponatur pervenire ad situm  $g\delta E$ , adeo ut pars  $Pg$  superficiæ globi solidi, fluido nudetur; eritque (factâ  $E\delta = n$ , &  $gV = z'$ )  $n = \frac{\phi r}{2p} \times \frac{rr - z'z'}{rr} = \frac{\phi r}{2p} \times \frac{CV^2}{CP^2}$ .

Pariter invenietur  $NO = \frac{\phi}{p} \times \frac{OL^2 - gV^2}{2r} = \frac{\phi}{p} \times \frac{zz - z'z'}{2r}$ .

Unde solidum per  $gN\delta E$  invenietur (assumptâ  $z'$  constante) = solido per  $gECV$  multiplicato per  $\frac{\phi}{p}$ , de-

tractâ quantitate  $\frac{\phi \cdot nCV \cdot gV^2}{p}$ . Porro solidum per  $gN\delta E$

æquale esse debet solido per  $GNDEP$  seu  $\epsilon \cdot 2nrr$ :

erit ergo  $\epsilon \cdot 2nr = \frac{\phi}{p} \times \left[ \frac{r}{3} \cdot 2nr \sqrt{rr - z'z'} \right] + \frac{n z' z' \sqrt{rr - z'z'}}{3} - n z' z' \sqrt{rr - z'z'} \left. \right]$ . Unde habe-

bitur  $2\epsilon rr = \frac{2\phi}{3p} \times (rr - z'z')^{\frac{3}{2}}$ ; seu  $\frac{3p^2 rr}{\phi} = CV^3$ . In-

notescet igitur pars  $Pg$  superficiæ globi, quæ fluido nudari debet. Cùm autem  $CV$  non possit esse major ipsâ  $r$ ,

sequitur Problema solvi non posse nisi in casu quo  $\frac{3p^2}{\phi}$

non est major ipsâ  $r$ , hoc est in casu quo  $\epsilon$  non est ma-

ior ipsâ  $\frac{\phi r}{3p}$ : quæ propositio inversa est articuli 4.

B iij:

## COROLLARIUM II.

6. Iisdem jam positis ac in *art.* 3, erit  $Nn$  (Fig. 3.) seu

$$Gg - nO = \frac{\phi}{p} \left( \frac{r}{3} - \frac{zz}{2r} \right); \text{ \& solidum per } GNng = \\ \int \frac{\phi}{r} \left( \frac{r}{3} - \frac{zz}{2r} \right) \times 2nz \times \frac{r dz}{\sqrt{rr - zz}} = \frac{\phi n z z \sqrt{rr - zz}}{3p}.$$

## COROLL. III.

7. Quapropter si quaeratur punctum  $v$  tale, ut sit solidum per  $nv m M$  = solido per  $GNng$ , capienda est  $nv$  talis, ut sit  $2nz \cdot nv \times \frac{r}{3} \times \left( 1 - \frac{CP^2}{CG^2} \right) = \frac{\phi n z z \sqrt{rr - zz}}{3p}$ :

$$\text{unde si fiat } CP = \rho; \text{ erit } nv = \frac{\phi r^2 z \sqrt{rr - zz}}{p \cdot 2r (r^2 - \rho^2)}.$$

## SCOLIUM III.

8. Si altitudo  $GP$  fluidi, respectu radii  $CP$  parva sit, aliâ Methodo perfacili obtineri potest superficiæ  $gn d$  natura, nempe supponendo columnas duas  $Mn$ ,  $mv$ , esse sibi invicem infinitè propinquas; & advertendo, excessum ponderis columnæ  $mv$  suprâ  $nM$  æquari vi particulæ  $Mm$  secundum  $Mm$ ; unde erit quàm proximè,

$$p \times d(nO) = \frac{r dz}{\sqrt{rr - zz}} \times \frac{\phi z \sqrt{rr - zz}}{rr} = \frac{\phi z dz}{r}, \text{ ut} \\ \text{in } \textit{art.} 2.$$

Si non sit  $PG$  parva respectu ipsius  $CP$ , tunc in æstimandâ ponderis columnarum  $mv$ ,  $nM$ , differentiâ, ne-

gligi non potest vis secundum  $nN$  agens, orta ex vi  $\frac{\phi z}{r}$  secundum  $nA$ , proinde vis particulæ  $Mm$  secundum  $Mm$ , tunc non est æqualis ipsi  $pd(nO)$ ; siquidem  $pd(nO)$  tunc haberi non potest pro excessu ponderis columnæ  $m$  supra columnam  $nM$ .

S C O L I U M IV.

9. Ex hypothefi quòd fit  $GP$  parva respectu  $CP$ , patet fore excessum ponderis columnæ  $Ed$  supra  $Pg$ , quàm proximè æqualem  $\frac{\phi r}{2}$ .

S C O L I U M V.

10. Iisdem positis, si fiat  $r - \rho = \epsilon$ , erit in *art. 7*,  $n\rho = \frac{z\sqrt{[rr - zz]}}{6r} \times \frac{\phi}{r}$ . unde liquet lineam  $n\rho$  non posse esse respectu ipsius  $r$  parvam, ut in *art. 7* supposuimus, nisi sit  $\frac{\phi r}{6rp}$  quantitas parva; quare positâ  $\epsilon$  admodum parvâ respectu ipsius  $r$ , debet esse  $\phi$  multò minor respectu ipsius  $6p$ , quàm  $\epsilon$  respectu ipsius  $r$ .

C O R O L L. IV.

11. Si per punctum quodvis  $\gamma$  lineolæ  $Gg$ , (Fig. 5) describatur curva  $\gamma Ii\delta$ , quæ lineas  $Gg$ ,  $Nn$ , in datâ ratione fecerit, h. e. ita ut sit ubique  $NI$  ad  $Nn$  ut  $G\gamma$  ad  $G$ ;  $g$  evidens est,

1°. Si  $uv$  sit parva respectu  $r$ , rectam  $Nv$  in eadem ferè ratione fecari in  $i$ , quàm  $Nn$  in  $I$ : quapropter fore,  $Mm : M\mu :: Nn : NI :: Gg : G\gamma$ .

2°. Solidum per  $G\gamma IN$  fore quoque ad solidum per  $GgnN$ , ut  $G\gamma$  ad  $Gg$ ; unde solidum per  $G\gamma IN$  erit = solido per  $Ii\mu M$ , siquidem solidum per  $Ii\mu M$ , est ad solidum per  $nmM$ , (æquale solido per  $GgnN$ ) ut  $M\mu$  ad  $Mm$  sive ut  $G\gamma$  ad  $Gg$ .

3°. Sinum complementi anguli ferè recti  $gnC$ , esse ad sinum complementi anguli ferè recti  $\gamma IC$ , ut  $Gg$  ad  $G\gamma$ , sive ut  $Mm$  ad  $M\mu$ ; proinde, si considerentur anguli in  $I$  &  $i$  ut æquales, fore sinum complementi anguli in  $i$  ad sinum complementi anguli in  $n$ , ut  $M\mu$  ad  $Mm$ , quàm proximè.

### PROPOS. III. PROBLEMA.

12. *Iisdem positis ac in propositione præcedente, quaritur quemodò & quibus gradibus, fluidi  $GDEP$  superficies Sphærica  $GND$ , perveniat in situm  $gnd$ ; seu, quod idem est, quaritur lex motûs massæ  $GDEP$  dum pervenit in situm  $gdEP$ .*

Quò facilius fiat calculus, assumemus ut in art. 7, 8, 9,  $\epsilon$  valde parvam respectu ipsius  $r$ ; &  $\phi$  adhuc multò minorem respectu  $\epsilon p$ ; his concessis, dico supponi posse sine errore sensibili. 1°. Fluidi columnam  $NM$  pervenire in  $vm$ , describente puncto  $N$  lineam  $Nv$ , & puncto  $M$  lineam  $Mm$ . 2°. Vim acceleratricem quæ agit, tum in punctum  $M$ , tum in punctum  $N$ , perpendiculariter

lariter ad  $NM$ , esse, in quovis puncto  $\mu$  lineæ  $Mm$ , ad vim  $\frac{\phi z \sqrt{rr - zz}}{rr}$ , ut  $m\mu$  ad  $Mm$ . 3°. Eodem tempore, quo punctum  $N$  pervenit in  $i$ , aut in  $r$ , pervenire punctum  $G$  in  $\gamma$  aut in  $g$ , & punctum  $D$ , in  $\delta$  aut in  $d$ , superficiemque  $GND$  mutari in  $\gamma i \delta$  aut  $gnd$ .

Harum suppositionum primam admitti posse inde patet, quòd, cum puncta  $N$  &  $M$ , sint (*hyp.*) sibi invicem admodum propinqua, eorum velocitas perpendicularis ad  $NM$  eadem ferè esse debet: & prætereà ob rationes alias dilucidius infrà patebit.

Jam verò ut secunda & tertia suppositio legitimæ demonstrantur, supponamus eas reverà esse legitimas, & videamus quid inde sequatur. Advertendum ergò, cum pervenit punctum  $N$  in  $i$ , & punctum  $M$  in  $\mu$ , fore (descriptâ ut in *art.* 11 curvâ  $\gamma I \delta$ ) solidum per  $G\gamma IN =$  solido per  $Ii\mu M$ . Prætereà vis totalis quæ punctum  $N$  aut  $i$  perpendiculariter ad radium sollicitat, est  $\frac{\phi z \sqrt{rr - zz}}{rr}$ :

quare si vis acceleratrix supponatur  $\frac{\phi z \sqrt{rr - zz}}{rr} \cdot \frac{m\mu}{Mm}$ ;

evidens est vim residuam fore  $\frac{\phi z \sqrt{rr - zz}}{rr} \times \frac{M\mu}{Mm}$ . Atqui

si legitimæ sint suppositiones ambæ, quas nunc ad examen revocamus, 1°. hæc vis residua talis esse debet, ut nullum in punctis  $\mu$  &  $i$  motum producat (*a*), siquidem

(*a*) §. II. Generalis hæc est Mechanicæ regula: si corpus velocitate *a* moveri tendat, velocitate verò *b* reverà moveatur, propter ob-

(hyp.) ex vi totali  $\frac{\phi x \sqrt{rr - xx}}{rr}$ , pars sola  $\frac{\phi x \sqrt{rr - xx}}{rr} \times \frac{m \mu}{Mm}$

ad movenda puncta  $i$  &  $\mu$  impenditur : 2°. tempus ad percurrendam  $M\mu$  aut  $Mm$  insumptum, pendere non debet à situ puncti  $M$  in circulo  $PME$ : nam siquidem, ex hypothefi, omnia ipsius  $GN$  puncta, eodem momento tranfeunt in  $\gamma id$ , nempe eo tempore quo punctum  $N$  transit in  $i$ ; tempus illud debet idem esse pro punctis omnibus  $N$ ; hoc est, tempus quo  $Mm$  percurritur, pendere non debet à situ puncti  $M$ .

Videamus ergò, utrùm ex vi  $\frac{\phi x \sqrt{rr - xx} \times \mu M}{rr \cdot Mm}$ , perpendiculariter ad  $i\mu$  agente, nullus reverà oriatur mo-

staculum, aut aliam causam quamlibet, potest supponi velocitas  $a$  composita ex velocitate  $b$ , & alià velocitate  $c$ , eaque velocitas  $c$  talis esse debet, ut si sola corpori impressa fuisset, manentibus iisdem circumstantiis, corpus quietum permansisset. Hoc principio nituntur leges motus corporis obliquè in planum incurrentis: velocitas enim  $a$  quâ corpus moveri tendit dum planum percutit, componitur ex velocitate  $b$  plano parallelâ, quâ corpus reverà movetur post ictum, & velocitate  $c$  ad planum perpendiculari, quæ annihilatur, quæque, si sola egisset, nullum in corpore produxisset motum. Proinde, si velocitas  $b$  sit ejusdem directionis cum velocitate  $a$ , velocitas  $a$  poterit considerari ut composita ex  $b$  &  $a - b$ , propter  $a = b + a - b$ . Ergo si solam velocitatem virtualem  $a - b$  habuisset corpus, debuisset quietum permanere. Jam verò si corpus  $A$  secundùm  $AG$  (Fig. 6) moveatur in linea  $PAD$  vi acceleratrice reali  $= \pi$ , simulque secundùm  $AP$  sollicitetur vi  $= F$ , dico corpus illud  $A$ , si secundùm  $AP$  urgetur vi  $= F - \pi$ , in quiete permanfurum. Sit enim  $u$  velocitas corporis  $A$  secundùm  $AG$  in instanti quovis; instanti sequenti  $dt$ ,

tus; & præterea utrùm tempus per  $M\mu$  &  $Mm$ , idem sit in omnibus punctis  $M$ .

Est (art. 2) sinus complementi anguli  $gnC$  ad sinum totalem ut  $\frac{\phi z \sqrt{rr - zz}}{rr}$  ad  $p$ ; & (art. 11) sinus complementi anguli  $\gamma iC$  est ad sinum complementi anguli  $gnC$ , ut  $M\mu$  ad  $Mm$ . Ergo sinus complementi anguli  $\gamma iC$  erit ad sinum totalem, ut  $\frac{\phi z \sqrt{rr - zz}}{rr} \times \frac{M\mu}{Mm}$  ad  $p$ ;

si nihil obfaret, velocitas foret  $u + Fdt$ ; sed velocitas illa (hyp.) est vera  $u + \pi dt$ ; porro velocitas  $u + Fdt = u + \pi dt + Fdt - \pi dt$  h. e. componitur ex velocitate  $u + \pi dt$  & velocitate  $Fdt - \pi dt$  secundum  $AG$ : Quare ex principio generali velocitas  $Fdt - \pi dt$  talis esse debet, ut, si sola corpori  $A$  imprimeretur, corpus illud nullum haberet motum; seu, quod eodem recidit, corpus  $A$ , secundum  $AG$  sollicitatum vi  $= F - \pi$ , deberet esse in æquilibrio. Igitur in præfente hypothesi punctum  $i$  aut  $\pi$  sollicitatum vi  $= \frac{\phi z \sqrt{rr - zz}}{rr} \times \frac{M\mu}{Mm}$  debet in æquilibrio permanere, siquidem vis  $F$  hic  $= \frac{\phi z \sqrt{rr - zz}}{rr}$ ; vis  $\pi = \frac{\phi z \sqrt{rr - zz} \cdot m\mu}{rr \cdot Mm}$ ; proinde vis  $F - \pi = \frac{\phi z \sqrt{rr - zz} \times M\mu}{rr \cdot Mm}$ .

§. II. Hinc (quod ad sequentium intelligentiam maximè advertendum) si corpus  $A$ , non secundum  $AP$ , sed secundum  $AD$  motum supponeretur, & vis ejus acceleratrix  $\pi$  foret secundum  $AD$ , agente semper vi  $F$  secundum  $AP$ , foret  $u + \pi dt$  ejus velocitas realis in instanti  $dt$ , &  $u - Fdt$  velocitas, quam habere debuisset, si nullum impedimentum obstitisset. Porro est  $u - Fdt = u + \pi dt - Fdt - \pi dt$ . Unde si imprimeretur corpori  $A$  sola velocitas  $-Fdt - \pi dt$ , secundum  $AD$ , seu quod idem est, si ageret in corpus  $A$  vis sola  $F + \pi$  secundum  $AP$ , corpus illud in æquilibrio stare deberet.

C ij

proinde vis in puncto  $i$ , orta ex gravitate  $p$  versus  $C$ , & ex vi  $\frac{\varphi z \sqrt{[rr - zz]}}{rr} \times \frac{M\mu}{Mm}$  perpendiculari ad  $i\mu$ , erit ad curvam  $\gamma i \delta$  in  $i$  perpendicularis. Ergo nullus ex vi  $\frac{\varphi z \sqrt{[rr - zz]}}{rr} \times \frac{M\mu}{Mm}$  oriatur motus.

Jam verò siquidem est  $Mm = \frac{\varphi z \sqrt{[rr - zz]}}{6ip}$ , & vis acceleratrix in  $M = \frac{\varphi z \sqrt{[rr - zz]}}{rr}$ , patet vim in  $M$  fore ubique proportionalem distantiae à puncto  $m$ ; quare tempus per  $Mm$  erit idem pro omnibus punctis  $M$ , ut & tempus per  $M\mu$ , siquidem  $M\mu$  est ubique ad  $Mm$  in ratione constanti  $G\gamma$  ad  $Gg$ .

Ergo legitimæ sunt secunda & tertia suppositio. *Quod erat demonstrandum.*

#### COROLLARIUM I.

13. Si corpus vel punctum  $M$  urgeatur versus punctum  $m$  vi acceleratrici quæ in diversis punctis  $\mu$ , sit  $\frac{F \cdot m\mu}{Mm}$ ; Geometris notum est, fore (appellatâ  $Mm$ ,  $6$ ;  $m\mu$ ,  $x$ ; factoque tempore in percurrendâ  $M\mu$  infumpto  $= t$ ),  $dt = - \frac{dx \sqrt{6}}{\sqrt{F} \cdot \sqrt{[6^2 - x^2]}}$ . Quare tempus totum in percurrendâ  $Mm$  infumptum, erit ad tempus  $\theta$ , quod corpus gravitate  $p$  animatum, in percurrendâ lineâ datâ  $a$  infumeret, ut  $\frac{n \sqrt{6}}{2 \sqrt{F}}$  ad  $\frac{\sqrt{2a}}{\sqrt{p}}$ ; significante semper  $2n$  ratio-

nem circumferentiæ ad radium : ergò si substituatür pro  $Mm$  ( $\phi$ ), hujus valor  $\frac{\phi z \sqrt{[rr - zz]}}{6ip}$  & pro  $F$  hujus valor  $\frac{\phi z \sqrt{[rr - zz]}}{rr}$ , invenietur tempus in percurrendâ  $Mm$  infumptum =  $\frac{inr}{4\sqrt{[341]}}$ .

Res est admodum notatu digna, quòd tempus in percurrendâ  $Mm$  infumptum, à vi  $\phi$  nullo modo pendeat; sed tantum ab  $r$  & ab  $z$ . At si propiùs ad rem attendamus, mirum illud videri non debet, quandoquidem linea  $Mm$  ( $\frac{\phi z \sqrt{[rr - zz]}}{6ip}$ ) est proportionalis ipsi vi  $\frac{\phi z \sqrt{[rr - zz]}}{rr}$  secundum  $Mm$ .

C O R O L L. II.

14. Patet, punctum  $M$ , cum in  $m$  pervenit, non quieturum, sed ultrà versus  $m'$  pergere debere, describendo lineam  $mm' = Mm$ ; tum ex  $m'$  in  $m$ , deinde in  $M$  perventurum; & sic, eundo & redeundo, oscillationes initurum, quæ quidem perpetuò forent duraturæ, nisi ob tenacitatem & friccionem partium fluidi paulatim languesceret motus, tandemque extingueretur, quiescente puncto  $M$  in  $m$ , & fluido in statu  $g dEP$  stante. Erit ergò tempus unius oscillationis de  $M$  in  $m'$ , =  $\frac{inr}{2\sqrt{[341]}}$ , & tempus duarum oscillationum =  $\frac{inr}{\sqrt{[341]}}$ .

C iij;

15. Generatim erit  $dt$  ad  $\theta$ , ut  $-\frac{dx\sqrt{c}}{vF.v[\frac{c^2}{v^2}-xx]}$  ad  $\frac{v^2a}{v^2p}$ ; hoc est  $\frac{2dt\sqrt{[3a1]}}{dr} = \frac{-dx}{v[\frac{c^2}{v^2}-xx]}$ : proinde, assumpto  $c$  pro numero cujus Logarithmus est unitas, erit  $c \frac{2t\sqrt{[3a1]}.v^{-1}}{dr} = \frac{x+v[\frac{xx-c^2}{c}]}{c}$ . Ergo  $\frac{x}{c} =$

$$c \frac{4t\sqrt{[3a1]}.v^{-1}}{dr} + c \frac{-4t\sqrt{[3a1]}.v^{-1}}{dr}. \text{ Quare } Mm =$$

$$\frac{\phi z \sqrt{[rr-zz]}}{6ps} \times \left[ 2 - \frac{(c \frac{4t\sqrt{[3a1]}.v^{-1}}{dr} - c \frac{-4t\sqrt{[3a1]}.v^{-1}}{dr})}{2} \right]$$

&  $NI = \frac{\phi}{p} \left( \frac{r}{3} - \frac{zz}{2r} \right) \times \left[ 2 - \frac{(c \frac{4t\sqrt{[3a1]}.v^{-1}}{dr} - c \frac{-4t\sqrt{[3a1]}.v^{-1}}{dr})}{2} \right]$

quandoquidem est  $NI$  ad  $M\mu$ , ut  $Nn$  seu  $\frac{\phi}{p} \times \left( \frac{r}{3} - \frac{zz}{2r} \right)$  est ad  $Mm$  seu  $\frac{\phi z \sqrt{[rr-zz]}}{6ps}$ .

## SCOLIUM I.

16. Jam probavimus lineam  $Nv$  esse directionem Fluidi particulæ  $N$ ; angulum autem  $INv$  determinare facile est, siquidem sunt  $Nn$ , &  $nv$  cognitæ (*art. 6 & 7*): proinde in puncto quovis  $i$  facillè habebitur velocitas Fluidi absolutæ secundum  $iv$ .

SCOLIUM II.

17. Quod attinet ad directionem & velocitatem absolutam punctorum inter  $N$  &  $M$  (Fig. 7) jacentium, hæc modo sequenti determinabitur. Descripto per punctum quodvis  $L$  lineæ  $GP$  circulo  $LRV$ , assumatur  $L\lambda = \frac{Gg \times LP}{GP}$ , & describatur curva  $\lambda q\mu$  talis, ut sit ubique  $Rq:$

$Nn :: L\lambda : Gg$ ; rursus, factâ  $Ll = G\gamma \times \frac{LP}{GP}$ , per punctum  $l$  describatur curva  $lr\theta v$ , in quâ sit ubique  $Rr : NI :: Ll : G\gamma$ . Jam verò erit solidum per  $G\gamma IN$  ad solidum per  $LlrR$ , ut  $G\gamma$  ad  $Ll$  (propter  $GP$  respectu  $r$  parvam) hoc est ut  $GP$  ad  $LP$ ; est autem solidum per  $Ni\mu M$  ad solidum per  $Ro\mu M$ , ut  $NM$  ad  $RM$  sive ut  $GP$  ad  $LP$ ; quare, cum sit solidum per  $Ni\mu M =$  solido per  $G\gamma IN$ , erit solidum per  $LlrR =$  solido per  $Ro\mu M$ . Ergò, veniente puncto  $N$  in  $i$ , veniet punctum  $R$  in  $o$ , & ejus velocitas secundum  $Rr$ , erit ad velocitatem puncti  $N$  secundum  $NI$ , ut  $L\lambda$  ad  $Gg$ , sive ut  $LP$  ad  $GP$ ; proinde cum eadem sit velocitas punctorum  $R$  &  $N$ , in sensu parallelo ad  $Mm$ , facillè habebitur motus absolutus puncti  $R$  secundum  $Ro$ .

SCOLIUM III.

18. In solutione Problematis præcedentis demonstravimus vim  $\frac{\phi z v [vr - zz] \cdot M\mu}{rr \cdot Mm}$  talem esse, ut in puncto  $i$

cùm gravitate  $p$  versùs  $C$  æquilibrium faciat. Demonstrare etiam potuiffemus, particulam Fluidi  $Mm$ , hanc solâ vi  $\frac{\phi z \sqrt{rr - zz} \cdot M\mu}{Mm \cdot rr}$  animatam in æquilibrium futuram fuisse cum columnis  $IM$ ,  $\mu i$ , seu potius cum differentiâ ponderis istarum columnarum. Si hanc viam iniiffemus, inveniffemus  $\frac{\phi z \sqrt{rr - zz} \cdot m\mu}{rr \cdot Mm}$  (qui excessus est vis

sollicitatricis  $\frac{\phi z \sqrt{rr - zz}}{rr}$ , suprâ  $\frac{\phi z \sqrt{rr - zz} \cdot M\mu}{rr \cdot Mm}$ ) pro valore vis acceleratricis puncti  $M$ ; qui valor præcisè æqualis est valori jam definito vis acceleratricis, in punctum  $N$  parallelè ad  $Mm$  agentis. Unde denuò confirmatur prima suppositio in Propof. 3. solutione factâ, quòd eadem sit velocitas punctorum  $M$  &  $N$  parallela ad  $Mm$ , (quam deinceps *velocitatem horizontalem* vocabo.)

Id unum contrâ hanc hypothesim objici posse suspicor, quòd, cùm sit linea  $vm < MN$ , difficulter concipi queat, quomodò linea  $NM$  puncta omnia in  $vm$  perveniant. At 1°. cùm linea  $NM$  &  $vm$  quàm parùm inter se differant, error ex illarum discrimine exurgens in determinando motu punctorum linea  $NM$ , quàm minimus esse debet. 2°. Hypothesis nostra planè similis & analoga est illi, quam huc usque assumpserunt scriptores omnes Hydraulici, nempe, Fluidi ex vase verticali figuræ cujussibet effluentis, particulas omnes in eadem horizontali rectâ positas, eundem habere motum verticalem;

calem; quæ hypothesi experientiâ abundè confirmatur; & eidem tamen difficultati obnoxia est, quam nunc perpendimus. 3°. Adjici-ne liceret (sed hæc leviter conjector) Fluidi partes in lineâ  $NM$  sitas, considerari forsan posse ut globulos elasticos, qui suam tantillùm immutent figuram, ut spatium  $vm$  occupent. Sint nempe  $NM$ ,  $GT$ , (Fig. 8) columnæ duæ infinitè propinquæ; perveniat  $NM$  in  $vm$ , &  $GT$  in  $St$ ; paret esse debere solidum per  $NMTG =$  solido per  $vStm$ . Unde, cùm sit  $vm$  minor quàm  $NM$ , basi posterioris solidi debet esse major basi prioris in eadem ratione; supponi ergò forsan potest globulos elasticos prius solidum occupantes, fieri tantillùm Sphæroidales, ut posterius solidum occupent, diminutâ paululùm diametro secundùm  $NM$ , extensâ verò secundùm  $Mm$ .

Cæterum ista de particularum Fluidi figurâ & Elasticitate hypothesi (quam rursùs ut levem conjecturam haberi precor) nihil contrarium habet experimento, quo aqua incompressibilis evincitur. Nam v. g. globulus elasticus eburneus, icu vel minimo figuram immutans, pressione immensâ comprimi non potest.

## S C O L I U M IV.

19. Si altitudo  $NM$  (Fig. 3) parva non sit respectu radii  $CM$ , tunc supponere non licet eandem esse punctorum  $N$  &  $M$  velocitatem horizontalem. In solo enim casu quo arcus  $Mm$  sensibiliter non differt ab arcu concentrico, radio  $Cn$  descripto, admitti potest vim,

D

quæ in  $M$  æquilibrium facit cum columnis  $nM$ ,  $vm$ , æqualem esse vi quæ in  $n$  cum gravitate æquiponderat. In aliis casibus eadem non est punctorum  $M$  &  $N$  vis acceleratrix, siquidem vires acceleratrices punctorum  $N$  &  $M$ , sunt excessus quovis  $\frac{gz\sqrt{rr-zz}}{rr}$  superat vires cum gravitate æquiponderantes. Proinde eadem esse non debet punctorum istorum velocitas horizontalis.

## S C O L I U M V.

20. (\*) Suspiciabitur forsitan aliquis velocitates horizontales punctorum  $M$  &  $N$ , (Fig. 5) posse saltem esse inter se ut radios  $CM$ ,  $CN$ , eo in casu quo  $GP$  non est parva respectu ipsius  $CP$ . Quod si reverâ esset, puncta  $N$  &  $M$  eandem horizontaliter velocitatem angularem haberent, motusque eorum determinari haud difficulter posset; ut autem suspicio hæc omninò tollatur, demonstrabimus velocitates horizontales punctorum  $N$  &  $M$ , non esse accuratè ad invicem ut radios  $CN$ ,  $CM$ , in eo casu quo  $GP$  est maximè parva respectu ipsius  $CP$ . Unde facilè concludetur eas velocitates in aliis casibus non esse ut radios.

Cùm vis  $NA$ , quatenus secundùm  $CN$  agit, sit  $\frac{gz}{rr}$ ; partes columnæ  $MN$  singulæ sollicitantur vi  $= p - \frac{gz}{rr}$ , & prætereà punctum  $O$  secundùm  $OM$  movetur (art. 17.)

vi =  $\frac{\varphi \left( \frac{r}{3} - \frac{zz}{2r} \right) 6s}{rr} \times \frac{m\mu}{Mm} \times \frac{MO}{MN}$ . Manifestum est ergo, factâ  $MO = x$ , pondus puncti  $O$  versùs  $M$  fore

(not. (a) in art. 12.)  $p - \frac{\varphi zz}{rr} - \frac{\varphi(6s) \left( \frac{r}{3} - \frac{zz}{2r} \right)}{rr} \times \frac{x}{r} \times \frac{m\mu}{Mm}$ .

Unde pondus columnæ  $OM = p x - \frac{\varphi zz x}{rr} - \frac{3\varphi \left( \frac{r}{3} - \frac{zz}{2r} \right) x x . m\mu}{rr . Mm}$ ; & pondus totum columnæ  $IM = p$ .

$IM - \frac{\varphi zz x}{r} - \frac{3\varphi s s . m\mu \left( \frac{r}{3} - \frac{zz}{2r} \right)}{Mm . rr}$ . Unde differentia inter pondus columnarum duarum vicinarum est  $pd(NM) -$

$\frac{2\varphi z dz . s}{rr} + \frac{2\varphi s s . m\mu . z dz}{Mm . r^3}$ . Porrò si puncta  $N$  &  $M$  eandem haberent velocitatem angularem, foret vis acceleratrix ipsius  $M = \frac{\varphi z \sqrt{[rr - zz]}}{rr} \times \frac{CM}{CN} \times \frac{m\mu}{Mm}$ ; & vis quæ cùm

gravitate  $p$  æquilibrium facere debet =  $\frac{\varphi z \sqrt{[rr - zz]}}{rr} \times \frac{r-s}{r} \times$

$\frac{M\mu}{Mm}$ , quæ multiplicata per  $Mm = \frac{r dz - s dz}{\sqrt{[rr - zz]}}$ , debet esse

= differentiæ ponderis duarum columnarum vicinarum  $IM, i\mu$ ; porrò est  $pd(NM) = \frac{\varphi z dz . M\mu}{r . Mm}$ . Quare

deberet esse  $\frac{M\mu}{Mm} \times - \frac{2\varphi z dz}{rr} = \frac{3\varphi s s . m\mu r z dz}{Mm . r^3} - \frac{2\varphi s z dz}{rr}$ .

Quod est impossibile.

D ij

Si præter vim secundùm  $NA$ , ageret etiam alia vis secundùm  $NC$ , proportionalis distantie puncti  $N$  à  $C$ ; quod quidem locum habet, (*Princ. Math. l. 1. Prop. 66.*) ubi vis  $NA$  oritur ex actione corporis cujuscvis è longinquo distantis, & in massam  $DCG$  agentis: eo in casu facilè etiam demonstrabitur eandem non fore velocitatem angularem punctorum  $M$  &  $N$ . Nam cum expressio vis illius quæ agit secundùm  $NC$ , nec contineat  $z$ ; nec  $Mm$ , nec  $M\mu$ , nec  $m\mu$ , facilè intelligitur æquationem quæ in casu præcedente locum habere non potuit, quæquæ (in præfente casu) conservat quantitates  $\frac{M\mu}{Mm} \times \frac{-z\phi + z dx}{rr}$  &  $\frac{z\phi + z \cdot m\mu \cdot z dx}{Mm \cdot rr} - \frac{z\phi + z dx}{rr}$ , locum etiam habere non posse, in hypothefi de quâ nunc agitur.

## S C O L I U M VI.

21. Si vis quam in puncto  $n$  secundùm  $nA$  (Fig. 3) agere supposuimus, ageret secundùm  $nB$  ipsi  $GC$  parallelam, & proportionalis foret sinui anguli  $NCE$ , seu Cofinui anguli  $NCG$ ; tunc, id tantùm in calculis omnibus præcedentibus mutandum foret, ut substitueretur  $-\phi$  pro  $\phi$ , designante  $\phi$  vim secundùm  $CG$  in  $G$ ; siquidem vis quæ puncta  $N$  &  $M$ , in directione horizontali, ad motum sollicitat, tunc erit  $-\frac{\phi z \sqrt{rr - zz}}{rr}$ .

In hoc casu, Ellipseos  $gnd$  major axis erit  $Cg$ , minor verò  $Cd$ ; negativæque fient lineæ  $Gg$ ,  $Dd$ ,  $Mm$ ,  $Nn$ ,  $NI$ , &c. reliquis, ut antea, permanentibus.

## PROPOS. IV. LEMMA.

22. Sit Sphæroidis Elliptica revolutione semi Ellipseos  $gdK$  (Fig. 9) circa minorem suam axem  $gK$  generata: dico,  
 1°. attractionem quam Sphæroidis massa exercet in punctum quodvis  $n$  secundum  $nR$ , fore æqualem attractioni quam in punctum  $S$  exerceret Sphæroidis, Sphæroidi  $gdK$  similis & ejusdem densitatis, cujus axis minor foret  $2CS$ , & centrum  $C$ ; 2°. attractionem quæ idem punctum  $n$  secundum  $nS$  urget, fore æqualem attractioni quam in punctum  $R$  exerceret Sphæroidis, Sphæroidi  $gdK$  similis, & ejusdem densitatis, cujus centrum  $C$ , & axis major  $2CR$ .

Hæc propositio à Clarissimo Mac-Laurin demonstrata est in præclarâ Dissertatione de Fluxu & Refluxu maris.

## COROLL. I.

23. Habebitur ergò attractio in  $n$ , si determinetur quantitas attractionis in  $R$  &  $S$  à supradiçtis Sphæroidibus productæ. At harum attractionum prior, (Cor. 3. Prop. 91. l. 3. Princ. Math.) est ad attractionem in  $d$ , ut  $CR$  ad  $Cd$ , posterior verò est ad attractionem in  $g$ , ut  $CS$  ad  $Cg$ . Ergò huc redit quæstio ut determinentur attractiones in  $g$  & in  $d$ .

## COROLL. II.

24. Quo simplicior fiat calculus, assumemus Ellipsim  $gdK$  à circulo  $gδK$  quam parum differentem. Hoc posito, ut determinetur quantitas attractionis in  $g$ , sit  $Cg$  vel  $Cδ = R$ ,  $\frac{gd}{Cg} = \frac{a}{R}$ ;  $gS = x$ ;  $2n$  ratio circumferentiæ

ad radium,  $\delta$  densitas Sphæroidis, seu ratio massæ ad volumen: notum est attractionem Sphærx in  $g$  esse

$$\frac{4nR^3\delta}{3} \times \frac{1}{R^2} = \frac{4nR\delta}{3};$$

cui quantitati (ut definiatur attractio Sphæroideos, addendus est valor ipsius quantitates

$$\int \frac{2ndx \cdot \delta \cdot x \cdot (2Rx - xx) \cdot a}{(2Rx)^{\frac{1}{2}} \cdot R},$$

quando  $x = 2R$ , hoc est  $\frac{16n\alpha\delta}{15}$ . Ergo attractio in  $S$  secundum  $SC$ , seu in  $n$  secundum  $nR = \frac{CS}{Cg} \times (\frac{4nR\delta}{3} + \frac{16n\alpha\delta}{15})$ .

Quod attinet ad attractionem in  $d$ ; ut hæc inveniantur, observabimus cum Clarissimo *Daniele Bernoulli* sectiones Sphæroidis ad  $Cd$  perpendiculares esse Ellipses generatrici similes, quarum ratio ad circumscriptos circulos sit  $\frac{1}{1 + \frac{a}{R}} = 1 - \frac{a}{R}$  quàm proximè. Quamobrem si fiat  $dR = x$ , attractio in  $d$  erit æqualis attractioni globi Sphæroidi circumscripti, nempe  $\frac{4n\delta}{3} (R + \alpha)$  detracto

valore ipsius  $\int \frac{ndx \cdot \alpha \delta x \cdot (2Rx - xx)}{(2Rx)^{\frac{1}{2}} \cdot R}$ , quando  $x = 2R$ ,

hoc est  $\frac{8n\alpha\delta}{15}$ . Ergo attractio in  $n$  secundum  $nS = \frac{CR}{Cg} \times$

$(\frac{4n\delta R}{3} + \frac{12n\alpha\delta}{15}) =$  quàm proximè  $\frac{CR}{Cg} \times \frac{4n\delta R}{3} - \frac{\alpha}{R} \cdot \frac{CR}{Cg} \times$

$\frac{4n\delta R}{3} + \frac{CR}{Cg} \times \frac{12n\alpha\delta}{15}$ . Quare, existente  $z$  sinu anguli  $gCn$ ,

& sinu toto  $r$ , erit attractio in punctum  $n$  agens perpen-

$$\text{diculariter ad } Cn = \frac{CR \cdot CS \cdot a}{Cg^2 \cdot R} \times \frac{4n\delta R}{3} + \frac{4n\alpha\delta}{15} \times \frac{CS \cdot CR}{Cg^2} =$$

$$\frac{2\sqrt{rr - zz}}{rr} \times \frac{4n\delta R}{3} \times \frac{6a}{5R}.$$

COROLL. III.

25. Attractio igitur Sphæroidis, quæ in punctum  $n$  agit perpendiculariter ad  $Cn$ , est, cæteris paribus, ut differentia  $a$  axium.

SCOLIUM.

26. Si oblongata esset Sphærois, tunc esset  $a$  negativa quantitas, & attractio in  $n$  agens perpendiculariter ad  $Cn$ , versùs partes  $g$  esset directâ.

PROPOS. V. LEMMA.

27. Si per punctum quodvis  $\gamma$  lineolæ  $Gg$  (Fig. 5) describatur curva  $\gamma I\delta$ , talis, ut sit ubique  $Nn : NI :: Gg : G\gamma$ , dico hanc novam curvam  $\gamma I\delta$  fore Ellipsim, cujus axium differentia erit ad  $a$ , ut  $G\gamma$  ad  $Gg$ .

$$\text{Nam siquidem } Cn = Cg + \frac{azz}{rr}, \text{ \& } nI = \frac{Nn \times g\gamma}{Gg} =$$

$$\frac{(Cg + gG - Cn) \times g\gamma}{Gg} = (gG - \frac{azz}{rr}) \times \frac{g\gamma}{Gg} = g\gamma - \frac{azz \cdot g\gamma}{rr \cdot Gg};$$

$$\text{erit } CI - C\gamma = Cg + \frac{azz}{rr} + g\gamma - \frac{azz}{rr} \times \frac{g\gamma}{Gg} - Cg -$$

$$g\gamma = \frac{azz}{rr} \times \frac{G\gamma}{Gg}. \text{ Ergo } C\delta - C\gamma = \frac{a \cdot G\gamma}{Gg}. \text{ Q. E. D.}$$

28. *Iisdem positis ac in Prop. 3. quærat<sup>ur</sup> motus Fluidi GDEP, (Fig. 5) supponendo attractionem mutuam, tum in Fluidi, tum in Globi solidi particulis.*

1°. Attractio quam globus simul cum Fluido exercet in punctum  $n$  perpendiculariter ad  $Cn$ , eadem est quæ foret, si globus solidus esset homogeneus, & ejusdem cum Fluido densitatis  $\delta$ , quia nempe attractio globi perpendicularis ad  $Cn$  nulla est.

2°. Ut inveniatur superficies Fluidi  $gnd$  in æquilibrio stantis, scribenda est in calculis *art. 2.* & sequentium usque ad 11, pro  $\phi$ , quantitas  $\phi + \frac{4n\delta \cdot 6a}{3 \cdot 5}$ ; & si fiat  $CP = \rho$ ; ponaturque  $\frac{4n\Delta\epsilon}{3}$  = attractioni globi solidi secundum  $nC$ , erit  $\phi + \frac{4n\delta \cdot 6a}{3 \cdot 5} = \phi + \frac{6a}{5r} \times p \times \frac{4n\delta r}{4n\delta r - 4n\delta\epsilon + 4n\Delta\epsilon}$ . Ergo (Fig. 3.) linea  $d\omega$  seu  $\alpha =$

$$\frac{r}{2} \times \left( \frac{\phi}{p} + \frac{4n\delta \cdot 6a}{5(4n\delta r - 4n\delta\epsilon + 4n\Delta\epsilon)} \right) =$$

$$\frac{\phi r}{2p} : \left( 1 - \frac{3n\delta r}{5(n\delta r - n\delta\epsilon + n\Delta\epsilon)} \right).$$

3°. Habebitur proinde motus Fluidi, si in calculis *articulorum 12, 13 &c.* ponatur pro  $\phi$  quantitas  $\phi :$

$\left( 1 - \frac{3n\delta r}{5(n\delta r - n\delta\epsilon + n\Delta\epsilon)} \right)$  quæ, quoniam est  $r$  ferè =  $\rho$

reducetur ad  $\frac{\phi}{1 - \frac{3\delta}{5\Delta}}$ .

Nam

Nam cùm sit complementum anguli in  $I$  seu  $i$ , ad complementum anguli in  $n$ , ut  $G\gamma$  ad  $Gg$ , seu ut  $M\mu$  ad  $Mm$ ; & vis quæ in  $n$  cum gravitate  $p$  æquilibrium facit, sit  $\frac{\phi z \sqrt{rr - zz}}{rr \left(1 - \frac{3\delta}{5\Delta}\right)}$ ; oportet ut vis quæ in  $i$  cum gra-

vitare æquilibrium facit, sit æqualis ipsi  $\frac{\phi z \sqrt{rr - zz}}{rr \left(1 - \frac{3\delta}{5\Delta}\right)} \times$

$\frac{G\gamma}{Gg}$ . Atqui reipsâ hæc vis hunc habet valorem. Etenim

vis quæ agit in punctum  $n$  perpendiculariter ad  $Cn$ , composita est ex attractione perpendiculari ad  $Cn$ , & vi  $\frac{\phi z \sqrt{rr - zz}}{rr}$ , harumque virium summa est  $\frac{\phi z \sqrt{rr - zz}}{rr \left(1 - \frac{3\delta}{5\Delta}\right)}$ ;

porrò attractio in  $n$  est ad attractionem in  $I$  seu  $i$  (*art.* 25) ut  $Cd - Cg$  ad  $Cd - Cg$ , seu (*art.* 27) ut  $Gg$  ad  $G\gamma$ ;

vis verò  $\frac{\phi z \sqrt{rr - zz}}{rr}$  in  $n$  est ad vim respondentem in

$I$  seu  $i$ , ut  $Gg$  ad  $G\gamma$ . Ergo attractionis in  $I$ , & vis

illius quæ vi  $\frac{\phi z \sqrt{rr - zz}}{rr}$  respondet, summa est

$$\frac{\phi z \sqrt{rr - zz}}{rr \left(1 - \frac{3\delta}{5\Delta}\right)} \times \frac{G\gamma}{Gg}. \quad Q. E. D.$$

## C O R O L L. I.

29. Hinc, quæcumque in *art.* 2, 3 &c. usque ad 22 demonstrata sunt, huic casui possunt applicari, in quo

E

Fluidi partes se invicem attrahere ponuntur, scriptâ tan-

tum  $\frac{\varphi}{1 - \frac{3d}{5\Delta}}$  præ  $\varphi$ .

SCOLIUM GENERALE.

30. Si superficies  $PME$ ,  $GND$ , circulares non sint, sed tantum proximæ circulo; iidem pro inveniendis Fluidi motu fieri debent calculi ac antea, modo superficies  $GND$  talis sit, ut, abstrahendo ab actione vis  $\varphi$ , sit in æquilibrio; lineæ nempe  $NI$ ,  $Nn$ ,  $Gg$ ,  $G\gamma$ ,  $Mm$ ,  $M\mu$ , eadem semper remanebunt; sola angulorum in  $n$  &  $i$  complementa minuuntur aut augebuntur complemento anguli  $GNC$ ; at simul vires quæ in  $i$  &  $n$  cum gravitate æquiponderare debent, in quâlibet hypothesi, minuuntur aut augebuntur vi quæ in  $N$  agit normaliter ad  $CN$ , quæque, posito superficiei  $GND$  æquilibrio, anguli  $GNC$  complemento proportionalis esse debet. Quæ quidem observatio locum habet, tum in systemate gravitatis versus unum centrum, tum in systemate Attractionis partium materiæ. Etsi hæc demonstratione indigere non videantur, tamen ex principiis infra ponendis dilucidissime probari poterunt (*Vid. art. 62*).

COROLL. II.

31. (\*) Siquidem differentia axium, in Attractionis hypothesi, est  $\frac{\varphi r}{2p(1 - \frac{3d}{5\Delta})}$ ; evidens est differentiam il-

Iam posse respectu ipsius  $r$  esse satis magnam, nempe si non sit  $\frac{\phi}{2p(1 - \frac{3\delta}{5\Delta})}$  admodum parva quantitas; imò

differentiam illam fieri infinitam eo in casu in quo est  $3\delta = 5\Delta$ ; sed notandum, iis in casibus in quibus  $\alpha$  respectu  $r$  non est parva, non valere calculos *art. 24* & sequentium, in quibus  $\alpha$  supponitur admodum parva respectu ipsius  $r$ .

Præterea, si sit  $1 - \frac{3\delta}{5\Delta}$  negativa quantitas, tunc differentia axium negativa evadit, hoc est, Sphærois sit oblongata circà axem  $CP$ , & valent laudatorum articulorum calculi, modò parùm oblongata sit Sphærois.

Atque hinc (quod obiter tantùm monebo) facilè intelligitur quomodò fieri potuisset, ut terra fuisset oblonga ex rotatione circa suum axem, si primùm Sphærica fuisset, & composita ex duabus partibus Sphæricis, una solidâ & alterâ Fluidâ, quarum densitates  $\Delta$  &  $\delta$  fuissent inter se in minori ratione quàm 3 ad 5.

Id quidem satis paradoxum videri potest, quod talis esse queat densitas Fluidi  $GPEd$ , ut à viribus secundùm  $NA$  agentibus Fluidum in  $D$  subsidere cogatur, in  $G$  verò extollatur. Sed meditati facilè apparebit multos esse casus in quibus Sphæroidis axis major non possit esse  $Cd$ . Nam cum sit necessariò  $\alpha = \frac{r}{2} \times (\frac{\phi}{p} + \frac{4n\delta \cdot 6a}{5(4n\delta r - 4n\delta \epsilon + 4n\Delta \epsilon)})$ . seu  $\alpha = \frac{\phi r}{2p} + \frac{3a\delta}{5\Delta}$ , ma-

E ij

nifestum est quantitatem  $a$  positivam esse non posse, si habeatur  $\frac{3\delta}{5\Delta} > a$ , seu  $3\delta > 5\Delta$ .

Quare talis esse potest ratio densitatum  $\delta$  &  $\Delta$ , 1°. ut Fluidum, etiam vi quàm minimâ secundùm  $NA$  agente, extollatur quàm plurimùm in  $D$ ; 2°. ut in eodem puncto  $D$  quàm plurimùm deprimatur.

Si nucleus interior, quem huc usque Sphæricum posuimus, esset Sphærois Elliptica cujus semiaxium differentia =  $a'$ , positâ semper altitudine Fluidi maxime parvâ respectu radii  $r$ , esset attractio horizontalis puncti cujusvis  $n$  Fluidi =  $\frac{2\sqrt{rr-zz}}{rr} \times [\frac{4n\delta}{3} \cdot \frac{6a}{5} + \frac{4n\Delta - 4n\delta}{3} \times \frac{6a'}{5}]$ ;

Unde invenietur

$$a = \frac{r}{2} \times \left[ \frac{\phi}{p} + \frac{4n\delta \cdot 6a + (4n\Delta - 4n\delta) \cdot 6a'}{5 \cdot 4n\Delta r} \right] = \frac{\frac{\phi r}{2p} + \frac{3a'}{5} \left( \frac{\Delta - \delta}{\Delta} \right)}{1 - \frac{3\delta}{5\Delta}}$$

quare etiam si compressus sit nucleus interior, poterit esse Sphærois oblonga, si  $1 < \frac{3\delta}{5\Delta}$ , &  $\phi + \frac{6p a' \cdot (\Delta - \delta)}{5\Delta r}$  positiva sit quantitas: generatim sive nucleus interior sit compressus, sive oblongatus, hoc est, sive sit  $a'$  positiva quantitas, sive negativa, erit Sphærois Fluida interior compressa aut oblongata, prout fractionis præcedentis termini ambo erunt ejusdem signi aut diverforum signorum.

Ergò si terra esset Sphærois oblonga, necessarium non foret recurrere cum nonnullis Authoribus ad nucleum

interiorem oblongatum ; posset enim esse nucleus iste interior compressus, & nihilominus terra esse versus polos oblongata.

## C O R O L L. III.

32. (\*) Ex præcedenti articulo sequitur, datâ, v. g. elevatione aquarum maris ex vi unicâ Solis aut Lunæ, aut ex vi Solis & Lunæ conjunctim, datâque harum virium unaquâque, aut etiam ambarum summâ, posse semper determinari relationem inter  $\delta$  &  $\Delta$  quâ fiat, ut aquæ maris datam elevationem consequi possint ; quæ quidem ratio inter  $\Delta$  &  $\delta$  aliunde cognosci non posse videtur. Inde concludetur quænam foret gravitas orta ex attractione globi solidi, qui ejusdem densitatis foret ac aqua maris.

Newtonus, quærendo elevationem aquarum maris ex unicâ vi Solis oriundam, invenit eam duorum circiter pedum, supponendo globum terraqueum esse omninò Fluidum: sed altitudinem istam multò majorem invenisset, si profunditatem maris respectu terræ quàm minimam assumpsisset, v. g.  $\frac{1}{4}$  mill. simulque supposuisset, densitatem partium solidarum esse à densitate aquæ diversam. Quare, ut altitudo aquæ maris ex Solis ac Lunæ vi oriunda, observationibus respondeat, necesse non videtur confugere ad hanc hypothesim, quod terra componatur ex infinitis numero Fluidis diversæ densitatis, sibi invicem incumbentibus (de quâ hypothesi mentionem in art. 36 paulò ampliorem faciemus): sufficit ut admit-

E iij.

tatur partes terræ solidas eandem cum aquâ maris densitatem non habere.

## COROLLARIUM GENERALE.

33. Ex his quæ hæcenus demonstrata sunt, facilitè deduci potest venti velocitas & directio, in quocumque terræ loco, supponendo 1°. Aërem esse Fluidum homogeneum, rarum nec Elasticum; 2°. Terram quam undique circumfluit, esse globum solidum, seu parùm à globo differentem; 3°. Terram cum ambiente aëre, circum axem suum gyrationem. 4°. Solem & Lunam nullum respectu centri Terræ motum habere, & in aëris molem attrahendo agere.

Advertetur primùm, cum aër maximè rarus supponatur, nullum ex attractione particularum aëris sensibilem effectum nasci debere, siquidem vis  $\frac{\phi}{1 - \frac{3\delta}{5\Delta}}$  debet

cenferi æqualis ipsi  $\phi$ , quando  $\delta$  est quàm minima respectu  $\Delta$ .

Jam verò, ut determinetur primò ventus, ex solâ terræ rotatione ortus, facilitè patet ventum illum alternatim à Noto versùs Austrum, & ab Austro versùs Notum flare, tempusque, quo unam peragit oscillationem, à solâ aëris altitudine pendere (*art. 13.*).

Ut leve calculi specimen offeramus, supponatur altitudo aëris, (in præsentè homogeneitatis hypothèsi) = 850 x 32 <sup>ped.</sup> siquidem aër Terræ propior 850 circiter

vicibus rarior est quam aqua, & aëris columnæ totali æquipollent aquæ 32 pedes; erit ergo (art. 13) tempus

per  $Mm = \frac{nr}{4\sqrt{[341]}} = 1^{\text{sec.}} \times \frac{180.57060.6}{4\sqrt{[3.15.850.32]}}$ ; quia

scilicet ponendo  $\theta = 1^{\text{sec.}}$  est  $a = 15^{\text{ped.}}$ ,  $nr = 180^{\circ}$  grad.

terrest. = 180.57060.6: porro  $1^{\text{sec.}} \times \frac{180.57060.6}{4\sqrt{[3.15.850.32]}}$

= 1 diei  $\times \frac{61624800}{4 \times 302276571} \times (3 + \frac{1}{6})$  circiter.

Jam, si abstrahendo à motu Terræ, & à vi Lunæ, queratur ventus oriundus ex vi Solis perpendiculariter & immobiliter stantis in quemvis Terræ locum  $D$ ; evidens est ventum in quovis loco fieri semper debere in plano circuli per Solem & centrum Terræ transeuntis, & alternatim in partes contrarias excurrere, tempore =

$2^{\text{dieb.}} \times \frac{61624800}{4 \times 302276571} \times (3 + \frac{1}{6})$ .

Nunc verò, si componentur inter se motus aëris orti ex rotatione Terræ circà suum axem, ex vi Solis, & ex vi Lunæ; habebitur in quovis loco directio, & velocitas venti pro instanti quovis. Nam siquidem figura aëris parùm mutatur ex actione uniuscujusque harum virium separatim agentium, sequitur eundem quàm proximè aëris motum esse debere, ex his tribus causis simul agentibus oriundum, qui ex separatis motibus componeretur. Jam verò notandum est,

1°. Si Solis & Lunæ actio, cum rotatione Terræ circà suum axem incipere supponatur, directionem venti sem-

per fore in datâ lineâ rectâ , & alternatim fore in oppositos sensus tempore jam definito ; contrâ verò , si hæc tres causæ eodem momento agere non incipiant , directionem venti perpetuò variari.

2°. Tempus oscillationum venti ab his causis non pendere , licet ab iisdem causis pendeat vis venti absoluta.

## S C O L I U M I.

34. Silentio prætermittendum non est , methodum præcedentem satis accuratam fortassis non esse in determinando vento qui ex Terræ rotatione oriri potest ; siquidem , ut nimis à vero non aberret hæc methodus , debet esse ( art. 10 )  $\frac{\phi r}{c + p}$  quantitas satis parva : porrò cùm sit  $\phi = \frac{p}{289}$  ;  $t = 850 \times 32$  <sup>Prod.</sup> ;  $r = 19695539$  ; erit

$\frac{\phi r}{c + p} = \frac{19695539}{0.289 \cdot 850 \cdot 32} = \frac{19695539}{47164800}$  ; quæ quantitas forsan satis parva non est , ut solutio pro satis accuratâ habeatur.

Quod autem attinet ad ventum ex vi Solis oriundum , locum non habet eadem difficultas. Nam vis  $\phi$  , ut patet ex Principiis Mathematicis Philosophiæ naturalis , est  $\frac{3S}{d^2}$  , (a) existente  $S$  massa Solis , &  $d$  ejus distantia

---

(a) Hic & in sequentibus omninò negligitur ea vis orta ex actione astri , quæ agit secundùm  $NC$  , quæque ( *Princ. Math. l. 1. Prop. 66.* ) = quàm proximè  $\frac{S \cdot NC}{d^3}$  ; quia nempe hæc vis respectu gravitatis  $p$  nulla censeri debet , existente  $NC$  ferè æquali radio  $CP$ .

à Terræ centro. At cùm vires centrales seu centrifugæ sint inter se in ratione compositâ ex radiis directè, & quadratis temporum periodicorum inversè, erit  $\frac{S}{d^2} : \frac{P}{289} ::$

$$\frac{d}{(365)^2} : \frac{r}{1} ; \text{ unde } \frac{15r}{d^2} = \frac{3p}{289 \cdot (365)^2} ; \text{ proinde } \frac{\phi r}{61p} =$$

$$\frac{19695539}{2 \cdot 289 \cdot (365)^2 \cdot 850 \cdot 32} ; \text{ quæ quantitas valdè exigua est. Quod}$$

attinet ad Lunam, ejus vis, juxta Newtonum, vis Solaris circiter quadrupla est; unde, pro Lunâ, est etiam

$$\frac{\phi r}{61p} \text{ fatis parva quantitas.}$$

S C O L I U M II.

35. Advertendum maximè, in hypothefi actionis Solaris, differentiam inter pondus duarum aëris columnarum à se invicem 90 gradibus distantium, esse  $\frac{35r^2 \cdot d}{2d^2}$ , positâ  $d$  prò densitate aëris Terræ vicini; proinde hæc differentia

$$= \frac{3p \cdot (19695539) \times d}{2 \cdot 289 \cdot (365)^2} ; \text{ at cùm sit densitas Mercurii}$$

ad densitatem Aëris, circum circa, ut  $850 \times 14$  ad 1, quantitas ista est ad pondus 27 pollicum Mercurii, ut

$$\frac{19695539 \times 3}{2 \cdot 289 \cdot (365)^2} : \frac{27}{12} \times 850 \times 14. \text{ Ergo quæsitâ differentia}$$

æqualis est ponderi unius Mercurii pollicis, multiplicato per

$$\frac{16 \times 19695539}{2 \cdot 289 \cdot (365)^2 \cdot 850 \times 14}, \text{ hoc est, æqualis ponderi}$$

F

$\frac{702039404}{6878200 \times 125585}$  partium pollicis Mercurii, quæ quidem quantitas observatione percipi non potest. Notandum præterea differentiam inter pondus duarum columnarum à se invicem 90 gradibus distantium, semper esse æqualem huic quantitati  $\frac{35r^2d}{2d^3}$ , sive aër homogeneous sit, sive ex partibus diversæ densitatis compositus, & altitudinis cujuscumque. Quare generatim affirmare possumus, mirum non esse, si actio Solis & Lunæ nullum in Barometro sensibilem effectum edant.

## S C O L I U M III.

36. Clarissimus *Daniel Bernoulli* in eximio Tractatu de Fluxu & Refluxu maris, longè aliam affert rationem cur actio Solis & Lunæ, nullum in Barometro sensibilem effectum producat. Juxtà illustris hujus Geometræ calculum, actio unica Solis, differentiam viginti lineis majorem, in Barometri altitudine producere deberet, si aër non esset Fluidum Elasticum: sed cum aër sit Elasticus, pressio ejus, juxtà celeberrimum Authorem, in omnibus Terræ locis eadem esse debet; quare altitudo Mercurii in Barometro, ab actione Solis & Lunæ, sensibiliter mutari non potest.

At 1º. Dubitari forsàn posset, utrùm ab Elasticitate aëris necessariò sequatur pressio æqualis in omnes Terræ partes. Ut enim Fluidum Elasticum, cujus partes, exempli causâ, secundùm *NA* (Fig. 3) trahuntur, in æquilibrio

subsistat, sufficere videtur, ut pressio in  $M$ , v. g. sit æqualis Elasticitati ejus Fluidi particulæ quæ est in  $M$ ; quemadmodum in aëre, cujus partes sibi mutuò incumbunt, sufficit, ut reactio superficiæ cujusvis ab Elasticitate orta, æqualis sit ponderi incumbenti, nec necesse est ut pressio ad quamlibet altitudinem eadem sit. 2°. Etiam si concederetur æqualitas pressionis ab Elastrol aëris orta, saltem dubitari posse videtur, utrùm in aëre cujus partes à vi Solis continuò diversè agitantur, pressio ista in omnem Terræ superficiem unico momento ita diffundi possit, ut fiat ubique eadem. Quare si clarissimi Geometræ calculos sequamur, non impossibile videtur, ut Barometrum, per diem unamquamque, sensibilem patiatur variationem.

Sed si aliâ hypothesi nixi fuissent hi calculi, forsan ad Elasticitatem aëris opus non fuisset confugere. Quod ut plenius intelligatur, liceat celeberrimi Geometræ analysim hîc accuratiùs perpendere.

Clarissimus *Daniel Bernoulli*, eâdem quam fecimus, nititur hypothesi: supponit nempe (*ch. 4. art. II. n. 14*) Terram esse globum solidum ex infinitis superficiebus solidis & Sphæricis compositum, quarum unaquæque sit homogenea, sed densitate ab aliis differat; terrestremque globum esse coopertum Fluido homogeneo, cujus altitudo respectu radii Terræ sit quàm minima; assumit ergò nucleum Sphæricum  $GbH$  (Fig. 10) immutabilem, solam verò partem Fluidam  $GBHbG$  ab actione solis mutari: solutionem Problematis inde deducit, quòd

Fluidum in canalibus  $GC$ ,  $BC$ , contentum, in æquilibrio esse debeat : factis igitur  $AC = a$ ,  $CG = b$ ,  $Bb = \mathcal{E}$ ,  $Cp$  seu  $Cn = x$  ;  $po$  seu  $nm = dx$ , densitate variabili in  $o$  aut in  $m = m$ , densitate uniformi Fluidi  $GBHbG = \mu$  ; gravitate in  $C$  versùs corpus  $A = g$ , vi acceleratrici quam globus exercet in  $G$  aut  $b$ ,  $= G$ , vi eâdem pro punctis  $o$  &  $m = Q$  ; invenit pondus columnæ  $BC = \mu \mathcal{E} G + \int Q m dx - \frac{\int 2 g m x dx}{a} - \frac{\int 2 n \mu \zeta m x dx}{15 b}$  ;

pondus verò columnæ  $GC = \int Q m dx + \frac{\int g m x dx}{a} + \frac{\int 4 n \mu \zeta m x dx}{15 b}$ . Unde eruitur.

$$\mathcal{E} = \frac{\int 15 g b m x dx}{5 \mu G a b - \int 4 n \mu \zeta m x dx}.$$

Hinc sequeretur quantitatem  $\mathcal{E}$ , cæteris paribus ; esse in ratione inversâ densitatis  $\mu$  Fluidi  $GBHbG$  ; quod quidem Analyti nostræ non parùm adverfatur.

Id ut pateat , supponamus nullam rationem haberi Attractionis partium globi ; hâc in hypothefi quantitates  $-\frac{\int 2 n \mu \zeta m x dx}{15 b}$  &  $\frac{\int 4 n \mu \zeta m x dx}{15 b}$  in calculis præcedentibus evanescunt, eritque, positâ gravitate in ratione inversâ quadrati distantiarum,

$$\mathcal{E} = \frac{15 g m x dx}{\mu G a}.$$

Unde videtur, quòd si Attractionis nulla habeatur ratio ; quantitas  $\mathcal{E}$ , juxtâ celebrer, *Dan. Bernoulli* calculum, ra-

tionem etiam sequatur inverſam denſitatis  $\mu$ . Juxtà autem Analyſim noſtram in *art.* 2. expoſitam, differentia axium  $\frac{\varphi r}{2p}$  non pendet à denſitate Fluidi  $GBHbG$ . Undenam oriri poteſt diſcrimen illud? Hujus, ni fallor, dari poteſt cauſa ſequens.

Suppoſuit Clariſſimus *Bernoulli* partem globi  $GbH$  ut ſolidam conſiderari: at, hoc poſito, æquilibrium videtur inſtitui non debere inter canales totales  $CG, BG$ , quorum quidem partes  $CG, bG$ , eò quòd ſolidæ ſint, inter ſe æquipollere cenſendæ ſunt, ſive idem præciſè pondus habeant, ſive non; æquilibrium reverà eſſe debet in ſolâ parte Fluidâ homogeneâ  $GBHb$ ; ab hâc enim tantùm figura globi mutari poteſt. Porro, ſi Attractionis nulla ratio habeatur, invenietur (ut in *art.* 2.)  $B\zeta =$

$\frac{\varphi r}{2p}$ ; ſi verò Attractionis habeatur ratio, differentia axium erit  $\frac{\varphi r}{2p(1 - \frac{3\delta}{5\Delta})}$  quæ non ſequitur rationem inverſam

ipſius  $\delta$ , ſed potius eò major eſt quò major eſt  $\delta$ , ſi  $1 > \frac{3\delta}{5\Delta}$ ; eò verò minor, ſed negativè ſupra, quò major eſt  $\delta$ , ſi  $3\delta > 5\Delta$ .

Jam verò ſi pars  $GbH$  Fluida ſupponatur, tunc aſſumi non poſſunt ſuperficies  $mo, pn$ , circulares & concentricæ; omnes enim ſuperficies diverſæ denſitatis ex quibus globus ſolidus componitur, ſuant mutant figuram; proinde differentia axium non erit  $Bb$ , ſiquidem erit  $Cb$  major quàm  $CG$ .

Dico autem 1°. si Attraçionis nulla ratio habeatur, hanc differentiam eandem esse ac si globus esset compositus ex Fluido homogeneo, densitatis cujuslibet: etenim sit  $GB$  (Fig. 11) curva quam Fluidum induere debet in hypothesi homogeneitatis totalis, sintque  $PO$ ,  $NM$ ,  $nm$ , curvæ ad quas pressio Fluidi sit perpendicularis; evidens est fore  $Nn$  in æquilibrio cum  $Mm$ ; unde auctâ. vel imminutâ densitate Fluidi in spatio  $NMmn$  contenti, non turbabitur æquilibrium: quod cum dici possit de Fluido in aliis spatiis contento, sequitur Fluidum  $GBG$  eandem constanter figuram fervare debere, sive homogeneum sit, sive non, modò Attraçionis ratio non habeatur.

Ergo differentia axium  $\mathcal{E}$  non debet pendere à lege densitatis variarum globi partium, saltem si ab Attraçione abstrahatur. Tamen juxtâ formulam

$$\mathcal{E} = \frac{3fgmx dx}{\mu G a}$$

quam ex Cl. *Bernoulli* formulâ eruimus, pendet  $\mathcal{E}$  à densitate variabili  $\mu$ . Videtur ergò de Cl. *Bernoulli* formulâ dubitatio aliqua institui posse, sive globus supponatur totus Fluidus, sive partim Fluidus, partim solidus.

Necessarium autem non videtur inquirere, quænam esset globi figura, si supponeretur totus Fluidus, & ex superficiebus diversæ densitatis compositus, ac præterea haberetur ratio Attraçionis partium. Hoc quidem in inquirendâ terræ figurâ utile esse potest, quia nempè supponi licet Terram, quæ nunc ex partibus, tum Fluidis

tum solidis diversæ densitatis constat, primâ in origine constatam fuisse totam ex Fluidis diversæ densitatis sibi invicem incumbentibus, quæ quidem post indutam figuram quam postulabant hydrostaticæ leges, magna ex parte indurata sunt. Sed in eâ, quam nunc tractamus, materiâ, nempe in inquisitionibus circâ æstus aut ventorum causam, supponi debet terra quàm proximè in eo, in quo reverâ est, statu, hoc est, magnâ ex parte solida, coopertaque 1°. massâ Fluidâ homogencâ, & attractivâ, nempe aquâ maris. 2°. Fluido heterogeneo maxime raro, cujus Attractionis, utpote insensibilis, nulla ratio habeatur.

Ut autem hoc in casu inveniatur Fluidi mixti figura, definiatur primùm per *art.* 28. figura, quam aqua induere debet, quæ quidem ob insensibilem aëris Attractionem, eadem ferè censenda est, ac si nullus superincumberet aër. Hoc posito, patet superficiem maris & superficiem superiorem aëris ad libellam componi debere: quare columna verticalis aëris inter hæc duas superficies contenta, ubique ejusdem ponderis esse debet, atque adèd ejusdem ubique magnitudinis. Unde facilè determinatur cujuslibet aëris superficiem figura.

#### S C O L I U M IV.

37. Cæterum, notandum est, ventum in superioribus *articulis* 33 & 34. determinatum, flare debere in eâ tantum hypothesi, quòd aëris massa figuram Sphæricam primùm habuerit, quòd perfecta sit partium Flui-

ditas, quòd denique Luna & Sol, immoti Terræ globo imminçant. Facile autem est conjectari, aut massam aëris ab initio eam figuram fuisse habituram, quæ, tribus causis suprâ dictis simul agentibus, in æquilibrio stare posset, aut saltem, si primùm Sphærica fuerit, propter partium frictionem & tenacitatem, ad æquilibrii statum brevi perventuram fuisse; quemadmodùm accidit aquæ in Syphone oscillanti.

Quapropter, quæ jam dicta sunt, ad id præcipuè utilia haberi debent, ut ad sequentia Lectorem disponant, quippe quæ plurima ad Theoriam modò exponendam necessaria principia contineant.

Ideò in sequentibus, in quibus Solem & Lunam respectu Terræ moveri supponemus, abstrahemus omninò à vento oriundo ex motu Terræ circà suum axem, qui ventus, jam pluribus abhinc sæculis desinere debuit, si unquam extitit, & præterea, non idem præcisè futurus fuisset qui suprâ determinatus est, propter heterogeneitatem partium aëris, quem, in venti determinatione, huc usque homogeneous posuimus.

Sphæroidica autem Athmosphæræ figura, ex illâ rotatione oriunda, nullam sensibilem producet mutationem in directione & velocitate venti, qui, positâ terrâ Sphæricâ, ex Solis & Lunæ motu post hac determinabitur.

Supponemus in sequentibus 1<sup>o</sup>. quiescere globum terrestrem, motumque omnem in Solem ac Lunam transferri; inde enim nulla in aëris motu differentia exurgere debet, nisi forsân ob vim centrifugam quæ ex motu  
Terræ

Terræ diurno aut annuo potest oriri. At vis centrifuga quæ ex motu annuo oritur, cùm eadem sit in omnibus globi partibus, nullum in aëre motum excitare debet, qui ipsi cun̄ toto globo non sit communis; vis autem centrifuga ex motu diurno nascens, id tantùm efficit, ut aër paululùm Sphæroidicus sit, nec inde sensibile oritur in aëris motu discrimen.

2°. Ab Elasticitate aëris omninò abstrahemus, saltem quantùm efficere potest, ut columnæ omnes verticales ejusdem non sint densitatis; patet enim vim quæ horizontaliter premit particulas columnæ sub astro stantis, maximam non esse respectu vis  $\frac{3sr^2d}{2di}$ , quæ particulas istius columnæ in casu æquilibrii premit, quæque (art. 35) ferè insensibilis est, proindè respectu ponderis totius aëris esse quàm minimam, atque adeò particulas istius columnæ densitate suâ quàm parùm differre debere à densitate partium columnæ quæ ab hâc 90 grad. distat.

3°. Supponemus astrum unicum circà Terram moveri; siquidem definitis separatim motibus aëris, qui ex actione unius aëris nascuntur, facilè per compositionem motuum definitur motus ex astrorum quotlibet actione oriendus.

4°. Tandem supponemus semper  $r = 1$ , & posito  $z$  pro sinu anguli cujusvis  $u$ , esse  $z = \frac{e^{u\sqrt{-1}} - e^{-u\sqrt{-1}}}{2\sqrt{-1}}$

&  $\sqrt{[1-zz]} = \frac{e^{u\sqrt{-1}} + e^{-u\sqrt{-1}}}{2}$ ; quod Geometris

G

notum est. Unde factò arcu  $PM$  (Fig. 3) =  $n$ , crit vis

$$\frac{3S\pi V [rr - \pi\pi]}{r^2 d^2} = \frac{3S}{d^2} \times \left( \frac{e^{2nV-1} - e^{-2nV-1}}{4V-1} \right).$$

## S C O L I U M V.

38. Una ex præcipuis difficultatibus, quæ in inquirendo aëris motu occurrunt, in eo consistit, quòd, strictè loquendo, particula aëris quælibet eodem modo non moveatur ac si esset libera, & in calculo tanquam punctum unicum haberetur. Nam cùm particulæ aëris, v. g. Æquatorem circumdantes, sint sibi mutuò contiguæ; si partes illæ eadem vi sollicitatrice urgerentur, motus omnium ac velocitas eadem forent versùs eandem partem. Proinde eadem foret velocitas particulæ cujuscunque, ac si particula ista consideraretur ut punctum unicum & liberum. Sed partes aëris à viribus diversis agitantur pro variâ earum ab Astro distantia; unde si considerentur partes illæ ut puncta libera, & quæratu cujusque puncti motus à vi acceleratrice oriundus; velocitas diversâ invenietur pro unoquoque puncto: proinde, ut unaquæque aëris particula eandem velocitatem reverâ habeat, ac in eo casu in quo punctum unicum foret, simulque non desinant Fluidi partes esse sibi mutuò contiguæ, debet evenire necessariò, vel ut Fluidum subsidat iis in locis ubi est maxima velocitas, extollatur verò in iis ubi minima; vel ut Fluidum quatenùs est compressionis capax, iis in locis comprimatur ubi minima est velocitas, dilatetur verò in iis ubi maxima. At (*ex hyp.*) vis quæ in

aërem horizontaliter agit, tota ad motum particularum aëris impenditur; quare Fluidum non potest in 1°. casu hîc subsidere, hîc deprimi, in 2°. casu hîc dilatari, hîc comprimi, quin columnarum verticalium vis sit inæqualis; unde novus necessariò oriatur motus in particulis aëris, quo motus earum horizontalis turbabitur ac mutabitur.

Si tamen supponatur (quod absolutè licet) Fluidum partim subsidere ac deprimi, partim dilatari ac comprimi, ita ut differentia inter pondus columnarum duarum vicinarum  $nM$ ,  $vm$ , (Fig. 5) æqualis sit actioni quâ particula Fluidi  $Mm$ , intrâ has columnas contenta, ob Elasticitatem se expandere conatur; tunc, & in eo unico casu, motus particulæ cujusque idem erit, ac si ambientium particularum nulla haberetur ratio.

Præterea, abstrahendo ab omni Elasticitate, notandum est, quòd, etiamsi omnes columnæ verticales ejusdem non forent ponderis, tamen absolutè fieri posset, ut pro tenacitate & adhærentiâ partium, motus inde nullus in aëre oriretur, præsertim si aëris altitudo parva foret, quia, si minima sit aëris densitas, minimus quoque erit excessus ponderis columnarum, proinde minima vis motrix.

Liceat ergò nobis eam primùm velocitatem requirere quam haberet aër, si hujus quævis particula ut punctum unicum consideraretur. Quod quidem Problema eò libentius hîc solutum dabo, quòd faciliorem ad sequentia quàm plurima viam sternat.

## PROPOS. VII. PROBLEMA.

39. *Quæritur quinam esse debeat aëris motus, supponendo, 1°. Solem circa Terram moveri & in aërem agere. 2°. aërem esse Fluidum profunditatis quàm minima, quo Terra ambiatur, & cujus partes ab actione Solis totum accipiant motum, quem habere possunt.*

*Solutio.* 1°. Si punctum  $A$  (Fig. 12) cujus quæritur motus, est in Æquatore  $QAR$ , & Astrum Æquatorem describat motu uniformi, Astrumque in  $P$  existens percurrat  $Pp$ , dum  $A$  percurrit  $AB$ ; fiat  $AP = u$ ;  $Pp = da$ ;  $AB = qda$ . Jam verò cum  $AB$  sit maximè parva respectu ipsius  $Pp$ , ob admodum parvam Solis actionem, evidens est posse assumi  $Pp = du$ , & differentiam ipsius  $qda$  fore quàm proximè  $dqu$ . Præterea si tempus per  $Pp$  &  $AB$  sit  $dt$ , &  $\theta$  sit ut in *art.* 13. tempus quo grave corpus quodvis percurrat lineam  $a$ , ex actione gravitatis  $p$ ; erit ( $a$ ) juxtà notum Mechanicæ Principium  $dqda = \frac{\pi dt^2 \cdot 2a}{p^2}$  ( existente  $\pi$  vi acceleratrice in  $A$ ). At

( $a$ ) Æquatio  $dqda = \frac{\pi \cdot 2a dt^2}{p^2}$ , eo nititur fundamento, quòd vires acceleratrices uniformiter agentes, sint inter se in ratione composità ex spatii directè, & quadratis temporum inversè. Dubitari tamen posset utràm  $a$  scribi non debeat in hâc æquatione loco ipsius  $2a$ , si quidem est  $a$  ex hypothesi, spatium, agente gravitate  $p$ , tempore  $t$  percursum. Sed notandum est ipsius infinitefimi spatii  $AB$  differentiam secundam juxtà Analyseos methodum sumptam, reverà duplam esse sui valoris; unde per 2 dividi debet, ut

quoniam hîc est  $\pi = \frac{3S}{di} \times \left( \frac{e^{2uv-1} - e^{-2uv-1}}{4v-1} \right)$   
 (art. 37. n. 4), & supponi licet Solem tempore  $\theta$  per-  
 currere spatium  $b$  in Æquatore motu suo uniformi, un-  
 de  $b : Pp :: \theta . dt$ ; æquatio præcedens mutabitur in  
 $dq = \frac{3S \cdot 2a \, du}{p \, b^2 \cdot di} \times \left( \frac{e^{2uv-1} - e^{-2uv-1}}{4v-1} \right)$ : proinde  $q =$   
 $\left( \frac{3S z^2}{2 di} \pm \frac{3S m^2}{2 di} \right) \times \frac{2a}{p \, b^2}$ , existente  $z$  sinu ipsius  $u$ , &  $m$  constan-  
 te quâvis.

Unde si  $m \text{ fit} = 0$ , aut talis, ut  $\pm mm + zz$  fit sem-  
 per positiva quantitas, movebitur perpetuò aër sub Æqua-  
 tore ab Ortum in Occasum. Ut autem  $zz \pm mm$  fit po-  
 sitiva quantitas, signum  $\pm$  debet semper præfigi ipsi  $mm$ ;  
 si  $mm$  haberet signum  $-$  & foret  $mm > 1$ , tunc ven-  
 tus sub Æquatore perpetuus flaret ab Occasu in Ortum.

2°. Sit  $QPR$  parallelus quivis,  $a$  punctum quodvis,

ejus valor verus obtineatur. Quod ut illustretur, proponatur inquiri  
 spatium à corpore gravi, tempore  $t$ , percursum, manifestum est  
 spatium illud fore  $\frac{a \times t^2}{2g}$ : porro sit  $x$  illud spatium, si fieret  $ddx =$   
 $\frac{t^2 a}{g^2}$ , esset  $x = \frac{a t^2}{2g}$ , qui valor, veri subduplus est. Quare fieri  
 debet  $ddx = \frac{2a \, dt^2}{g}$ ; unde est, ut suprâ,  $x = \frac{a t^2}{g}$ .

Licet quæ hîc dicta sunt, quàm plurimis Geometris non ignota  
 sint, tamen ea hîc revocare non inconfulum duxi, ne quis parùm  
 advertens existimet, in scribendo  $2a$  pro  $a$  errorem à nobis fuisse  
 commissum.

quod (dum Sol percurrit  $Pp$ ) percurrat  $a\zeta = \lambda du$  in directione Meridiani, &  $ab = q' du$ , in directione paralleli; erit vis secundum  $ab$  semper data per functionem ipsius variabilis  $AP = u$ , & distantiarum puncti  $a$  à parallelo & ab Æquatore, quæ quidem, dum parallelus  $QPR$  à Sole describitur, ut constantes sine errore assumi possunt; quare erit quàm proximè

$$dq' = \frac{35 \cdot 2 \cdot du \cdot \phi u}{p^2 \cdot d^2}, (a) \quad \& \quad d\lambda = \frac{35 \times du \cdot \Delta u \cdot 2 \cdot a}{p^2 \cdot b^2}$$

quæ æquationes, saltem per quadraturas, facillè integrabuntur.

Inventâ autem velocitate venti secundum parallelum & Meridianum, facillè habebitur ejus velocitas, & directio absoluta ( $b$ ).

#### COROLLARIUM.

40. Non magis arduum erit invenire velocitatem puncti  $a$ , si moveatur intrâ seriem montium parallelorum. Nam actio Solis in punctum illud erit semper determinabilis per functionem ipsius  $u$ , & distantie puncti  $a$  à parallelo Astri, quæ quidem distantia, ut constans  $A$  haberi potest, tempore unius revolutionis. Igitur si  $q'' du$  sit spatium à puncto  $a$  descriptum, dum ab Astro percurritur  $Pp$ , erit quàm proximè

$$dq'' = \frac{35 \cdot du \cdot \Gamma u \cdot 2 \cdot a}{d^2 p^2 b^2}.$$

(a) Per  $\phi u$  &  $\Delta u$  intelligo functiones ipsius  $u$ , quæ dantur.

(b) Vide additamentum, art. I & II.

S C O L I U M I.

41. Difficile non foret æquationes invenire quæ ad definiendum Fluidi motum accuratissimè conducant ; v. g. pro motu in Æquatore, erit ( propter  $Pp - AB = (PA)$  hoc est,  $da - q da = du$ ) . . . . .

$$\frac{3S}{d^1} \times \left( \frac{e^{2n\sqrt{-1}} - e^{-2n\sqrt{-1}}}{4\sqrt{-1}} \right) \times \frac{2ad a^2}{b^2 p} = \frac{dq}{du} \times da.$$

feu  $\frac{3S \cdot 2ad du}{p b^2 d^1} \times \left( \frac{e^{2n\sqrt{-1}} - e^{-2n\sqrt{-1}}}{4\sqrt{-1}} \right) = dq (1 - q)$

cujus integralis est  $\frac{3Sa}{p b^2 d^1} \times (zz + mm) = q - \frac{qq}{2}$ .

S C O L I U M II.

42. Evidens est, quantitates  $\phi u$  &  $\Delta u$  (*n. 2. art. 39.*) facilè obtineri posse, (*a*) si datis quantitatibus  $AP = u$ , &  $aA = A$ , habeantur anguli  $PaA$ ,  $Pab$ , & arcus  $aP$ . Quæ quidem omnia inveniendi methodum hîc eò libentiùs exponam, quòd ex eâ exurgat Trigonometria Sphærica, non solùm quodammodò nova, sed etiam non inutilis futura, ad eorum triangulorum Sphæricorum calculum, quorum non omnia latera sunt arcus circuli maximi.

Sit igitur primò triangulum Sphæricum  $aRN$ , (*Fig. 13*) rectangulum in  $N$ , & ex tribus arcubus circuli maximi compositum; fiat Angulus  $RaN = a$ ; Angulus  $aRN = R$ ,

(*a*) Vide additamentum, *art. III.*

Angulus  $K\alpha R$  complementum ipsius  $\alpha$ ,  $= \alpha'$ ;  $\alpha N = x$ ;  $\alpha R = X$ ;  $RN = V$ ; sint  $\alpha O$ ,  $\alpha Z$ , tangentes arcuum  $\alpha N$ ,  $\alpha R$ ; facillè demonstrabitur esse triangulum  $\alpha ZO$  rectangulum in  $O$ ; unde, descripto arcu  $RV$ , ipsi  $R\alpha$  infinitè propinquo, erit  $\alpha I : \alpha V :: \alpha O : \alpha Z$  seu  $dX$ :

$$dx :: \frac{e^{xV-1} - e^{-xV-1}}{e^{xV-1} + e^{-xV-1}} : \frac{e^{xV-1} - e^{-xV-1}}{e^{xV-1} + e^{-xV-1}} \text{ proin-}$$

$$\text{de } \frac{dX(e^{xV-1} - e^{-xV-1})}{e^{xV-1} + e^{-xV-1}} = \frac{dx(e^{xV-1} - e^{-xV-1})}{e^{xV-1} + e^{-xV-1}}.$$

$$\text{feu } \frac{d(e^{xV-1} + e^{-xV-1})}{e^{xV-1} + e^{-xV-1}} = \frac{d(e^{xV-1} + e^{-xV-1})}{e^{xV-1} + e^{-xV-1}} :$$

unde, cùm, factâ  $x = 0$ , fiat  $X = RN = V$ ; erit

$$\frac{e^{xV-1} + e^{-xV-1}}{2} = \frac{e^{VV-1} + e^{-VV-1}}{2} \times$$

$$\frac{e^{xV-1} + e^{-xV-1}}{2} \dots \dots \dots (\mathcal{A}).$$

Jam verò ut habeantur anguli  $\alpha$  &  $R$ , notandum est fore, assumptâ  $x$  constante

$$\frac{dV}{dX} = \frac{1}{\text{Cof. } R} = \frac{1}{e^{RV-1} + e^{-RV-1}} \dots \dots \dots (\mathcal{A}')$$

& ; assumptâ  $V$  constante

$$\frac{dX}{d\alpha} = \frac{1}{\text{Cof. } \alpha} = \frac{1}{e^{\alpha V-1} + e^{-\alpha V-1}} \dots \dots \dots (\mathcal{A}'').$$

Sit nunc  $A\alpha = A$ ,  $AP = u$ ;  $\alpha P = u'$ ; erit, ducto per Polum  $S$  circulo maximo  $SPQ$ ;  $PQ$  seu  $AN =$

$x -$

$$x - A; NQ = \frac{AP}{\cos. AN} = \frac{1u}{c(x-A)\sqrt{-1} + c(x-A)\sqrt{-1}};$$

$$QR = NR - NQ = V - \frac{1u}{c(x-A)\sqrt{-1} + c(x-A)\sqrt{-1}};$$

tandem  $PR = X - u'$ . Porro, cum sit  $PRQ$  triangulum Sphæricum rectangulum in  $R$ , & ex tribus arcubus circuli maximi compositum, erit, ob æquationem ( $\mathcal{A}$ )

$$\left( \begin{array}{cc} PR \cdot \sqrt{-1} & -PR \cdot \sqrt{-1} \\ +c & \end{array} \right) \times 2 = \left( \begin{array}{cc} RQ \cdot \sqrt{-1} & -RQ \cdot \sqrt{-1} \\ +c & \end{array} \right) \times \left( \begin{array}{cc} PQ \cdot \sqrt{-1} & -PQ \cdot \sqrt{-1} \\ +c & \end{array} \right) \dots \dots \dots (\mathcal{A}''')$$

quâ in æquatione substituendi sunt ipsarum  $PR$ ,  $RQ$ , &  $PQ$  valores modò inventi.

Jam verò, cum ex æquatione ( $\mathcal{A}'''$ ) eruatur valor Cosinûs anguli  $R$ , qui quidem jam datur per æquationem ( $\mathcal{A}'$ ) habebitur inde nova æquatio, quam voco  $\mathcal{A}''$ ; & ex tribus æquationibus  $\mathcal{A}$ ,  $\mathcal{A}'''$ ,  $\mathcal{A}''$ , inter se collatis, nascetur unica, quæ tres quantitates  $u$ ,  $u'$ ,  $A$ ; continebit, ac præterea quantitatem  $x$  seu distantiam loci  $a$  à circulo maximo  $NR$ .

## S C O L I U M III.

43. Cum sit  $b$  (*hyp.*) spatium quod Terra percurrit tempore  $\theta$ , quo corpus grave percurrit  $a$ ; si fiat  $\theta =$

$$1^{\text{sec.}}, \text{erit } a = 15^{\text{ped.}}, b = \frac{15^{\text{grad.}}}{3600} = \frac{15 \cdot 47060 \cdot 6^{\text{ped.}}}{3600} = \frac{5706}{4} =$$

1427 ped. Quare hoc in casu velocitas angularis venti erit ad velocitatem Astri angularem ut  $q$  ad 1, seu (ne-

H

gleciâ  $mm$ ) ut  $\frac{35^a}{p b^2 d^2} \times zz$  ad 1, h. e. ut  $\frac{3 \times 15}{289 \cdot (365)^2 \cdot (1427)^2} \times$   
 $zz$  ad 1. Quare, quo tempore Terra percurrit spatium  
 $b$ , ventus maximâ suâ velocitate percurret spatium  $\frac{35^a}{p b^2 d^2}$ ;  
 hoc est tempore unius minuti secundi percurret spa-  
 tium  $= \frac{3 \times 15 \times 19695539}{289 \cdot (365)^2 \cdot (1427)^2}$  ped. quod spatium est valdè  
 parvum: cùm autem, ex observationibus, ventus sub Æ-  
 quatore describat circiter 8 aut 10 pedes, tempore unius  
 minuti secundi; sequitur velocitatem venti maximè abesse  
 à velocitate modò definitâ, ac proinde satis accuratam  
 non esse methodum Problematis præcedentis, nisi sup-  
 ponatur quantitas  $mm$  positiva, & unitate multò major.

## S C O L I U M I V.

44. Quo faciliùs judicari possit, utrùm satis accura-  
 ta sit præfens methodus, assumpta  $mm$  positivâ & ma-  
 ximâ, hîc tentabimus definire, quænam inter colum-  
 narum Fluidi longitudinem ac pondus differentia esse  
 debeat, si aëris partes definitâ velocitate moveantur. Ut  
 autem proclivior fiat calculus, assumemus Terram ad pla-  
 num Æquatoris reductam: supponemus  $s$ , esse altitudi-  
 nem Fluidi in puncto  $P$  (Fig. 14) cui Astrum imminet,  
 &  $s - k$  altitudinem in  $A$ , existente  $k$  functione ipsius  
 $u$ . Porrò sint puncta  $A, a$ , sibi mutuò infinitè vicina,  
 percurratque  $a$  lineam  $ab$  dum percurrit  $A$  lineam  $AB$ ;  
 erit (factâ  $Aa = Pp$ , & positâ  $q = \frac{35^a}{p b^2 d^2} \times [zz \pm mm]$ );

$ab - AB = \frac{2adu \cdot 3Sx dx}{pb^2 d^2}$ ; proinde  $Bb = du - \frac{2adu \cdot 3Sx dx}{pb^2 d^2}$ . Quare cum altitudo columnæ in  $A$ , dum

Astrum imminet ipsi  $P$ , sit  $\epsilon - k$ ; altitudo columnæ in  $A$ , dum Astrum est in  $P$ , debet esse  $\frac{Aa \times (\epsilon - k)}{Bb}$ ; quia scilicet Fluidum primo instanti in spatio  $AOoa$  contentum, 2<sup>o</sup> instanti occupat spatium  $Q B b q$ . Erit ergo altitudo columnæ novæ in  $A = \epsilon - k + \frac{2a\epsilon \cdot 3Sx dx}{pb^2 d^2}$ ; sed veniente  $P$  in  $p$ , altitudo columnæ in  $A$  fit  $\epsilon - k - dk$  quàm proximè; ergo  $dk = \frac{-2a\epsilon \cdot 3Sx dx}{pb^2 d^2}$ ; & (quoniam factâ  $z = 0$ , est  $k = 0$ ) erit  $k = \frac{-2a\epsilon \cdot 5x^2}{pb^2 d^2}$ . Igitur maxima

inter columnarum pondus differentia erit  $\frac{3aS}{pb^2 d^2} \times p\delta\epsilon$ ; seu (quoniam  $p\delta\epsilon =$  ponderi 32 pedum aquæ) differentia illa = ponderi  $\frac{3 \cdot 75 \cdot 32 \cdot 10695519}{(1427)^2 \cdot (165)^2 \cdot 289}$  partium aquæ pedis. Hæc autem quantitas est valdè exigua, & prætereà in præfente casu differentiam exprimit inter columnarum pondus, sive aër sit homogeneous, sive heterogeneus; nam 1<sup>o</sup>. si aër supponatur homogeneous, erit semper  $\delta$  in ratione inversâ ipsius  $\epsilon$ , quia  $p\delta\epsilon =$  ponderi 32 aquæ pedum 2<sup>o</sup>. Si aër sit heterogeneus, & compositus ex diversis superficiebus, quarum densitates  $\delta, \delta', \delta''$  &c. altitudines verò in  $P$  sint  $\epsilon, \epsilon', \epsilon''$  &c.

H ij

invenietur quæſita differentia =  $\frac{1^{as}}{p^b \cdot d^3} \times (p \delta_1 + p \delta'_1 + p \delta''_1 \text{ \&c.})$  Porro  $p \delta_1 + p \delta'_1 + p \delta''_1 \text{ \&c.} =$  ponderi 32 aquæ pedum. Ergò &c.

Cùm igitur tam exigua ſit vis quæ (art. 38) impedi-  
 poteſt quominùs partes aëris tanquam puncta unica &  
 libera moveantur, ſequitur nimis fortaffe à vero non  
 aberrare methodum Problematis præſentis, præ determi-  
 nandâ venti velocitate, modò ſupponatur *mm* quantitas  
 poſitiva, & unitate multò major. Tamen ne huic ſuſpi-  
 cioni nimis fidatur, & ut tota exhauriatur Problematis  
 difficultas, mox inquiremus velocitatem venti in hy-  
 potheſi, quòd partes aëris ſibi mutuò noceant; liceat tan-  
 tùm in ſequenti articulo pauca circà præſentem caſum  
 adjicere.

#### S C O L I U M V.

45. Si globus ſolidus, quem, ex hypotheſi, aëris la-  
 mella Sphærica cooperit, in Sphæroidem ſolidam trans-  
 formetur, inde nulla eveniet mutatio in aëris motu ſuprà  
 definito. Etenim omnia Sphæroidis puncta perpendicu-  
 lariter ad ſuperficiem Sphæroidis urgeri debent, quia  
 nempe repræſentat hæc Sphærois Terræ noſtræ ſuperfi-  
 ciem, cui aër contiguus eſt; adeòque aëris particulæ  
 huic ſuperfici vicinæ, ex actione Sphæroidis nullam  
 acquirunt novam vim, quâ hinc aut illinc, in ſuperfi-  
 ciem globi labendo, moveri poſſint. Aliter autem erit;  
 ſi Fluida ſit Sphærois, & ejus partes horizontaliter mo-

veantur : tunc enim præter vim Attractionis quæ partibus Sphæroidis & aëris communis est, datur alia vis, nempe vis acceleratrix particularum Fluidi. Porrò si sit  $\pi$  vis illa acceleratrix,  $\phi$  Attractio partium Fluidi horizontalis, & gravitas  $p$  versùs centrum resolvatur in duas vires, quarum una, quam voco  $G$ , sit ad superficiem Fluidi perpendicularis, altera, quam voco  $F$ , agat horizontaliter; evidens est (*art. 12. not. (a)*) partes Fluidi à viribus  $\phi - F - \pi$  &  $G$  sollicitatas, fore in æquilibrio; unde cùm vis  $G$  sit ad superficiem Fluidi perpendicularis, erit  $\phi - F - \pi = 0$ . Porrò vis  $\phi - F$  agit in particulæ aëris; quare particulæ aëris præter vim  $\frac{3S}{4l} \times \frac{(e^{2n\sqrt{-1}} - e^{-2n\sqrt{-1}})}{4\sqrt{-1}}$ , sollicitantur etiam ad motum à vi  $\phi - F$ , seu (quod idem est propter  $\phi - F - \pi = 0$ ) à vi  $\pi$  quâ acceleratur Fluidi particularum motus horizontalis.

Unde patet 1°. vim & velocitatem absolutam venti, eandem non esse in Sphæroidem solidam, ac in Sphæroidem Fluidam, cujus partes moveri supponuntur. 2°. Velocitatem tamen respectivam venti, & partium superficiæ globi, eandem ferè esse in utroque casu; siquidem in secundo casu vis  $\pi$  quâ augetur vel minuitur venti vis acceleratrix, eadem est quæ Fluidi motum producit.

Hæc ita se habent, ex hypothesi quòd vis  $\frac{3S}{4l} \times \frac{(e^{2n\sqrt{-1}} - e^{-2n\sqrt{-1}})}{4\sqrt{-1}}$  agat tantum in aërem, non in  
 H iij.

Fluidum inferius ; sed quia hæc hypothesis parùm est naturæ conformis , supponatur vim illam simul in aërem & in Fluidum inferius agere , & inveniatur . . . . .

$$\frac{3S}{4i} \times \frac{(e^{2uv-1} - e^{-2uv-1})}{4v-1} + \phi - F - \pi = 0. \text{ Cùm}$$

autem tres primi hujus æquationis termini exhibeant vim quæ in aërem agit , sequitur vim illam fore  $= \pi$  ; nempe aërem eadem vi accelerari quâ Fluidum contiguum : unde Fluidorum amborum velocitas respectiva nulla erit.

Inde facilè concludi potest , velocitatem venti super Mare flantis multùm diversam esse debere ab eâ , quam , cœteris paribus , in Contiente haberet ; nam siquidem aqua Maris perpetuò figuram mutat , non potest esse semper  $\phi - F = 0$  ; proinde vis acceleratrix  $\pi$  venti , ut ita dicam , Marini , non potest æqualis esse vi acceleratrici

$$\frac{3S}{4i} \times \frac{(e^{2uv-1} - e^{-2uv-1})}{4v-1} \text{ venti in Contiente flantis.}$$

PROPOS. VIII. LEMMA.

46. Detur parallelepipedum rectangulum cujus basis sit rectangulum infinite parvum ABCD , ( Fig. 16 ) & cujus altitudo dicatur  $s$  ; supponamus pervenire puncta A , B , C , D , in  $a$  ,  $b$  ,  $c$  ,  $d$  ; ita ut basis ABCD evadat abcd . Queritur quamam esse debeat altitudo parallelepipedum , cujus basis abcd , ut parallelepipedum illud dato æquale sit , cujus basis ABCD & altitudo  $s$  .

Sit  $s - \mu$  altitudo quaesita , existente  $\mu$  admodum parvâ respectu  $s$  ; eritque  $[s - \mu] \times (AB + ab - AB) \times$

$(AD + ad - AD) = s. AB. AD.$  Unde (neglectis negligendis) est  $\frac{\mu}{s} = \frac{ab - AB}{AB} + \frac{ab - AD}{AD}.$  Q. E. Inv.

## PROPOS. IX. PROBLEMA.

47. Sit Terra globus solidus cujus centrum  $G$  (Fig. 17): coopertus sit undique globus Fluido homogeneo & non Elastico, ac præterea valdè raro, ut Attractionis partium Fluidi nulla ratio habeatur; moveatur uniformiter circa globi centrum ad distantiam  $d$  corpus cujus massa  $S$ ; quæritur motus Fluidi ex corporis  $S$  actione oriundus.

## I.

Supponamus 1<sup>o</sup>. corpus  $S$  moveri in plano circuli maximi  $pPR$ , & in superficie globi assumantur Fluidi puncta duo  $A, B$ , circulo  $pPR$  infinitè propinqua, & ex utràque parte æqualiter distantia. Jam verò per puncta  $A$  &  $B$ , & per punctum  $P$ , cui corpus  $S$  verticaliter imminere supponitur, transeant plana circulorum maximorum  $PAD, PBC$ ; patet punctorum  $A$  &  $B$  motum horizontalem oriri ex eâ vi corporis  $S$ , quæ in puncta  $A$  &  $B$  horizontaliter agit. Porrò cum hujus vis directio semper sit in plano verticali per corpus  $S$  transeunte, planumque istud parùm deviet à plano immoto  $pPR$ , fâtem pro iis locis quæ circulo  $pPR$  vicina sunt, idè supponemus puncta  $A$  &  $B$  instanti quolibet moveri in plano circuli maximi qui transeat per hæc puncta, per centrum  $G$ , & per corpus  $S$ ; nullamque rationem habebimus motûs,

quem Corpuscula  $A$  &  $B$  perpendiculariter ad hoc planum habere possent: quæ quidem hypothesis, utrùm pro factis legitimâ haberi possit, inferiùs ad amissim perpendemus.

## I I.

Jam fiat arcus  $PA$ , seu distantia Astri ab  $A = u$ ;  $Pp = d\alpha$ , arculus quem corpus  $S$  uno instanti percurrit: assumatur, quod licet,  $AD = Pp$ , fiatque præterea  $AB = Pp$ , quod etiam licet. Nunc verò observabimus variationem totam, quæ tùm in partium Fluidi velocitate, tùm in altitudine occurrit, pendere debere à solâ variabili corporis  $S$  distantia à Zenith loci in quo quæritur Fluidi motus. Proinde, si lineola  $Aa$  à puncto  $A$  Fluidi describatur, dum venit corpus  $S$  ex  $P$  in  $p$ , quæ quidem lineola  $Aa$  respectu ipsius  $Pp$  admodum parva supponitur, erit  $Aa = qd\alpha$ , denotante  $q$  functionem compositam ex  $u$  & constantibus, & supponi sine errore poterit  $d\alpha = du$ , &  $Aa = qdu$ ; ergò si sit  $D\delta$  spatium à  $D$  intereà percursum, erit  $D\delta - Aa = dqdu$ ; &

$$\frac{dqdu}{BM} = \frac{BM - BM}{BM} = qdu \times \frac{d(c^{u\sqrt{-1}} - c^{-u\sqrt{-1}})}{c^{u\sqrt{-1}} - c^{-u\sqrt{-1}}}$$

( existente sinu ipsius  $PA$  seu  $PB = BM = \frac{c^{u\sqrt{-1}} - c^{-u\sqrt{-1}}}{2\sqrt{-1}} )$

## I I I.

Sit nunc altitudo Fluidi in  $P = s$ , &  $s = k$  altitudo ejus

ejus in  $A$ ; manifestum est, veniente  $S$  in  $P$ , altitudinem  $s - k$  minuendam esse (*art.* 46) quantitate  $(s - k) \times$

$(\frac{Dd - Aa}{AD} + \frac{ab - AB}{AB})$ ; seu, neglectis negligendis,

$(\frac{Dd - Aa}{AD} + \frac{bm - BM}{BM}) \times s$ . Atqui, si supponatur

$k = \int v du$ , patet, veniente  $P$  in  $p$  &  $A$  in  $a$ , ita ut sit  $Aa$  minima respectu  $Pp$ , altitudinem  $s - k$  fieri quàm proximè  $s - k - v du$ ; ergò erit . . . . .

$$\frac{v}{s} = \frac{dq}{du} + \frac{q d(c^{uv-1} - c^{-uv-1})}{du(c^{uv-1} - c^{-uv-1})} \dots \dots (A).$$

IV.

Supponatur deinde  $\pi$  esse vim acceleratricem particulæ  $A$ , seu  $a$ ; erit  $\pi = \frac{d(Aa) \cdot p \theta^2}{dt^2 \cdot 2a}$  (iisdem nempè reten-

tis denominationibus ac in *art.* 13): & si fiat  $b : da :: \theta : dt$ , hoc est, si ponatur corpus  $S$  angulum  $b$  tempore  $\theta$

percurrere motu uniformi, erit  $\pi = \frac{d(Aa) \cdot p b^2}{2a da^2} =$  quàm

proximè  $\frac{dq}{du} \times \frac{p b^2}{2a}$ ; quia scilicet  $Aa$  est minima respectu

$Pp$ .

Jam verò evidens est, quòd, cùm punctum  $A$  secundùm  $AD$  moveatur vi acceleratrice  $\pi$ , secundùm  $AP$ ,

verò trahatur vi acceleratrice  $\frac{3S(c^{2uv-1} - c^{-2uv-1})}{4d^2v-1}$ ,

neceffe est, ut vis  $\frac{3S(c^{2nV-1} - c^{-2nV-1})}{4d^1V-1} + \pi$ , si in punctum *A* sola agat, nullum in hoc puncto producat motum (*a*); quamobrem talis esse debet vis illa  $\frac{3S(c^{2nV-1} - c^{-2nV-1})}{4d^1V-1} + \pi$ , ut cum gravitate *p* æquilibrium faciat; proinde differentia ponderis columnarum in *A* & *D*, debet esse æqualis  $AD \times (\frac{3S[c^{2nV-1} - c^{-2nV-1}]}{4d^1V-1} + \pi)$ . . . . .

Ergò  $v du \times p = du (\frac{3S[c^{2nV-1} - c^{-2nV-1}]}{4d^1V-1} + \pi)$ ;

feu  $v = \frac{3S(c^{2nV-1} - c^{-2nV-1})}{4pd^1V-1} + \frac{bbdq}{dn.2a} \dots (B)$ .

## V.

Ex æquationibus *A* & *B* elicitur sequens æquatio:

$$\frac{v dq}{dn} + \frac{v q d(c^{nV-1} - c^{-nV-1})}{dn(c^{nV-1} - c^{-nV-1})} = \frac{3S}{pd^1} \times \frac{(c^{2nV-1} - c^{-2nV-1})}{4d^1V-1} +$$

$$\frac{dq}{dn} \times \frac{b^2}{2a} : \text{quæ, si supponatur } 1 - \frac{b^2}{2a} = \lambda ; \&$$

$$\frac{c^{nV-1} - c^{-nV-1}}{2V-1} = z ; \text{reducitur ad } \lambda dq + \frac{q dz}{z} =$$

$$\frac{3S z dz}{1pd^1} ; \text{cujus integralis completa est } qz^{\frac{1}{\lambda}} = \frac{3S}{1pd^1} \times$$

(a) Vide notam in *art. 12. §. II.* & adverte vim *F* hujusce notæ hic esse  $= \frac{3S(c^{2nV-1} - c^{-2nV-1})}{4d^1V-1}$ .

$$\frac{\frac{1}{\lambda} + 2}{2\lambda + 1} (*) ; \text{ergò } q = \frac{3S}{p d^3} \times \frac{z^2}{3 - \frac{b^2}{d^2}} ; \& \int v du = \frac{3S z z}{2 p d^3} +$$

$$\frac{b^2}{2 d^2} \times \frac{3S}{p d^3} \times \frac{z^2}{3 - \frac{b^2}{d^2}} = \frac{3S z^2}{2 p d^3} \times \left( \frac{3 d^2}{3 d^2 - b^2} \right).$$

## V I.

Hi sunt valores quantitatum  $k$  &  $q$ , in eâ hypothesi quam suprà fecimus, nempe puncta  $A$  circulo  $pPR$  vicina, moveri semper in plano per centrum  $G$  & corpus  $S$  transeunte, quod quidem prò satis vero haberi potest propter duas rationes: 1°. quòd vis quæ punctum  $A$  à plano isto deflectere potest, sit infinitè parva respectu vis secundùm  $AP$ , quæ ipsa est minima respectu gravitatis  $p$ . Unde modò sit aliquantula in partibus Fluidi coherentia & tenacitas, & ex asperitate superficiei terrestri nonnulla resistentia oriatur, vis hujusce effectus nullus esse debet. 2°. Hæc vis prætereà, per unius revolutionis tempus, alternatim in contrarias partes agit, adeòque effectus hujus totalis pro nullo haberi potest, & quantitates  $q$ , &  $k$  suprà determinatæ, ut quantitates mediæ

(\*) In hac æquatione nulla est addenda constans. Nam si  $\frac{1}{\lambda}$  fit positiva quantitas, ut &  $\frac{1}{\lambda} + 2$ ; tunc fit utrumque membrum = 0 quando  $z = 0$ ; si verò  $\frac{1}{\lambda}$ , aut  $\frac{1}{\lambda} + 2$ , aut ambo sint negativa, erit semper, quando  $z = 0$ , æqualitas inter ambo membra, nullâ additâ constante, modò ponatur  $q = \frac{3S z z}{p d^3 (2\lambda + 1)}$ .

I ij

possunt considerari. Punctorum verò cæterorum à circulo  $pPR$  quantumvis distantium motus supponi potest fieri etiam proximè in circuli maximi plano per puncta ista, & corpus  $S$ , & centrum  $G$  transcunte; 1°. quòd vis quæ puncta ista ab hoc plano deflectere valet, alternatim in contrarias partes agit. 2°. Quòd Fluidi partium tenacitate & coherentiâ effici potest, ut partes quæ à circulo  $pPR$  distant, motum cum partibus circulo  $pPR$  vicinis congruum habere debeant.

Quod attinet ad velocitatem istorum punctorum, definitur posthac illa in *art. 70 & 71*: sed hic assumemus, Fluidi tenacitate effici, ut partes omnes à Sole æqualiter distantes, æqualem habeant velocitatem.

Licebit-ne adjicere, ad hanc confirmandam hypothefim, quòd suppositione non multùm abfimili narrantur ferè omnia, quæ in eximiis de Fluxu ac Refluxu maris Differtationibus exposuerunt celeberrimi Geometræ *DD. Euler & Daniel Bernoulli?*

Supponunt nempe Authores illi clarissimi, Terram, actione Solis aut Lunæ, in Sphæroidem mutari, cujus Axis sit linea jungens centra Solis aut Lunæ, & Terræ: porrò cùm altitudo partium Fluidi à velocitate horizontali pendeat, & altitudo eadem esse supponatur in locis omnibus à quorum Zenith corpus  $S$  æqualiter distat, nonne inde conjectari licet, eandem quoque in his punctis supponi posse velocitatem horizontalem?

Præterea, observationibus constat ventum sub Æquatore flare ab Ortu in Occasum tempore Æquinoctiorum,

simulque in hemisphærio Boreali paulùm à Noto participare, in Australi verò paulùm ab Austro, & eò magis ab Austro aut à Noto participare, quò Sol magis versùs Boream aut versùs Austrum promovetur; unde directio venti supponi potest (circumcirrà) in plano verticali per quod Sol transit.

Denique, si Attractionis partium Fluidi ratio habeatur, ut habebitur in Propof. 15. art. 77, necessariò supponi debet Fluidi figuram esse Sphæroidicam; secùs enim in calculos inextricabiles incidere.

Còterùm, si cui fatis non arideant hypotheses istæ, ille in Problemate sequenti veras inveniet æquationes quibus partium Fluidi motus accuratissimè possit determinari, simulque correctiones quæ ad determinandam venti velocitatem adhiberi possunt.

Si corpus  $S$  moveatur, non in plano circuli maximi, sed in curvâ quâcumque, videtur etiam ob causas jam allatas, fati legitimè supponi semper posse, punctum quodvis Fluidi moveri in plano, quod per centrum Terræ, & per corpus  $S$  transeat.

## C O R O L L. I.

$$48. \text{Cùm sit } Aa = q du = \frac{3sz^2}{pd'(3 - \frac{b^2}{a^2})} \times du, \text{ pa}$$

tet, punctum  $A$  (ob quantitatem semper positivam  $zz$ ) ad eandem semper partes moveri; nempe ad contrarias partes corporis  $S$ , ut in Figurâ 17 supposuimus, si sit

I iij

$3 > \frac{b^2}{a^2}$ , contrà verò ad eandem partes, si sit  $3 < \frac{b^2}{a^2}$ .

Supponendo autem aërem esse homogœnum, est (art. 33 & 44)  $s = 850 \cdot 32^{\text{ped.}}$ ,  $a = 15^{\text{ped.}}$ ,  $b = 1427^{\text{ped.}}$ . Ergò  $3as$  seu  $3 \cdot 15 \cdot 850 \cdot 32 < (1427)^2$  seu  $b^2$ . Unde aër moveri debet ad eandem continuò partes cum Sole : quòd, quantum fieri potest, observationibus congruit.

Præterea patet altitudinem Fluidi  $s = k$  seu  $s = \frac{3Sx^2}{2p^2d^2} \times \frac{3as}{3as - b^2}$ , minimam esse in locis quæ corpus  $S$  ad horizontem habent, maximam verò in iis quorum corpus  $S$  Zenith occupat, si sit  $3as > b^2$ ; contrà autem si  $3as < b^2$ , altitudinem Fluidi fore minimam, corpore  $S$  in lineâ Zenith existente, maximam verò, cum corpus  $S$  in horizonte est. Denique sive  $3as$  sit  $>$  vel  $<$   $b^2$ ; Fluidi superficiem alternatim per unius diei revolutionem bis elevari & bis subsidere; sed hujus altitudinem nunquam esse ipsâ  $s$  majorem aut minorem.

#### S C O L I U M I.

49. Mirum admodum videri potest, quòd in hypothēsi  $3as < b^2$ , Fluidum sub Astro subsidere debeat; tamen re attentè perspensâ, quidquid hîc paradoxî est, ferè evanescet. Nam si Fluidi nulla foret inertia, reverâ semper versùs Astrum elevari deberet; sed talis esse potest inertia partium, ut cum versùs Astrum 1°. instanti sese elevaverint, instanti sequenti, non præcisè sub

Astro, sed paulò remotiùs versùs ortum se elevent, infanti tertio paulò adhuc remotiùs versùs ortum, & sic perpetuò, usque dum ad 90 circiter gradus ad Astro pervenerint; quo in loco supponi possunt acquisivisse statum permanentem. Ut Fluidum sub Astro maximè subsidat, debet eò magis elevari, quò magis distat ab Astro; porò ut eò magis elevetur, quò magis ab Astro distat, sufficit, ut ex duobus punctis in eodem verticali sibi infinite propinquis, illud lentius aut velocius moveatur, quod magis ab Astro distat, prout motus fiet ad contrarias aut ad eandem partes cùm corpore *S*. Si enim, v. g. sit  $Dd < Aa$ ; altitudo Fluidi in *A* augebitur dùm pervenit *P* in *p*, quia decrescente *ABDC* in *abdc*, altitudo Fluidi in eadem ratione augeri debet. Unde minuitur paradoxum, siquidem ad id reducitur, quò velocitas horizontalis Fluidi eò major sit, quò corpus *S* horizonti propius est.

S C O L I U M II.

50. Nemo autem existimet, hoc paradoxum inde natum esse, quò supposuerimus puncta omnia Fluidi semper moveri in plano verticali per corpus *S* transeunte. Nam si Terra & aër ambiens, reducerentur ad planum unicum circuli *pPR*, tunc, nullâ factâ hypothefi, invenirentur æquationes sequentes,  $\frac{v}{i} = \frac{dq}{dn} \dots (C)$  &  $v =$   
 $\frac{35(c^{2nV-1} - c^{-2nV-1})}{p d^1 \cdot 4V-1} + \frac{dq \cdot b^1}{2ndn} \dots (D)$ ; unde elicet

tur  $\lambda dq = \frac{3Szdz}{sp d^1}$ ; cujus integralis est  $q = \frac{3Sz^2}{\lambda sp \cdot 2 d^1} \pm K$   
 (ponendo nempe esse  $q = K$ , quando  $z = 0$ ); &  
 $\int y du = \frac{3Sz^2}{2p d^1} \times \left( \frac{2a^1}{2a^1 - bb} \right)$ ; unde patet, quòd, si  $2a^1 < bb$   
 Fluidum sub Astro subfidere debeat.

## C O R O L L. II.

§ 1. Res est notatu non indigna, quòd in eo casu, in quo Terra globus supponitur, necessariò determinati sit valoris quantitas  $q$ ; in casu verò, quo ad circulum reductus supponitur terrestris globus, variari potest  $q$  pro valore quantitatis  $K$ . Sit  $K = \frac{3Smm}{\lambda sp \cdot 2 d^1}$ ; & fiet motus Fluidi in easdem partes cum corpore  $S$ , aut in partes contrarias, aut alternatim in eandem partem & in contrarias partes, prout erit  $\frac{zz + mm}{\lambda}$ , aut semper negativa aut semper positiva, aut alternatim positiva, & negativa quantitas.

## C O R O L L. III.

§ 2. Hinc generaliter concipere licet, quomodò fieri possit, ut ventus sub Æquatore perpetuus flet ab Ortum in Occasum, nempe in eâdem cum Sole & Lunâ directione, simulque Mare bis affluat & defluat per tempus unius revolutionis diurnæ; nam massa aëris quæ sub Æquatore vasto Oceano imminet, cum undequaque libera

ra fit, ut Sphæræ pars concipi potest; contrà verò Mare à Terris hinc inde coarctatum, moveri debet ferè quasi in plano circulari. Adde quòd littora secundùm directionem Meridiani protensa, necessariò impediunt, ne moveri perpetuò possit Mare versùs easdem partes.

S C O L I U M III.

53. Si foret in calculis Problematis præcedentis  $3as = b^2$ ; tunc foret  $Aa$  infinita, adèdque maxima respectu  $Pp$ ; proinde ad hunc casum applicari non possent calculi præsentis Problematis. Ut autem tunc habeantur æquationes ad motum Fluidi pertinentes, observandum est esse  $Pp + AD = d(PA)$  seu  $da + qd\alpha = d\alpha$ . Unde, factâ semper  $AD = Pp = da$ , erit . . . . .

$$(1) \dots \frac{dk(1+q)}{1-k} = dq + \frac{qd(c^{n\sqrt{-1}} - c^{-n\sqrt{-1}})}{c^{n\sqrt{-1}} - c^{-n\sqrt{-1}}};$$

&c

$$(2) \therefore \frac{dk}{dn} = \frac{3S(c^{2n\sqrt{-1}} - c^{-2n\sqrt{-1}})}{4d^2p\sqrt{-1}} + \frac{dq \cdot (1+q)bb}{dn \cdot 2a}$$

quare, factis reductionibus, positâque . . . . .  
 $\frac{c^{n\sqrt{-1}} - c^{-n\sqrt{-1}}}{2\sqrt{-1}} = z$ ; inveniatur . . . . .

$$(3) \dots \frac{3Szdz}{p^2d^2} + \frac{bbdq}{2a} - 3dq - \frac{3qdz}{z} = \frac{-3qdq}{1+q} - \frac{k dq}{1+q} - \frac{qbbdq}{2a} - \frac{3qgdz + ckqdz}{z(1+q)}; \text{cujus æquationis inte-}$$

gratio non apparet nisi sint  $q$  &  $k$  quantitates admodùm  
 K

parvæ respectu ipsius  $\epsilon$ ; quo in casu supponi potest secundum membrum  $= 0$ .

Advertendum tamen æquationem istam nonnihil utilitatis habere, ut, quàm proximè libuerit, determinetur Fluidi motus. Nempè integretur primùm illa, neglecto 2º membro, tum denuò integretur positus in 2º membro valoribus ipsarum  $q$  &  $k$ , ex primâ integratione inventis; postea ex novo valore ipsius  $q$  inveniatur per æquationem (2) novus valor ipsius  $k$ , qui est accuratè  $\frac{3S\pi\pi}{2p d^2} +$

$\frac{b^2 q}{2a} + \frac{b^2 q^2}{4a}$ ; deinde substitutis hisce valoribus in 2º membro æquationis (3), eruatur iterùm per integrationem novus valor ipsius  $q$ , & sic deinceps: hâc ratione magis & magis accedetur ad verum quantitatam  $q$  &  $k$  valorem.

#### C O R O L L. IV.

54. Ut determinetur constans  $\epsilon$  saltem quando  $k$  est parva respectu  $\epsilon$ ; sit  $\epsilon'$  altitudo Fluidi in statu Sphærico, critque, quod invenire facillè est,  $\epsilon' \cdot 2\pi r r = \epsilon \cdot 2\pi r r -$

$\frac{3S}{p d^3} \times \frac{2\pi r^3}{3} \times \frac{3\pi\epsilon}{3\pi\epsilon - b^2}$ . Unde est quàm proximè  $\epsilon = \epsilon' +$

$\frac{3S}{p d^3} \times \frac{3\pi\epsilon' \cdot r}{3(3\pi\epsilon - b^2)}$ .

#### S C O L I U M IV.

55. Cùm sit quantitas  $k$  proportionalis quadrato  $z z$

Sinûs arcûs  $PA$ , sequitur Fluidi superficiem fore semper Ellipsim, cujus axium differentia  $= \frac{3S \cdot 3ae}{2p d^3 (3ae - b^2)}$ ; ubi norandum est, si  $3ae > b^2$ , esse semper  $3ae > 3ae - b^2$ ; unde Ellipsis versûs Astrum oblongatior erit eâ, quam indueret Fluidum si corpus  $S$  quietum foret, & cujus axium differentiam esse  $\frac{3S}{2p d^3}$  constat ex *art.* 33: si verò  $3ae < b^2$ , compressa versûs Astrum erit Ellipsis, eòque magis vel minus, quò  $3ae$  respectu  $bb - 3ae$  major vel minor erit. Tandem si  $b = 0$ , erit axium differentia  $\frac{3S}{2p d^3}$ , præcisè ut ex *art.* 2 & 33 invenitur; qui quidem consensus, ex longè diversis principiis deductus, Theoriam hanc nostram non leviter videtur confirmare.

SCOLIUM V.

56. Si corpus  $S$  semper moveatur in plano  $\text{Æ}$ quatoris  $PAR$ , manifestum est, eandem semper fore illius à polo utroque distantiam, nempe 90 graduum; proinde Fluidum in polis eandem semper altitudinem ac velocitatem, si quæ sit, servare debere; quod quidem ex calculis nostris aliundè eruitur; siquidem nec altitudo, nec velocitas variantur, ubi  $z$  est constans. Unde nostra iterum Theoria confirmatur.

SCOLIUM VI.

57. Si Fluidum, in statu Sphærico, divisum suppo-  
K ij

natur in superficies Sphæricas numero infinitas ; manifestum est, quòd, cùm superficies extima (*art.* 55) in Ellipsim mutetur cujus axium differentia cognoscitur, superficies quælibet in Ellipsim pariter mutabitur, cujus axium differentia semper proportionalis erit distantix hujus superficie à terrestris globi superficie. Quod eodem ratiocinio ferè evincitur ac in *art.* 17. Unde eodem modo, quo in laudato articulo, habebitur cujusvis puncti velocitas & directio absoluta.

## S C O L I U M VII.

58. Huc usque supposuimus, Terram cum Fluido ambiente eodem circà axem suum motu angulari moveri, quem ad corpus *S* transtulimus. At si, quæcumque de causâ, eadem non esset velocitas angularis Terræ & Atmosphæræ, sit excessus velocitatis Fluidi suprâ velocitatem Terræ  $\pm V$ ; excessus ille velocitatis cum signo & in sensu contrario ad Solem transferri debet; unde mutabitur tantùm quantitas constans *b*, reliquis, ut antea, permanentibus.

## P R O P O S . X . L E M M A .

59. *Sint plana duo ACG, BCG, (Fig. 18) ad se invicem perpendicularia; & sit angulus ACB rectus, ut & anguli GCB, GCA; ducantur in planis AG, BG, rectæ CE, CD, quæ cum AC, BC, angulos constituent infinitè parvos ACE, BCD; dico angulum ECD, pro recto haberi posse.*

Nam  $DE^2 = AB^2 + BD^2 - AE^2 = BD^2 - AE^2 + AC^2 + CB^2 = BD^2 - AE^2 + CE^2 - AE^2 + CD^2 - BD^2 = CE^2 + CD^2 - 2AE^2$ . Ergo  $ED^2$  differt tantum à  $CE^2 + CD^2$ , quantitate infinitè parvâ secundi ordinis; proinde angulus  $ECD$  à recto tantum differt quantitate infinitè parvâ secundi ordinis. Ergò angulus  $ECD$  pro recto haberi potest.

PROPOS. XI. LEMMA.

60. *Iisdem; ac in Lemmate præcedente, positis; sollicitetur punctum C (Fig. 19) à tribus potentiis, quarum una (p) secundum CG agat, reliquarum verò ambarum ( $\pi$  &  $\omega$ ) prior agat in plano CGD perpendiculariter ad CG, posterior in plano GCE perpendiculariter ad CG; per punctum quodvis G lineæ CG ducatur perpendicularis G $\epsilon$  ad planum ECD, & per punctum  $\epsilon$ , ubi plano ECD occurrit, ducantur  $\epsilon d, \epsilon e$ , perpendiculares ad CD, CE; dico, si fuerit  $p : \pi :: CG : Cd$ , &  $p : \omega :: CG : Ce$ , vim ortam ex tribus p,  $\pi$ ,  $\omega$ , fore ad planum ECD perpendicularem.*

Nam potentia  $\pi, \omega$ , quæ, ex hypothesi, sunt perpendiculares ad CG, possunt supponi agentes secundum CD, & CE; inde enim error tantum infinitè parvus secundi ordinis, aut etiam tertii, orietur in determinatione directionis ac valoris potentia, ex tribus p,  $\pi, \omega$ , nascentis. Jam verò cum sit (art. 59.) angulus  $ECD$  rectus, &  $\pi : \omega :: Cd . Ce$ ; vis ex  $\pi$  &  $\omega$  resultans erit secundum C $\epsilon$ , eritque. ad p, ut C $\epsilon$  ad CG; ergò vis  
K iij.

quæ ex hâc & ex  $p$  oritur, erit ad  $G$  parallela, hoc est, erit ad planum  $ECD$  perpendicularis. *Q. E. D.*

## COROLLARIUM I.

61. Vicissim si sollicitetur punctum  $C$  à potentiâ quâcumque, perpendiculariter ad planum  $ECD$  agente, supponi semper licet hanc potentiam oriri ex tribus aliis  $p, \pi, \varpi$ , quæ secundum  $CG, CD, CE$  agant, quæque sint ad invicem ut  $CG, Cd, Ce$ .

## COROLL. II.

62. (\*) Ex principiis quæ in præcedentibus articulis 59, 60 & 61, posita sunt, reddi ratio potest cur mutationes in globi terrestris figurâ, ortæ ex viribus Solis ac Lunæ conjunctim agentibus, eadem ferè sint ac summa mutationum, ex iis viribus ortarum, si separatim summantur. Sint enim  $AL, AB$ , (Fig. 20) duo arcus infinitè parvi in circulo globi maximo, sitque angulus planorum  $LAG, ABG$ , rectus; jam verò puncta  $A, B, L$ , in  $C, D, E$ , descendant, propter vim aliquam minimam  $S$ , in partes globi secundum legem quamlibet agentem; & eadem puncta  $A, B, L$ , in  $I, O, K$ , descendant, propter aliam vim minimam  $L$ , utlibet in globum agentem; dico, viribus  $S$  &  $L$  conjunctim agentibus, puncta  $A, B, L$ , in  $P, S, R$ , ventura, ita ut sit  $BD + DS = BD + BO$ ;  $AC + CP = AC + AI$ ;  $LE + ER = LE + LK$ .

Nam 1°. cum sint  $AC$  &  $AP$  respectu  $AG$  quàm

minimæ, vires conjunctæ  $S, L$ , in  $P$  agere censendæ sunt ut in  $C$  & in  $I$ . 2°. Sint  $p, \pi, \omega$ , vires quæ in punctum  $C$  agant secundum  $CG$ , & secundum lineas ipsi  $CG$  perpendiculares in planis  $ABG, ALG$ , erit  $p : \pi :: AB : BD - AC$ ; &  $p : \omega :: AL : LE - AC$ . Pariter, si sint  $p, \pi', \omega'$ , tres vires similiter in punctum  $I$  agentes, erit  $p : \pi' :: AB : AO - AI$ ; &  $p : \omega' :: AL : LK - AI$ . Ergo  $p : \pi + \omega' :: AB : BS - AP$ ; &  $p : \omega + \omega' :: AL : LR - AP$ . Ergo (art. 60.) punctum  $P$  urgetur vi quæ est ad planum  $RPS$  normalis. Quare punctum  $P$  in æquilibrio stare debet.

Quicumque sit virium  $S, L$  &c. numerus, vera semper erit propositio præfens, ut attendenti faciliè patet. Quare mutatio totalis ex his orta, æquabitur semper summa mutationum ex separatâ actione nascentium.

PROPOS. XII. LEMMA.

63. *Detur globus cujus centrum  $G$ , (Fig. 21): sint  $PE, PA$  duo circuli maximi,  $AO$  arcus circuli minimi, cujus planum  $RAO$  sit ad plana circulorum  $PA, PE$  perpendiculare; dico*

1°. Si fiat  $PO$  vel  $PA = u$ , angulus  $APO = A$ ,  $PG = 1$ , esse  $AO = A \cdot RO = \frac{A(c^{uV-1} - c^{-uV-1})}{2V-1}$ .

2°. Si supponatur arcus infinitè parvus  $Pp = da$ , esse  $pA - PA = pN = \frac{da(c^{AV-1} + c^{-AV-1})}{2}$ ; &c

$$\text{angulum } NAP = \frac{PN}{\text{Sin. } PA} = \frac{PN}{AR} = \frac{Pp \times \text{Sin. } A}{AR} = \frac{da \cdot (e^{AV-1} - e^{-AV-1})}{e^{uV-1} - e^{-uV-1}}$$

3°. Si ducatur perpendicularis  $AZ$  ad  $OR$ , erit  $\frac{AZ}{ZR} = \frac{e^{AV-1} - e^{-AV-1}}{v^{-1}(e^{AV-1} + e^{-AV-1})}$ , tangenti nempe anguli  $APO$ ;

& anguli  $ApO$  tangens invenietur  $\frac{AZ}{ZR + Pp \times RG} = \frac{AZ}{ZR} - \frac{RG \cdot AZ \cdot Pp}{ZR^2} = \frac{AZ}{ZR} - \frac{RG \cdot AZ \cdot da}{ZR^2}$ . Unde patet angulum

$ApO$  esse  $= APO - \frac{RG \cdot AZ \cdot da}{ZR}$  diviso per  $1 + \frac{AZ^2}{ZR^2}$ ; seu (propter  $AZ^2 + ZR^2 = AR^2$ ) esse  $ApO = APO - \frac{da \cdot RG \cdot \text{Sin. } A}{\text{Sin. } u}$ , sive esse angl.  $ApO = APO - da \times \frac{(e^{AV-1} - e^{-AV-1}) \cdot (e^{uV-1} + e^{-uV-1})}{2(e^{uV-1} - e^{-uV-1})}$ .

4°. Assumptâ  $Pp$  constante, fiet  $\frac{PN}{Pp} = \text{Cof. } APO$ :

$$\text{Unde } d(pN) = Pp \times \frac{d(e^{AV-1} + e^{-AV-1})}{2} = \frac{2 da}{e^{AV-1} + e^{-AV-1}} \times \frac{e^{AV-1} - e^{-AV-1}}{2v^{-1}} \times \frac{du (e^{AV-1} - e^{-AV-1}) \cdot (e^{uV-1} + e^{-uV-1})}{(e^{AV-1} + e^{-AV-1}) \cdot (e^{uV-1} - e^{-uV-1})} =$$

$du^2$

$$\frac{d^2 \cdot (e^{AV-1} - e^{-AV-1})^2 \cdot (e^{uV-1} + e^{-uV-1})}{V-1 (e^{AV-1} + e^{-AV-1})^2 \cdot (e^{uV-1} - e^{-uV-1})}$$

5°. Sit  $QAK$  circulus quivis maximus per  $A$  transiens; capiatur in hoc circulo  $Aa$  infinite parva, simulque etiam admodum parva respectu  $pN$  &  $pP$ , ducanturque perpendicularæ  $ai$  in  $PA$ , &  $ae$  in  $OA$ ; veniat jam  $P$  in  $p$ ; &, manente eadem  $Aa$ , decrescet linea  $Ai$  quantitate =  $Ae \times$  angl.  $PAN$ , crescet verò  $Ae$  quantitate =  $Ai \times$  angl.  $PAN$ .

C O R O L L.

64. Cùm sit  $Aa$  admodum parva respectu  $Pp$ , sequitur, si transferatur  $A$  in  $a$  dum venit  $P$  in  $p$ , supponi semper posse  $Ai$  decrescere quàm proximè quantitate  $Ae \times$  angl.  $PAN$ : crescere verò  $Ae$  quantitate  $Ai \times$  angl.  $PAN$ .

PROPOS. XIII. PROBLEMA.

65. *Isdem postis ac in Prop. 9. art. 47, invenire motum Fluidi, hâc non factâ hypothesi, quòd Fluidum semper in verticali circulo per corpus S transeunte moveatur.*

I.

Sit  $e$ , altitudo Fluidi in  $P$ ,  $e - k$  altitudo hujus in  $A$ , existente  $k$  admodum parvâ respectu  $e$ ; supponatur punctum  $A$  percurrere  $Aa$ , dum venit  $P$  in  $p$ ; manifestum est punctum illud, instanti sequenti, si nihil ob-

L

staret, descripturum in circulo  $QAK$  lineam  $aa = Aa$ , adeò ut lineæ  $Ai$ ,  $Ae$ , (quæ in  $a$  positionem mutant) fierent quàm proximè (art. 64)  $Ai - Ae \times$

$$\frac{da(c \frac{AV-1}{e^{uV-1}} - c \frac{AV-1}{e^{uV-1}})}{e^{uV-1} - c \frac{AV-1}{e^{uV-1}}}, \text{ \& } Ae + Ai \times$$

$$\frac{da(c \frac{AV-1}{e^{uV-1}} - c \frac{AV-1}{e^{uV-1}})}{e^{uV-1} - c \frac{AV-1}{e^{uV-1}}}.$$

## I I.

Jam verò; ut inveniatur puncti  $A$  velocitas & directio in instanti quolibet, sufficit ut habeatur pro hoc instanti ejus velocitas, tum in plano verticali per corpus  $S$  transeunte, tum in plano circuli minimi huic perpendiculari, quæ quidem ambo plana continuò positionem mutant.

## I I I.

Sit ergò  $Ai = qda$ ;  $Ae = nda$ ; manifestum est, solum iri Problema, si determinentur quantitates  $q$  &  $n$ . Porro quantitates istæ, ut & quantitas  $k$ , non possunt esse nisi functiones ipsarum  $u$  &  $A$ . Quamobrem ponatur

$$dq = r du + \lambda dA$$

$$dn = \gamma du + \epsilon dA$$

$$dk = \rho du + \sigma dA.$$

## I V.

Perventis  $A$  in  $a$ , &  $P$  in  $p$ , quantitas  $nda$ , seu  $da \times n$ ,

fiet quàm proximè  $da \times [n + \gamma \cdot pN + \epsilon \times ApO - APO] = da \times [n + \frac{\gamma da (e^{AV-1} + e^{-AV-1})}{2}] +$   
 $\epsilon \times \frac{-da (e^{AV-1} - e^{-AV-1}) \cdot (e^{nV-1} + e^{-nV-1})}{2(e^{nV-1} - e^{-nV-1})} \dots (1)$   
 (art. 63. n. 2 & 3).

V.

Si autem nulla vis in punctum *A* secundum *Ae* ageret, lineola à puncto *A* descripta (dùm punctum *P* describit  $pp' - Pp$ ) foret (n. I. art. huj.)  $nda +$   
 $\frac{\gamma da^2 \cdot (e^{AV-1} - e^{-AV-1})}{(e^{nV-1} - e^{-nV-1})} \dots (2)$

Unde differentia quantitatum (1) & (2) exprimit spatium quod percurrit punctum *A* ex actione vis acceleratricis quâ secundum *Ae* urgetur; si ergò vis illa dicatur  $\phi$ , erit (juxtà nomina art. 47. n. IV.) differentia quantitatum (1) & (2), multiplicata per  $\frac{b^2}{pp^2}$ , ad  $2a$ , ut  $\phi$  ad  $p$ ; quare cùm sit  $\frac{b^2}{pp^2} = \frac{b^2}{da^2}$ , erit . . . . .

$$(E) \dots \phi = \frac{pb^2}{2ada^2} \times \left[ \frac{\gamma da^2 \cdot (e^{AV-1} + e^{-AV-1})}{2} - \epsilon da^2 \times \frac{(e^{AV-1} - e^{-AV-1}) \cdot (e^{nV-1} + e^{-nV-1})}{2(e^{nV-1} - e^{-nV-1})} - \frac{\gamma da^2 (e^{AV-1} - e^{-AV-1})}{e^{nV-1} - e^{-nV-1}} \right].$$

L ij

## VI.

Si appelletur  $\pi$  vis acceleratrix secundum  $Ai$ , eodem præcisè ratiocinio inveniatur fore . . . . .

$$(F) \dots \pi = \frac{pb^2}{2ad^2} \times \left[ \frac{rd^2 (e^{AV-1} + e^{-AV-1})}{2} - \lambda d^2 \times \frac{(e^{AV-1} - e^{-AV-1}) \cdot (e^{uV-1} + e^{-uV-1})}{2(e^{uV-1} - e^{-uV-1})} + \frac{nd^2 \cdot (e^{AV-1} - e^{-AV-1})}{e^{uV-1} - e^{-uV-1}} \right].$$

## VII.

Jam verò, cum punctum  $A$  follicitetur secundum  $AP$ , vi  $= \frac{3S(e^{2uV-1} - e^{-2uV-1})}{4d^2V-1}$ , & hujus vires acceleratrices secundum  $Ae$ , &  $Ai$  sint  $\phi$  ac  $\pi$ , oportet (*not. (a) in art. 12. §. II.*) ut vis quæ exprimitur per  $\frac{3S}{d^2} \times \frac{e^{2uV-1} - e^{-2uV-1}}{4V-1} + \pi$ , secundum  $AP$  agens, sit in æquilibrio cum vi  $\phi$  secundum  $AO$  agente, & cum vi  $p$  quæ agit secundum  $AG$ . Quocirca vis ex his tribus resultans, debet esse ad superficiem Fluidi perpendicularis, hoc est, perpendicularis ad eam partem superficiæ superioris Fluidi, cujus  $iAe$  censenda est projectio in superficiem globi solidi. Quare (*art. 59, 60 & 61*) necesse est, 1°. Ut vis orta ex  $p$ , & ex  $\phi$  secundum  $AO$  agente, sit perpendicularis ad eam sectionem superficiæ.

cujus  $AO$  est projectio, & fit in plano  $AOR$ . 2°. Ut vis orta ex  $p$  & ex  $\pi + \frac{3S(c^{2uV-1} - c^{-2uV-1})}{4d^2V-1}$ , sit perpendicularis ad eam sectionem cujus  $PAi$  est projectio, & fit in plano  $APG$ . Unde nascentur sequentes æquationes;

$$(G) \dots \dots \frac{3S(c^{2uV-1} - c^{-2uV-1})}{4d^2V-1} + \pi = p \varphi$$

&

$$\varphi = \frac{p \cdot c \, da}{\frac{da(c^{uV-1} - c^{-uV-1})}{2V-1}} \text{ seu}$$

$$(H) \dots \dots \varphi = \frac{2peV-1}{c^{uV-1} - c^{-uV-1}}$$

VIII.

Assumantur nunc quatuor puncta  $A, B, C, D$ , (Fig. 22) sibi mutuò infinitè propinqua, quæ sita sint in circulis maximis  $PA, PB$ , & in circulis minimis  $BA, DC$ , qui istos normaliter secant; & ponatur, quòd, dum venit  $P$  in  $p$ , veniant puncta  $A, B, C, D$ , in  $a, b, c, d$ ; quantitas quâ decrefcit altitudo Fluidi in puncto quod verticaliter imminet ipsi  $A$ , erit (art. 46) æqualis ipsi

$$r \times \left( \frac{Cu - Ai}{AC} + \frac{Bo - Ae}{AB} + \frac{Ai \times d(\text{Sin. } PA) \cdot AC}{AC \cdot \text{Sin. } PA \cdot da} \right). \text{ Porro}$$

$$\text{est } \frac{Cu - Ai}{AC} = \frac{da \cdot r \cdot AC}{AC} = r \, da, \text{ \& } \frac{Bo - Ae}{AB} =$$

$$\frac{da \cdot (C \cdot AB \cdot 2V-1)}{AB(c^{uV-1} - c^{-uV-1})}. \text{ erit igitur } \dots \dots \dots$$

L iij;

$$(I) \dots \dots \dots \frac{(e^{AV-1} + e^{-AV-1})}{2} \times \frac{e da}{1} -$$

$$\frac{e da \cdot (e^{AV-1} - e^{-AV-1}) \cdot (e^{uV-1} + e^{-uV-1})}{2 \cdot (e^{uV-1} - e^{-uV-1})} = r da +$$

$$\frac{e da \cdot 2V-1}{e^{uV-1} - e^{-uV-1}} + q da \times \frac{d(e^{uV-1} - e^{-uV-1})}{du(e^{uV-1} - e^{-uV-1})}$$

## I X.

Hinc elici possunt æquationes omnes ad determinandum Fluidi motum necessariae. Nam si in æquationibus *G, H*, ponantur præ  $\phi$  &  $\pi$ , illarum valores ex æquationibus *E & F* dati, habebuntur cum æquatione *I* duæ aliae æquationes, in quibus non continebuntur nisi incognitæ  $q, n$ , &c. cum indeterminatis *A & u*, & earum differentiis.

## S C O L I U M I.

66. Difficile videtur ex hisce æquationibus quidquam eruere, unde motus Fluidi determinari possit. Id solum notandum est, quòd, si tenacitatis & adhærentiæ mutuae partium Fluidi ratio nulla habeatur, non possit simul fieri, ut solidum in quod Fluidi massa mutatur actione corporis *S*, sit accuratè Sphærois, quæ præ Axe habeat lineam, corpus *S* & centrum Terræ jungentem, & ut motus Fluidi fiat semper in plano per corpus *S* & centrum Terræ transeunte; nam, ut figura Fluidi Sphæroidalis sit, debet esse  $\sigma = 0$ , seu  $\frac{dh}{dA} = 0$ ; quia scilicet

plana omnia per Axem  $PG$  transeuntia, sectiones (ex hypothesi) similes & æquales producant; unde  $\sigma = 0$ , & ex æquatione  $H$ ,  $\phi = 0$ ; ergò ea pars motus Corpusculi  $A$ , quæ ad circulum verticalem  $AP$  perpendicularis est, totum suum habebit effectum, siquidem vis acceleratrix aut retardatrix in eo sensu agens, nulla omnino erit; proinde necessario corporis  $A$  motus totus non fiet in verticali plano  $AP$ .

## S C O L I U M II.

67. Eadem propositio sequenti ratiocinio confirmari potest. Supponatur in instanti quovis figuram Fluidi esse Sphæroidalem, & motum particulæ cujuslibet Fluidi, fieri in verticali respondenti. Particula igitur  $A$ , v. g. (Fig. 23) describet lineam  $Aa$ , dum pervenit  $P$  in  $p$ , & instanti sequenti conabitur describere lineam  $aa' = Aa$ . Hoc autem instanti, supponatur describere reverâ lineam  $aa$  in plano  $pa$ ; evidens est (siquidem velocitas  $aa'$  componitur ex  $aa$  &  $aa'$ ) velocitatem  $aa'$  debere esse talem, ut destruat; ergò (art. 60 & 61) vires acceleratrices representatæ per  $a'o$  &  $oa$ , debent separatim æquilibrium cum gravitate facere; porro, cum sectio à plano  $a'o$  facta, sit (hyp.) circularis, manifestum est vim acceleratricem  $a'o$ , non posse totam annihilari; unde aliquem necessario motum producer; qui quidem motus idem non erit pro diversis Fluidi particulis, siquidem in plano  $pPE$  erit nullus, & ex alterâ plani parte, in sensum contrarium efficietur. Ergò massa

Fluidi suam, si ita loqui fas est, Sphæroiditatem amittet, & motus particularum  $A$  non poterit fieri per duo consecutiva instantia, in plano verticali per corpus  $S$  transeunte.

Ex his sequitur non posse esse simul  $n = 0$  &  $\sigma = 0$ .

C O R O L L. I.

68. Si supponatur (Fluidi figuram non assumendo Sphæroidalem) puncta omnia Fluidi moveri in verticali respondente, hoc est, si fiat  $n = 0$ , ac proinde  $\gamma = 0$ ;

$\epsilon = 0$ , erit  $q = \frac{-4as\sqrt{-1} \cdot r}{b^2 (e^{A\sqrt{-1}} - e^{-A\sqrt{-1}})}$ ; igitur quantitates  $r$  &  $\lambda$  habebuntur differentiando quantitatem

$\frac{-4as\sqrt{-1}}{b^2 (e^{A\sqrt{-1}} - e^{-A\sqrt{-1}})}$ . Substituantur hi valores quantitatum  $r$  &  $\lambda$  in æquationibus  $F$  &  $I$ , & inde eruentur valores

quantitatum  $\frac{dr}{du}$  &  $\frac{d\lambda}{dA}$  (\*) in  $\rho$  &  $\sigma$ . Proinde si harum æquationum secunda integretur supponendo tantum  $u$  variabilem, tùm integretur prima, supponendo tantum

---

(\*) Per  $\frac{dr}{du}$  &  $\frac{d\lambda}{dA}$  intelligo coefficientes quos habent  $du$  &  $dA$  in differentiatione ipsius  $r$ . Generatim per  $\frac{dL}{du}$  &  $\frac{dL}{dA}$  in sequentibus intelligam coefficientes quos habent quantitates  $du$  &  $dA$  in differentiatione ipsius  $L$ , quam suppono esse functionem ipsarum  $A$  &  $u$ .

$A$  variabilem, & ponendo pro  $\frac{d\sigma}{dn}$  ejus valorem  $\frac{d\sigma'}{dA}$  (\*), quantitas  $\rho$  talis esse debet, ut valores ambo ipsius  $\sigma$ , ex his æquationibus nati, iidem sint; præterea cùm  $\rho du + \sigma dA$  debeat esse differentialis completa, oportet ut  $\frac{d\rho}{dA} = \frac{d\sigma}{dn}$ ; quare quantitas  $\rho$  huic etiam novæ conditioni debet satisfacere. Quænam autem sit quantitas  $\rho$  quæ hisce conditionibus satisfaciatur, aut etiam utrùm dari talis possit, fateor me hæcenus, seu per temporis, seu per Analyticos angustias, determinare non potuisse.

## C O R O L L. II.

69. Si jam fiat  $\sigma = 0$  (non supponendo  $n = 0$ ) hoc est, si figura Fluidi Sphæroidalis assumatur, non supponendo motum totum fieri in verticalibus per corpus  $S$  transeuntibus, invenientur pariter conditiones hujusmodi casus, sive possibiles sint, sive non: quod quidem determinare videtur maximè arduum.

## S C O L I U M III.

70. Ut ex æquationibus Problematis præcedentis eruantur, quantum fieri potest, venti velocitas, quæratum primum velocitas hujus in plano verticali quod per Astrum transit; atque, ut ad eam circumcirca determinandam

---

(a) Vide Comm. Acad. Petropol. T. 7. p. 177.

perveniat, tractentur primùm in omnibus æquationibus quantitates  $n, \gamma, \lambda, \epsilon, \sigma$  ut = 0, quia scilicet motus Fluidi solus in sensu plani verticalis consideratur; eritque

$$(G') \dots \frac{3S(c^{2nV-1} - c^{-2nV-1})}{4d^1 V^{-1}} + \frac{pb^2 dq \cdot (c^{AV-1} + c^{-AV-1})}{4n du}$$

$$= \frac{p dk}{du}; \&c$$

$$(I') \dots \frac{(c^{AV-1} + c^{-AV-1})}{2} \times \frac{dk}{du} = \frac{dq}{du} + q \times \frac{d(c^{nV-1} - c^{-nV-1})}{du(c^{nV-1} - c^{-nV-1})}. \text{ Unde, si tractetur } A \text{ ut constans,}$$

$$\&c \text{ fiat } \frac{2}{c^{AV-1} + c^{-AV-1}} - \frac{b^2}{2n} \times \frac{(c^{AV-1} + c^{-AV-1})}{2} = \lambda,$$

$$\&c \frac{2}{c^{AV-1} + c^{-AV-1}} = \frac{1}{F}; \text{ erit (integrationem incedo}$$

$$\text{ut in art. 47) } q = \frac{3S}{1p d^1} \times \frac{xz}{2\lambda + \frac{1}{F}}; \text{ seu } q = \frac{3Sxz}{1p d^1} \times$$

$$\frac{(c^{AV-1} + c^{-AV-1})}{2 \left[ 3 - \frac{b^2 \cdot (c^{AV-1} + c^{-AV-1})^2}{4n} \right]}; \&c \text{ } k = \frac{3Sxz}{2p d^1} + \frac{3Sxzbb'}{2p d^1 d^1} \times$$

$$\frac{(c^{AV-1} + c^{-AV-1})^2}{4 \left[ 3 - \frac{b^2 \cdot (c^{AV-1} + c^{-AV-1})^2}{4n} \right]} = \frac{3Sxz}{2p d^1} \times$$

$$\frac{3}{3 - \frac{b^2 \cdot (c^{AV-1} + c^{-AV-1})^2}{4n}}$$

## S C O L I U M I V.

71. Ex hisce valoribus ipsarum  $q$  &  $k$  manifestum est 1°. si fuerit angulus  $A$  infinite parvus, quo in casu

$$\frac{e^{AV-1} + e^{-AV-1}}{2} = 1, \text{ fore } q = \frac{3Szz}{p d^3} \times \frac{1}{3 - \frac{b^2}{a^2}}; \text{ \&}$$

$$k = \frac{2Szz \times 1a^2}{2p d^3 \times (3a^2 - bb)}; \text{ quod congruit cum } \textit{art. 47}.$$

2°. Si fuerit  $A = 90$  grad. hoc est, si quæratu-  
 ritas venti quando Astrum est in Meridiano, quo in casu

$$\frac{e^{AV-1} + e^{-AV-1}}{2} = 0 \text{ erit } q = 0, \text{ \& } k = \frac{3Szz}{2p d^3}; \text{ nem-}$$

pè, quando Sol est in Meridiano, velocitas venti in sensu Meridiani nulla esse debet, & aëris altitudo in quovis puncto Meridiani, eadem quæ foret (*art. 2 & 33*) si Astrum immotum maneret. Quod quidem alio ratiocinio satis accuratè confirmari potest. Nam cùm Sol aliquo tempore antè & post appulsu ad Meridianum, distantiam & altitudinem sensibilibiter non mutet respectu locorum in Meridiano sitorum, aër Meridiano incumbens in eodem ferè casu est, ac si Sol quiesceret; ergò eam debet figuram induere, & aliquo tempore conservare, quam haberet, si Sol reverà esset immorus.

## S C O L I U M V.

72. Jam verò definitis circumciscà quantitibus  $q$

&  $k$ , substituatur pro  $z$  ipsius valor  $\frac{e^{uV-1} - e^{-uV-1}}{2V-1}$ ; tùm

M ij

differentientur hæ quantitates, assumendo  $u$  &  $A$  variables; & ex differentiatione ipsius  $k$  habebitur quantitas  $\sigma$ ; unde per æquationem  $H$ , inveniatur  $\phi$ ; tùm ex æquatione  $I$  inveniatur  $\zeta$ ; quare cùm  $\zeta dA + \gamma du$  debeat esse differentialis completa, facilè habebitur  $\gamma$ , erit enim

$$\frac{d\zeta}{du} = \frac{d\gamma}{dA} : \text{unde } \gamma = \int dA \times \frac{d\zeta}{du}; \text{ proinde reperietur } u =$$

$\int \gamma du + \zeta dA$  (\*); ergò habebitur (circumcirca) velocitas venti in plano ad verticale Astri planum perpendiculari.

Ex hoc primo valore ipsius  $u$ , determinabuntur valores accuratiores quantitatum  $q$ , &  $k$ , assumendo  $A$  ut constans, quemadmodùm in priori operatione; tùm ex hisce novis ipsarum  $q$  &  $k$  valoribus emerget magis accuratus valor ipsius  $u$ , eàdem ratione quâ primus ipsius  $u$  valor ex prioribus  $q$  &  $k$  determinatus est.

#### S C O L I U M VI.

73. Ex præcedentibus patet, velocitatem venti (abstrahendo à tenacitate & frictione partium) nullam esse quando Astrum est in Meridiano, esse verò in Æquatore maximam; ac præterea sectiones Fluidi in plano Æquatoris & Meridiani, non esse Ellipses similes & æqua-

(\*) Posset etiam valor ipsius  $\zeta$  erui ex æquatione ( $E$ ), qui cùm sit diversus ab eo, quem suppeditat æquatio  $I$ , suspicio inde nasci potest, Problema varias pati solutiones. Quod quidem ex dicendis in articulo 74. abundè confirmabitur.

les ; proinde ut supponi possit , (quemadmodum in art. 47) propter tenacitatem partium eandem esse in locis omnibus ab Astro æquidistantibus velocitatem , & à Fluido indui figuram Sphæroidicam , nihil aliud fieri posse videtur , quàm ut velocitas venti & sectio Fluidi in verticali quovis , assumantur æquales velocitati & sectioni , quæ media est inter Æquatorem & Meridianum , hoc est , quæ respondet ipsi  $A = 45^\circ$ . Erit ergò , factâ

$$\frac{e^{AV-1} + e^{-AV-1}}{2} = V^{\frac{1}{2}} ; q = \frac{35zz}{4p^2d^3} \times \frac{1}{\sqrt{2} \times (3 - \frac{b^2}{2a^2})} ;$$

$$\& k = \frac{35zz}{4p^2d^3} \times \frac{3}{3 - \frac{b^2}{2a^2}} .$$

S C O L I U M VII.

74. Si querantur ipsarum  $q, n,$  &  $k$  valores , in locis propè Æquatorem sitis , hoc est , in locis ubi  $A$  est quantitas infinitè parva , adverteretur quantitates  $n, q, k,$  esse functiones ipsarum  $u$  &  $A$  tales , ut sit  $n = 0$  quando  $A = 0$  , &  $k, q,$  tunc sint functiones ipsius  $u$ . Quare si reducantur valores ipsarum  $n, k, q,$  in seriem infinitam , erit , quando  $A$  est infinitè parva ,

$$n = V \cdot A^n$$

$$q = V'' + V''' A^b$$

$$k = V^h + V^{\omega} A^{\pi}$$

designantibus  $V, V'', V''', V^h,$  &  $V^{\omega}$  functiones ipsius  $u,$  &  $n, h, \omega,$  exponentes positivos. Differentientur hæ

tres quantitates ut habeantur  $r, \lambda, \gamma, \epsilon, \sigma$ , & substituaturs pro  $\frac{e^{AV-1} + e^{-AV-1}}{2}$  ejus valor ferè = 1, & pro  $\frac{e^{AV-1} - e^{-AV-1}}{2V-1}$  ejus valor ferè =  $A$ , quando  $A = 0$ ; eritque, neglectis terminis omnibus qui negligi possunt,

$$(a) \dots \frac{3S}{4P d^{1V-1}} \times (e^{2uV-1} - e^{-2uV-1}) + \frac{b^2}{2a} \times \frac{dV''}{du} = \frac{dV''}{du}$$

$$(b) \dots \left[ \frac{b^2 dV''}{2a \cdot du} - \frac{nb^2}{2a} \times \frac{V(e^{uV-1} + e^{-uV-1}) \times 2V-1}{e^{uV-1} - e^{-uV-1}} \right] \times$$

$$A^n - \frac{bbV'' A \cdot 2V-1}{2a(e^{uV-1} - e^{-uV-1})} = \frac{2uV'' A^{n-1} V-1}{e^{uV-1} - e^{-uV-1}}$$

$$(c) \dots \dots \dots \frac{dV''}{du} = \frac{dV''}{du} + \frac{nV \cdot A^{n-1} \cdot 2V-1}{e^{uV-1} - e^{-uV-1}} + \frac{V'' d(e^{uV-1} - e^{-uV-1})}{dn(e^{uV-1} - e^{-uV-1})}$$

Notandum est me, in secundâ æquatione, quantitates  $A^{n-1}$  &  $A^n$  non neglexisse, quia scilicet, si supponatur  $m = 2$  &  $n = 1$ ; termini quos ingrediuntur hæ quantitates erunt homogenei termino . . . . .

$$\frac{-b^2 V'' A^{V-1}}{a(e^{uV-1} - e^{-uV-1})} : \text{ob eandem causam in æquatione (c)}$$

non neglexi terminum in quo est  $nA^{n-1}$ .

2<sup>o</sup>. Jam verò si vis, quâ Sol attrahit particulas Fluidi

propè *Æquator*em sitas, in duas alias resolvatur quarum una sit *Æquatori* parallela, altera perpendicularis, hæc posterior erit infinitè parva primi ordinis respectu prioris; ergò si aliquem effectum producat, supponi potest effectum producere, qui infinitè parvus sit primi ordinis respectu effectus quem vis altera producit; igitur si supponatur *A* infinitè parva primi ordinis, videtur quantitas *n* supponi posse ipsi *A* proportionalis, proinde  $V. A^n = V. A$ . Si quantitas *n* vel absolutè nulla sit, vel  $V. A^{''}$  (denotante *p* numerum positivum quemvis) tunc termini quos ingreditur *V*, ut nulli tractari debent; eo in casu, vis quæ in sensu Meridiani agit, talis erit, ut cum gravitate *p* æquilibrium faciat, quod quidem eveniet, si in æquatione (*b*) ponatur  $\omega = 2$ ; *V* ac  $\frac{dV}{du} = 0$ , &

$$2V^n = -\frac{bbV''}{2a}$$

1º. Si sit  $\omega = 2$ ,  $n = 1$ , ex æquationibus (*a*), (*c*), eruetur valor ipsius *V* in *u*, &  $V''$ , qui in æquatione (*b*) substitutus, dabit æquationem differentialem secundi ordinis, quæ continebit incognitas  $V''$  &  $V^n$ . Unde Problematis solutio varia erit pro variis valoribus qui alterutri quantitatum  $V''$  aut  $V^n$  assignabuntur.

2º. Si sit  $\omega = 2$ ,  $V = 0$ , habebuntur prò  $V''$  &  $V^n$  iidem valores ac in *art.* 47; prætereaque erit  $V^n = -\frac{b^2 V''}{4a}$ .

Determinabuntur eodem modo valores ipsarum  $V''$ ,

$V^n$ , pro diversis hypothesibus de exponentibus  $m$  ac  $n$ , & de quantitatibus  $V$  &  $V^n$ . Atque hinc patet Problema de inveniendâ venti directione ac velocitate aliquid in se indeterminati habere: quod quidem omninò paradoxum videri non debet, si quidem in aliis hypothesibus, de quibus mentio jam facta est (art. 39 & 50) inventæ sunt pro velocitate venti expressiones quæ constantes indeterminatas continent, & quibus indicatur, Problema varias habere posse solutiones.

Cœterùm studiosè animadvertendum est, in locis propè Æquatorem sitis, angulum  $A$  pro infinitè parvo haberi non debere per tempus totum unius revolutionis. Nam v. g. quando Astrum est in Meridiano loci propè Æquatorem siri, angulus  $A$ , qui tunc est angulus Meridiani cum Æquatore, fit 90 graduum. Puncta Æquatoris sola sunt, in quibus sit exactè  $A = 0$ ; quia  $A$  exprimit semper angulum verticalis cum Æquatore; atque hinc concludi potest, in valore ipsius  $q$ , qui in articulo 70 determinatus est, quantitatem  $\frac{e^{AV-1} + e^{-AV-1}}{2}$  semper positivè assumi debere; nam in Æquatore, ubi est  $A = 0$ , est necessariò semper  $\frac{e^{AV-1} + e^{-AV-1}}{2} = 1$ ; unde in locis propè Æquatorem sitis, quorum motus idem ferè esse debet ac motus punctorum Æquatoris, debet assumi  $\frac{e^{AV-1} + e^{-AV-1}}{2}$  positivè. Ergò &c.

SCOLIUM

## SCOLIUM GENERALE.

75. Si ergò quærat<sup>r</sup> velocitas ac directio venti, ponendo terrestrem globum circumambi aëre homogeneo, raro & non elastico, hæc sequentem in modum determinanda est.

1°. Si adhærentiæ partium & friccionis nulla ratio habeatur, solutio alia non potest dari, nisi quæ in *articulis* 70, 71, & 72 exhibita est, æquationem nempe Problematis, per approximationes resolvendo.

2°. Si habeatur ratio tenacitatis & friccionis (qui ultimus casus naturæ forsan magis congruus est); tunc præ locis juxtâ Æquatorem sitis adhiberi potest expressio quæ in *art.* 47. fuit determinata, & omninò negligi posse videtur (ob rationes in *cod. art.* 47. jam allatas) velocitas venti in plano quod perpendicularare sit ad planum Astri verticale: si præterea in hâc hypothesi supponatur talis esse partium cohærentia, ut loca omnia ab Astro æqualiter distantia eandem velocitatem habeant, utque Fluidum habeat formam Sphæroidis; tunc assumendæ sunt expressiones quæ in *art.* 73. datæ sunt.

Fateor me plurimùm dubitare, utrùm circà velocitatem venti certius aliquid statui possit.

Hæc omnia locum habere debent, quandò corpus S Æquatorem percurrit. Si verò non Æquatorem, sed parallelum describeret, tunc magis compositæ evaderent æquationes quibus motus Fluidi determinaretur; & ad *art.* 42: recurrendum foret ut haberetur expressio actionis cor-

poris  $S$ : tamen cùm directio venti non multùm deviare debeat à plano Astri verticali, parùm mutari debere videtur in solutionibus quæ jam exhibitæ sunt, nec multùm à vero aberratum iri putamus, si parallelus ille Æquatoris loco habeatur, nempè si  $A$  sit semper angulus quem facit verticale cum parallelo, &  $b$  sit proportionalis velocitati corporis  $S$  in parallelo, quæ quidem est ad velocitatem in Æquatore, ut Cofinus declinationis ad Sinum totum.

PROPOS. XIV. LEMMA.

76. Sit globus solidus PDE (Fig. 24) Fluido EKkPE coopertus, cujus pars VSPE densitatis sit data & uniformis, pars verò VSkk componatur ex infinitis numero superficiebus Ll, Ii, Kk, densitate à se invicem differentiibus: supponatur Fluidi hujus mixti altitudo EK respectu radii CE admodùm parva; tendant versùs centrum C puncta omnia Fluidi vi =  $p$ , & præterea perpendiculariter ad radium sollicitentur, vi quæ pro diversis à superficie PDE distantis & densitatibus diversa sit, nempè, puncta omnia in columnâ homogeneâ NA, vi =  $\omega$ ; puncta Fluidi in lineâ infinitè parva NO, vi =  $\omega'$  &c. sicque continuò usque ad punctum R superficiæ extimæ Kk, cujus vis sollicitatrix sit  $\omega''$ ; quaritur quenam sint conditiones necessariae, ut Fluidum illud in æquilibrio sit.

1°. Liquet vim ex  $\omega''$  &  $p$  resultantem, esse debere ad superficiem Rr perpendicularem; unde est  $(Dr - AR) \times p = AD \times \omega''$ . 2°. Si vocetur  $\delta$  densitas Fluidi

homogenei  $NnDA$ ,  $\delta'$  densitas Fluidi immediatè huic incumbentis, quæque à  $\delta$  maximè diversa supponitur; facile apparet vim particulæ  $Nn$  secundùm  $Nn$  (quatenùs ad Fluidum inferius pertinet) fore  $[p \times (NA - Dn) - \omega \times AD] \times \delta$ ; eodemque ratiocinio probari potest, vim ejusdem particulæ  $Nn$ , secundùm  $Nn$ , (quatenùs ad Fluidum superius & immediatè incumbens pertinet) esse  $[p \times (NA - Dn) - \omega' \times AD] \times \delta'$ . Porrò vires illæ debent esse sibi mutuò æquales, aliter Fluida ambo diversarum densitatum  $\delta, \delta'$ , quæ sibi mutuò superficie  $VNS$  sunt vicina, æquilibrium servare non possent. Erit ergò:

$$(\delta p - \delta' p) \times (NA - Dn) = (\omega \delta - \omega' \delta') \times AD.$$

3°. Ex æquilibrîi Fluidorum legibus, partes Fluidi contentæ in spatio quovis  $QqnN$  comprehenso à duabus columnis verticalibus  $NQ, nq$ , & à particulis superficialium  $Nn, Qq$ , sibi mutuò debent æquipollere. Unde pondus columnæ  $qn$ , detracto pondere columnæ  $QN$ , æquari debet vi particulæ  $Qq$  secundùm  $Qq$ , detractâ vi particulæ  $Nn$  secundùm  $Nn$ .

PROPOS. XV. PROBLEMA.

77. *Iisdem positis ac in Lemmate præcedenti, quæritur quinam in Fluido mixto EK kP, oriri debeat motus, ex actione corporis S, in circuli maximi plano circa globum moti.*

Eâdem hic nitemur hypothefi ac in art. 47. nempè, assumemus omnes Fluidi partes semper moveri in plano  $Nij$

nis verticalium per corpus  $S$  transeuntium, & Sphæroidicam esse Fluidi figuram. In articulo autem 57. probavimus, posito Fluido  $EKkP$ , homogæneo, & rarissimo, superficiem  $KRk$  esse semper Ellipsim, & punctorum Fluidi in quavis superficie Terræ concentricâ sitorum, velocitatem horizontalem esse ut quadratum Sinûs eorum distantia à corpore  $S$ ; quæ ambo hîc etiam probè se calculis accommodare, mox videbimus. Quare hîc rursùm supponemus, superficies omnes  $Kk$ ,  $Ii$ ,  $Ll$ , &c. quæ puncta ejusdem densitatis conjungunt, esse Ellipses inter se diversas, & punctorum unius cujusque superficiæ velocitatem proportionalem esse quadrato Sinûs distantia à corpore  $S$ .

## I.

Sit ergò  $PS = s$ ;  $Si = x$ ;  $PA = u$ ;  $AN = s - \frac{\alpha(c^{uV-1} - c^{-uV-1})^2}{-4}$ ; spatium à puncto  $A$  seu  $N$  horizontaliter descriptum, (dùm corpus  $S$  describit  $Pp = du$ ) =  $\frac{mdu(c^{uV-1} - c^{-uV-1})^2}{-4}$ ; spatium intereà à puncto  $N$  descriptum, (quatenùs pertinet ad Fluidum.  $LlSV$ ) =  $\frac{\mu du(c^{uV-1} - c^{-uV-1})^2}{-4}$  (designantibus  $\alpha$ ,  $m$ ,  $\mu$ , constantibus incognitis); spatium à puncto quocumque  $Q$  horizontaliter descriptum eodem tempore =  $\frac{Xdu(c^{uV-1} - c^{-uV-1})^2}{-4}$ , designante  $X$  functionem inco-

gnitam ipsius  $x$ ;  $NQ = x - \frac{\xi(e^{uV-1} - e^{-uV-1})^2}{-4}$ , designante pariter  $\xi$  functionem incognitam ipsius  $x$ ; tandem sit  $D$  densitas superficiei cujuslibet  $QI$ , quæ quidem per functionem ipsius  $x$  dari debet, saltem quàm proximè.

II.

His positis, cùm omnia columnæ homogenæ  $NA$  puncta, eandem habeant velocitatem horizontalem secundum  $AD$ , erit  $\frac{2adu}{4V-1} \times (e^{2uV-1} - e^{-2uV-1}) = \frac{2mdu}{4V-1} \times (e^{2uV-1} - e^{-2uV-1}) + \frac{mdu(e^{2uV-1} - e^{-2uV-1})}{4V-1}$ , quæ æquatio respondet æquationi (A) art. 47. Unde exurgit  $2a = 3m$  . . . . . (M).

Pariter, cùm sit,  $QO = dx - \frac{d\xi(e^{uV-1} - e^{-uV-1})^2}{-4}$ , & columnæ infinitæ parvæ  $QO$  puncta omnia eandem habere debeant velocitatem horizontalem, erit  $\frac{2d\xi}{dx} = 3X$  . . . . . (N).

III.

Attractio quam exercet in punctum  $N$  Fluidum  $VEPS$  densitatis  $\delta$ , est (art. 24)  $\frac{4u\delta \times 6a}{3 \times 5} \times \frac{(e^{2uV-1} - e^{-2uV-1})}{4V-1}$ , quatenus agit perpendiculariter ad  $CN$ ; attractionis superioris Fluidi  $VKkS$  nullam rationem habebimus, ut  
N iij

potè, quod respectu Fluidi *VEPS*, admodum rarum supponitur.

Vis acceleratrix puncti *N*, parallela ad *AD*, quatenus ad Fluidum inferius densitatis  $\delta$  pertinet, erit

$$\frac{pbb \times 2m (c^{2uV-1} - c^{-2uV-1})}{2a \cdot 4V-1};$$

quatenus verò hoc punctum

$$\text{pertinet ad Fluidum superius densitatis } \delta', \text{ erit hujus vis} = \frac{pbb}{2a} \times \frac{2\mu (c^{2uV-1} - c^{-2uV-1})}{4V-1};$$

$$\text{jam verò punctum illud } N \text{ secundum } AP \text{ follicitatur vi} = \frac{2S (c^{2uV-1} - c^{-2uV-1})}{4d^2 V-1};$$

oportet ergò ut punctum *N* in æquilibrio permaneat,

$$\text{follicitatum à viribus } p, \text{ \& } \left( \frac{3S}{d^2} + \frac{4n\delta \cdot 6a}{3 \times 5} + \frac{pbb}{2a} \times 2m \right) \times$$

$$\left( \frac{c^{2uV-1} - c^{-2uV-1}}{4V-1} \right), \text{ sibi invicem perpendicularibus,}$$

$$\text{ut \& follicitatum à viribus } \left( \frac{3S}{d^2} + \frac{4n\delta \times 6a}{3 \times 5} + \frac{pbb \cdot 2m}{2a} \right) \times$$

$$\left( \frac{c^{2uV-1} - c^{-2uV-1}}{4V-1} \right). \text{ Quamobrem (art. 76 n. 2) erit}$$

$$\left( \frac{m^2 p}{a} + \frac{4n\delta \cdot 6a}{3 \times 5} + \frac{3S}{d^2} \right) \times \delta - p : 2a\delta = \left( \frac{m^2 p}{a} + \right.$$

$$\left. \frac{4n\delta \cdot 6a}{3 \cdot 5} + \frac{3S}{4p} \right) \times \delta' - 2pa\delta' \dots \dots \dots (0).$$

#### I V.

Jam verò excessus ponderis *QN* suprà *qn* est  $2p \times \int \frac{Dd\xi (c^{2uV-1} - c^{-2uV-1})}{4V-1}$ , qui æqualis esse debet

(art. 76 n. 3) excessui ponderis ipsius  $Nn$  suprâ  $Qq$ , hoc est  $(\frac{\mu b^2 p}{a} + \frac{4n\delta \cdot 6a}{3 \cdot 5} (*) + \frac{3S}{d^2} - 2pa) \times \delta' \times \frac{e^{2uV-1} - e^{-2uV-1}}{4V-1}$ , detractâ quantitate  $[\frac{b^2 p X D}{a} +$

$$\frac{4n\delta \cdot 6a D}{3 \cdot 5} + \frac{3S \cdot D}{d^2} - 2pD \cdot (\xi + a)] \times \frac{e^{2uV-1} - e^{-2uV-1}}{4V-1}.$$

$$\text{Erit ergò } 2p\delta D d\xi = \frac{\mu \delta' p b^2}{a} + \frac{4n\delta' \delta \cdot 6a}{3 \cdot 5} + \frac{3S \delta'}{d^2} -$$

$$2pa\delta' - \frac{b^2 p X D}{a} - \frac{4n\delta \cdot D \cdot 6a}{3 \cdot 5} - \frac{3S \cdot D}{d^2} + 2pD \times (\xi + a) \dots \dots (P).$$

V.

Tandem si supponatur, quòd factâ  $x = Pk$ , sit  $D = \delta$ ,  $X = A$ ,  $\xi = \chi$ ; erit vis acceleratrix puncti  $R = \frac{p b^2 \chi \cdot (e^{2uV-1} - e^{-2uV-1})}{4uV-1}$ ; necesse autem est

(art. 76. n. 1) ut punctum  $R$  sollicitatum à viribus  $p$  &  $(\frac{p b^2 \chi}{a} + \frac{1S}{d^2} + \frac{4n\delta \cdot 6a}{3 \cdot 5}) \times \frac{e^{2uV-1} - e^{-2uV-1}}{4V-1}$  sibi invi-

cem normalibus, tendat perpendiculariter ad  $Rr$ , sive, ut pondus partis  $Rr$ , ab hisce viribus sollicitatæ, nul-

lum sit. Quate erit  $\frac{b^2 p A}{a} + \frac{4n\delta \cdot 6a}{3 \cdot 5} + \frac{3S\delta}{d^2} - 2p\delta$   
 $(\chi + a) = 0 \dots \dots (Q).$

(\*) Cùm sit, ex hypothesi,  $RN$  admodum parva respectu  $CN$ , supponi potest Attractionem in  $R, Q, O$ , eandem esse ac in  $N$ .

## VI.

Ex quinque æquationibus  $M, N, O, P, Q$ , deduci potest, suppositis integrationibus & quadraturis, Problematis nostri solutio. Nam si in æquatione  $P$ , pro  $X$  substituatur ejus valor  $\frac{z d\xi}{3 dx}$  ex æquatione  $N$ , tùm differentietur æquatio  $P$ , fiatque  $\xi + a - \frac{4nd \cdot 6a}{3 \cdot 5 \cdot 2p} - \frac{3s}{2pd^2} = \xi$ , erit  $3\varrho - \frac{bbdd\xi}{addx} - \frac{Dbbdd\xi}{addx dD} = 0 \dots \dots (R)$ .

Hæc æquatione integratâ, quod, saltem in quibusdam casibus, fieri potest, nascentur constantes duæ indeterminatæ, v. g.  $F, G$ , ex quibus ipsius  $\xi$  valor obtinebitur, qui quidem talis esse debet, ut sit  $= 0$  quandò  $x = 0$ ; unde habebitur una æquatio pro determinandâ  $F$  aut  $G$ , quarum quantitarum proinde una eliminari potest. Jam verò cùm detur  $\xi$ , datur etiam 1°.  $X = \frac{z d\xi}{3 dx}$ , 2°. datur  $\mu$ , siquidem  $\mu$  est valor ipsius  $X$  quando  $x = 0$ . 3°. Dantur  $A$  &  $\chi$ , siquidem  $A$  &  $\chi$  sunt valores ipsarum  $X$  &  $\xi$ , quando  $x = Pk = \epsilon$ . Unde, si in æquationibus  $M, O, Q$ , substituantur prò his quantitatibus earum valores in  $G$ , vel  $F$ , restabunt tantùm determinandæ tres incognitæ  $a, m$ , &  $G$  vel  $F$ , quæ ex tribus æquationibus  $M, O, Q$ , poterunt definiri.

## S C O L I U M I.

78. Integratio æquationis  $(R)$  multùm pendet à valore

lore

lore quantitatis  $D$ , hoc est, à lege densitatum Fluidi  $V K k S$ .

Si, v. g. juxtà opinionem communem, ponamus  $\frac{dD}{D} = \frac{-dx}{g}$ , hoc est densitates esse in ratione ponderum comprimentium, æquatio  $R$  mutabitur in hanc

$$\frac{3 a \xi dx^2}{b b g} + d d \xi - \frac{d \xi dx}{g} = 0.$$

Ut hæc integretur, fiat  $\frac{d \xi}{\xi} = \frac{p dx}{b h}$  ( $h h$  est constans arbitraria); critque

$$dx = \frac{-d p \cdot h h}{p p - \frac{p h h}{g} + \frac{3 a h^4}{b b g}} \dots \dots \dots (S)$$

$$\& \frac{d \xi}{\xi} = \frac{-p d p}{p p - \frac{p h h}{g} + \frac{3 a h^4}{b b g}} \dots \dots \dots (T)$$

Integretur utraque hæc æquatio per Logarithmos, uti Geometris notum est; & si fiat  $M = \frac{h h}{2 \sqrt{[\frac{h^4}{4 g g} - \frac{3 a h^4}{b b g}]}}$

$$N = \frac{-h h}{2 g} + \sqrt{[\frac{h^4}{4 g g} + \frac{3 a h^4}{b b g}]}; T = \frac{-h h}{2 g} - \sqrt{[\frac{h^4}{4 g g} - \frac{3 a h^4}{b b g}]};$$

&  $R$  = valori ipsius  $p$  quandò  $x = 0$ , erit  $\dots \dots \dots$

$$(T) \dots \dots \dots x = M \times \log. \left[ \frac{(p+N) \cdot (R+T)}{(p+T) \cdot (R+N)} \right];$$

$$\& \frac{\xi + a \left( 1 - \frac{4 n d \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 5 p} \right) - \frac{3 S}{2 p d^3}}{a \left( 1 - \frac{4 n d \cdot 6}{3 \cdot 5 \cdot 2 p} \right) - \frac{3 S}{2 p d^3}} = \frac{\sqrt{[R R - \frac{R h h}{g} + \frac{3 a h^4}{b b g}]}}{\sqrt{[p p - \frac{p h h}{g} + \frac{3 a h^4}{b b g}]}} \times$$

O

$$\left[ \frac{(p+N) \cdot (R+T)}{(p+T) \cdot (R+N)} \right]^{\frac{M}{2g}} \dots \dots \dots (V)$$

Substituatur in hâc ultimâ æquatione, præ  $p$ , ejus valor in  $x$ , ab æquatione  $T$  suppeditandus, tum assumatur,

1<sup>o</sup>. valor ipsius  $X = \frac{2d\xi}{3dx}$ . 2<sup>o</sup>. valor ipsius  $\mu$ , ponendo

0 præ  $x$  in valore ipsius  $X$ ; 3<sup>o</sup>. valor ipsarum  $A$  &  $\chi$ , substituendo præ  $x$  in valore ipsarum  $X$  &  $\xi$  quantitatem  $\epsilon$ , seu quod eodem ferè recidit, altitudinem  $\epsilon$  quam haberet Fluidum, si nullæ in illud vires agerent. Tandem hi valores ipsarum  $u$ ,  $A$ , &  $\chi$  in æquationibus  $M$ ,  $O$ ,  $Q$ , substituuntur; & restabunt ab iis æquationibus eruendæ tres incognitæ  $a$ ,  $R$ ,  $m$ , quibus definitis, valores ipsarum  $\mu$ ,  $A$  &  $\chi$  obtinebuntur.

## SCOLIUM II.

79. Fieri potest 1<sup>o</sup>. Ut sit  $\frac{1}{4g} = \frac{1^a}{b^2}$  quo in casu æquatio ( $S$ ) est absolutè integrabilis, æquatio verò ( $T$ ) partim integrabilis absolutè, partim ad Logarithmos reducibilis. 2<sup>o</sup>. Ut sit  $\frac{1}{4g} < \frac{1^a}{b^2}$ ; quo in casu sunt  $N$  &  $T$  quantitates imaginariæ, & integratio ad circulares arcus partim reducitur. Potest tamen solutio præcedens ut generalis haberi, sive  $N$  &  $T$  reales sint, sive non: quia quantitates imaginariæ eliminari semper possunt. Certum est enim quantitatem Algebraicam quamlibet, utcumque ex imaginariis constatam, semper ad  $A + B \sqrt{-1}$  re-

duci posse, existentibus  $A$  &  $B$  quantitibus realibus; unde si quantitas proposita realis sit, fiet  $B=0$ .

(\*) Quod ut demonstretur, notandum est,

1°. Esse  $\frac{a+b\sqrt{-1}}{g+h\sqrt{-1}} = A + B\sqrt{-1}$ ; siquidem erit

$$a = gA - hB; b = Ah + gB; \text{ unde } A = \frac{bh + ag}{hh + gg};$$

$$\& B = \frac{bg - ah}{hh + gg}.$$

2°. Esse  $(a + b\sqrt{-1})^{g+h\sqrt{-1}} = A + B\sqrt{-1}$ .  
Nam factis  $A$  &  $B$ , ut  $a$  &  $b$ , variabilibus, assumantur differentiales Logarithmicæ, eritque  $(g + h\sqrt{-1}) \times$

$$\frac{da + db\sqrt{-1}}{a + b\sqrt{-1}} = \frac{dA + dB\sqrt{-1}}{A + B\sqrt{-1}}; \text{ seu (n. 1. art. huj.)}$$

$$\frac{A dA + B dB + (B dA - A dB) \sqrt{-1}}{AA + BB} =$$

$$\frac{g a d a + g b d b + a h d b - b h d a}{a a + b b} +$$

$$\frac{(h a d a + h b d b + g b d a - g a d b) \times \sqrt{-1}}{a a + b b};$$

$$\text{unde } AA + BB = [aa + bb]^g \times c^{-hf} \frac{bda - adb}{aa + bb}$$

$$\& f \frac{B dA - A dB}{AA + BB} = h \log. V[aa + bb] + g f \frac{bda - adb}{aa + bb}.$$

Porrò sunt  $f \frac{bda - adb}{aa + bb}$ , &  $f \frac{B dA - A dB}{AA + BB}$  anguli quorum  $\frac{a}{b}$

&  $\frac{A}{B}$  sunt tangentes; unde  $A$  &  $B$  sunt Sinus & Cofinus

O ij

anguli cujus radius =  $\sqrt{[aa + bb] \times c} - b \sqrt{\frac{bda - adb}{aa + bb}}$ ,

valor verò =  $h \log. \sqrt{[aa + bb]} + g \sqrt{\frac{bda - adb}{aa + bb}}$ .

3°. Palam est fore  $a + b\sqrt{-1} + (g + h\sqrt{-1}) = A + B\sqrt{-1}$ ; &  $(a + b\sqrt{-1}) \times (g + h\sqrt{-1}) = A + B\sqrt{-1}$ .

4°. Ex his tribus propositionibus facile semper erit quantitatem utcumque ex imaginariis constatam, reducere ad  $A + B\sqrt{-1}$ ; nam, procedendo à dextrâ versùs sinistram, paulatim quantitates omnes imaginariæ, si plures sint, exterminabuntur, unâ exceptâ, & reducta erit quantitas proposita ad  $A + B\sqrt{-1}$ ; quæ si realis esse debeat, erit  $B = 0$ .

### SCOLIUM III.

80. Æquatio  $\frac{g dg dx^2}{bbg} + ddg - \frac{dgd x}{g} = 0$  aliâ methodo integrari potuisset, quam hic obiter proponam, utpote quæ ad incrementum Analyseos possit conducere. Sit nempe generatim . . . . .

$$g + \frac{dgd}{dx} + \frac{fddg}{dx^2} = 0 \dots \dots \dots (1)$$

Supponi semper potest, introductâ novâ indeterminatâ  $r$ ; æquationem illam oriri ex duabus sequentibus . . . . .

$$dg - r dx = 0 \dots \dots \dots (2)$$

$$g + \frac{dgd}{dx} + \frac{fdr}{dx} = 0 \dots \dots \dots (3)$$

nam factâ  $d\varrho = r dx$ , æquatio (1) in (3) abir.

Jam multiplicetur harum æquationum prima (2) per coefficientem indeterminatam  $v$ , tùm addantur simul æquationes (2) & (3) eritque  $v d\varrho + s d\varrho + f dt + \varrho dx - v r dx = 0$  seu . . . . .

$$[v + s] \cdot d\varrho + f dt + [\varrho - vt] \cdot dx = 0 \dots (4)$$

Supponatur  $v$  talis, ut  $\varrho - vt$  sit in ratione datâ quâlibet ad  $[v + s] \cdot \varrho + ft$ ; erit  $\frac{1}{v+s} = \frac{-s}{f}$ ; unde habebitur

$$\text{valor ipsius } v, \text{ \& æquatio (4) fiet } dx + \frac{(d\varrho - vt) \cdot (v + s)}{f - vt} = 0.$$

Quare erit  $\varrho - vt = X$ , denotante  $X$  functionem ipsius

$$X, \text{ proinde } t = \frac{\varrho - X}{v}; \text{ \& æquatio (2) fiet } d\varrho - \frac{\varrho dx}{v} +$$

$$\frac{X dx}{v} = 0; \text{ cujus facilis est integratio: unde obtinetur quæ}$$

sita  $\varrho$ :

Methodus ista, quam hîc per transcendannam & currens offero, valdè utilis est in integrandis  $n$  quolibet æquationibus differentialibus, singulis cujusvis gradûs, quæ contineant  $n + 1$  variables,  $x, y, z, u$ , &c. quarum primæ differentia  $dx$  assumatur constans: cæteræ verò  $u, y, z$ , &c. cum suis differentialibus cujusvis gradûs, sub formâ tantùm lineari appareant, nempè, nec ad potestatem ullam unitate majorem, aut minorem, evectæ; nec per se invicem aut per  $x$  multiplicatæ, sed tantùm per constantes, & per ipsius  $dx$  convenientes potentias multiplicatæ aut divisæ; nec integrationi nocet si in om-

nibus hifce æquationibus fupponatur effe terminus totus ex  $x$  &  $dx$ , & constantibus utcumque conflatus.

## S C O L I U M IV.

81. Æquatio  $\frac{-dx}{g} = \frac{dD}{D}$ ; quam prò exemplo affumpsimus, ex eâ hypothefi nascitur, quòd partium Fluidi denfitas fit ponderi incumbenti proportionalis. Nam fit  $y$  altitudo Fluidi à superficie superiore ad punctum quodvis, denfitasque in hoc puncto  $= D$ ; erit  $\int D dy$  massa Fluidi incumbentis, &  $p \int D dy$  hujus pondus. Porrò affumptâ  $D dy$  constante, erit  $dy$  ut  $\frac{1}{D}$ , & ut  $\frac{1}{p \int D dy}$ ; quare est  $\int D dy$  ut  $D$  &  $\frac{dD}{D}$  ut  $dy$ , hòc est  $\frac{dD}{D} = \frac{-dx}{g}$  quia  $dx = -dy$ . Hæc autem hypothefis aliquid in fe contradictorii continet, quòd nempè tunc effe debeat altitudo Fluidi  $= \infty$ , & in superficie superiore denfitas  $= 0$ .

Sed notandum, æquationem  $\frac{-dx}{g} = \frac{dD}{D}$ , locum etiam in alio casu habere, in quo potest effe finita altitudo Fluidi, & denfitas data in superficie superiore, nempè; si fupponatur denfitas partium proportionalis ponderi comprimenti, addito pondere constante quovis. Tunc enim erit, factò pondere constante  $P$ ,  $\frac{1}{D}$  ut  $\frac{x}{p \int D dy + P}$ ; proinde  $\frac{dD}{D} = \frac{-dx}{g}$ ; hæc autem hypothefis à vèro multò

minùs aberrat quàm altera : nam particulæ aëris, etiam pondere nullo incumbente, non possunt non aliquam habere densitatem. Quare densitas nequit esse ita proportionalis ponderi incumbenti, ut, nullo evadente hoc pondere, nulla sit densitas.

S C O L I U M V.

82. Sit generatim  $\frac{dD}{D} = Xdx$ , denotante  $X$  functionem ipsius  $x$  quamlibet, æquatio ( $R$ ) mutabitur in sequentem, factâ (juxtâ perinsignis Geometræ  $D. Euler$  Methodum)  $\rho = c^{\int k dx}$  . . . . .  
 $\frac{3 \rho X dx^2}{bb} - k X dx - dk - k k dx = 0.$

Casus autem in quibus hæc æquatio integrabilis est, hinc percurrere nimis longum foret, præterquàm quòd casus illi, propter nonnullas coefficientium æquationes, non parùm sunt limitati.

S C O L I U M VI.

83. Cùm in figurâ aëris mutationem quàm parvam producat actio Solis & Lunæ, evidens est particulas aëris ab hâc actione densitatem sensibilibiter non mutare, proinde licet densitas earum à pondere superincumbente oriatur, sitque in eâdem particulâ variabilis, tamen prò constante & invariabili assumi posse cujusque partis densita-

tem. Unde si fit  $x'$  altitudo unius superficiei internæ æëris in statu Sphærico, & queratur quænam esse debeat in Problemate præfente hujus altitudo  $x$ , ponatur  $x'$  pro  $x$  in valore ipsius  $\xi$ , tùm fiat  $fD dx' \times 2nrr = fD dx \times 2nrr - fD d\xi \times \frac{2nr^2}{3}$ ; erit  $fD dx = fD dx' + f\frac{Dd\xi}{3}$ , &  $dx = dx' + \frac{d\xi}{3}$ : proinde  $x = x' + \frac{\xi}{3}$ .

## S C O L I U M VII:

84. Huc usque expressionem tantùm dedimus velocitatis venti, qui propè Æquatorem flare supponitur. Ut autem inveniatur ejus velocitas in locis ab Æquatore distitis, tunc  $Pp$  non potest supponi  $= du$ ; sed tractando  $A$  ut constantem, facilè habebuntur æquationes ad hunc casum pertinentes, quemadmodùm in *art.* 70; quæ quidem hic longiùs exponere necessarium non videtur, siquidem nulla nova variabilis in calculum introducitur.

At notandum tales fore valores ipsarum  $a$ ,  $m$ ,  $\mu$ ,  $\xi$  &  $X$ , &c. ut Fluidum Sphæroiditatem suam amittere debeat, quæ tamen necessaria est ut Attractio supponi possit  $\frac{4n\delta \times 6a}{3 \cdot 5}$ . Quare, ut vero proximior fiat calculus, instituatür primùm Analysis nullâ Attractionis ratione habitâ, tum in quantitate  $\frac{4n\delta \cdot 6a}{3 \cdot 5}$  loco  $a$  ponatur ejus valor medius, valor nempe qui angulo  $A = 45^\circ$  respondere invenietur, & Analysis de novo instituatür. Nihil accuratius

ratus videtur permittere, tam arduæ tamque intricatæ quæstionis difficultas (a).

S C O L I U M VIII.

85. Casus omnes complectit Problema præcedens. Nam si v. g. Fluidi inferioris nulla censeatur Attractio, & nullum supponatur Fluidum istud, tunc deleri debent æquationes *M, O*, ut & quantitates *m, a, n*, in aliis æquationibus; & habebitur motus Fluidi rari & variabiliter densi, globo terrestri immediatè incumbentis.

Unde facile erit dignoscere, quodnam sit inter motum aëris discrimen, dum à terrestri globo separatur per Fluidum aliud, & dum globo terrestri immediatè contiguus est.

De quibus ut leve calculi specimen offeramus, supponemus globum terrestrem coopertum esse duobus Fluidis homogeneis sibi invicem incumbentibus, & ejus raritatis, ut possit attractionis nulla ratio haberi. Sint  $\delta$  &  $\delta'$  densitates Fluidi inferioris & superioris: jam si sit  $s$  altitudo Fluidi inferioris in *P*,  $s'$  altitudo superioris, erit  $2\alpha = 3ms$ ;  $2\chi = 3\mu s'$ ; ubi notandum est hîc esse  $\chi$  constantem, quæ respondet quantitati  $\xi$  *articuli 77*. Præterea erit . . . . .

$$\left(\frac{mbbp}{a} + \frac{3s}{d} - 2p\alpha\right) \times \delta = \left(\frac{\mu b b p}{a} + \frac{3s'}{d'} - 2p\alpha\right) \times \delta'$$

(a) Vide additamentum, *art. IV.*

&  $\frac{bb'd'\mu}{a} + \frac{3s'd'}{d^3} - 2p\chi d' - 2pa d' = 0$ . Unde,  
facto calculo, elicitur . . . . .

$$m = \frac{\frac{3s}{p d^3} \times (3\epsilon' - \frac{3\epsilon'd'}{d} - \frac{bb}{a})}{\frac{bb}{a} [\frac{bb}{a} - 3(\epsilon + \epsilon')] + 9\epsilon\epsilon' (\frac{d-d'}{d})}$$

$$\& \mu = \frac{3m\epsilon - \frac{3s}{p d^3}}{\frac{bb}{a} - 3\epsilon'}$$

Si  $d = d'$ , hoc est, si unicum sit Fluidum cujus altitudo  $= \epsilon + \epsilon'$ ; erit  $m = \mu = \frac{3s}{p d^3} \times \frac{1}{3(\epsilon + \epsilon') - \frac{bb}{a}}$ , quod cum *art.* 47 convenit, quia hic est  $3(\epsilon + \epsilon')$  altitudo Fluidi.

#### SCOLIUM IX.

86. (\*) Hic omittere non debemus notandum utilissimum, in Hydrostaticâ maximi futurum emolumenti.

In *articulo* 76, cui tota hæc Theoria innititur, diximus Fluidum superius cum Fluido inferiori in æquilibrio consistere non posse, nisi pondus particulæ cujuscvis  $Nn$  idem sit, sive quatenus ad Fluidum inferius, sive quatenus ad Fluidum superius pertinet. Unde eruimus æquationem

$$(p[NA - Dn] - \omega \cdot AD) \times d = (p[NA - Dn] - \omega' \cdot AD) \times d'$$

Nonne præterea oportet, inquiet forsitan aliquis, ut pondus particulæ  $Nn$  versùs  $Nn$  nullum sit? hoc est, ut vis quæ oritur ex  $\omega'$  &  $p$  sit ad superficiem  $Nn$  perpendicularis, sicut vis quæ oritur ex  $\omega$  &  $p$ ? Quod quidem videtur experientiâ confirmari, siquidem Fluida diversæ densitatis ita se invicem disponunt, ut ad libellam superficies eorum componantur.

Respondeo 1°. ideò in experimentis omnibus superficies diversorum Fluidorum ad libellam componi, quod in his vires  $\omega$  &  $\omega'$  sint semper eadem, sæpè etiam  $= 0$ ; porrò cum sint  $d$  &  $d'$  diversæ, æquatio superior locum habere non potest pro casu  $\omega = \omega'$ , nisi sit utrumque membrum  $= 0$ .

2°. Inviçè probari potest necesse non esse, ut utrumque æquationis membrum sit semper  $= 0$ . Nam ponatur Fluidum  $VKkS$  esse homogencum, & nullum esse pondus canalis  $Nn$ : cum oporteat, ut nullum sit pondus canalis  $Rr$ , erunt necessariò columnæ  $RN, rn$  sibi mutuo æquiponderantes, proinde æquales inter se: & cum hoc dicendum sit de omnibus columnis, sequitur, quòd si supponatur Fluidum inferius utlibet motum, Fluidum superius nullum motum habere debeat, nisi quatenus super Fluidum inferius verticaliter subsidet & elevabitur. Quod cum admitti nequeat, patet, non solum non debere, sed etiam non posse fieri  $= 0$ , membrum utrumque æquationis propositæ, in solutione Problematis art. 76.

## PROPOS. XVI. PROBLEMA.

87. *Dentur duæ quantitates . . . . .*

$$ads + \epsilon du$$

&  $\rho adu + r\epsilon ds + du \Delta u, s + du \Gamma u, s$   
 in quibus  $\rho$  &  $r$  constantes datas designent;  $\Delta u, s$ , &  $\Gamma u, s$ ,  
 functiones quascumque datas ipsarum  $u, s$ ; supponatur præ-  
 terea, has duas quantitates differentiales datas, esse differen-  
 tiales completas & accuratas alicujus functionis ipsarum  $u$ ,  
 &  $s$ : quaeritur methodus præ determinandis quantitativibus  $a$   
 &  $\epsilon$ , adeoque ambarum quantitatum propositarum inte-  
 gratio.

Dividantur primùm per constantem  $\rho$  termini omnes  
 secundæ quantitatis differentialis; & eò reducitur Proble-  
 ma, ut fiant . . . . .

$$ads + \epsilon du$$

$$adu + \frac{r\epsilon ds}{\rho} + \frac{du \Delta u, s}{\rho} + \frac{du \Gamma u, s}{\rho}$$

quantitates differentiales completæ.

Sit  $\frac{\rho}{\epsilon} = n$ ; tùm diviso 2<sup>o</sup> differentiali per  $\sqrt{n}$ , scri-  
 bantur ut sequitur ambo differentialia . . . . .

$$\epsilon \sqrt{n} \cdot \frac{du}{\sqrt{n}} + ads$$

$$\frac{adu}{\sqrt{n}} + \epsilon \sqrt{n} \cdot ds + \frac{du \Delta u, s}{\epsilon \sqrt{n}} + \frac{du \Gamma u, s}{\epsilon \sqrt{n}};$$

Jam verò, siquidem completa esse debet unaquæque harum  
 quantitatum differentialium, earum tam summa quam

differentia, debet etiam esse differentiale completum.  
Ergò

1°. Si addantur sibi invicem, fiatque  $a + \mathcal{C}\sqrt{n} = m$ ,

&  $\frac{u}{\sqrt{n}} + s = t$ ; erit . . . . .

(A') . . . . .  $m dt + dt \Psi t, s + ds \Pi t, s$  differentiale completum; intelligo autem per  $\Psi t, s$ , &  $\Pi t, s$ , functiones ipsarum  $t$  &  $s$ , quæ nascuntur ex substitutâ  $(t - s)\sqrt{n}$  pro  $u$ , in  $\Delta u, s$ , &  $\Gamma u, s$ ; jam verò ex Theoremate Cl. Euleri (t. 7 Com. Peterfb. p. 177)

est  $\frac{dm}{dt} + \frac{d\Psi t, s}{ds} = \frac{d\Pi t, s}{ds}$  (intelligo generatim per  $\frac{dA}{ds}$

ut in art. 68. coefficientem ipsius  $ds$  in differentiatione quantitatis  $A$ ). Ergò assumendo  $s$  ut variabilem,  $t$  verò ut constantem, erit  $m = -\Psi t, s + \varphi t$  (\*) +  $fs \times$

$$\frac{d\Pi t, s}{ds}$$

2°. Si datarum quantitarum secunda ab alterâ subducatur, seu, quod eodem recidit, si secunda multiplicetur

per  $-1$  & fiat ambarum additio, ponaturque  $\frac{u}{\sqrt{n}} - s = y$

&  $\mathcal{C}\sqrt{n} - a = \mu$ ; erit . . . . .

(A'') . . . . .  $\mu dy + dy \Gamma y, s + ds \Xi y, s$

differentiale completum; unde  $\frac{d\mu}{ds} + \frac{d\Gamma y, s}{ds} = \frac{d\Xi y, s}{ds}$ , &

$\mu = -\Gamma y, s + \Sigma y + fs \times \frac{d\Xi y, s}{ds}$ . Ex his quantitarum

(\*)  $\varphi t$  designat functionem ipsius  $t$ .

$m$  &  $\mu$  valoribus eruetur valor quantitatum  $a$  &  $\zeta$ ; nam siquidem  $a + \zeta\sqrt{n} = m$ ; &  $\zeta\sqrt{n} - a = \mu$ , erit  $a = \frac{m - \mu}{2}$  &  $\zeta = \frac{m + \mu}{2\sqrt{n}}$ .

## S C O L I U M.

88. Nec verò integrationibus nocere potest, si sit  $\sqrt{n}$  quantitas imaginaria: nam ex quantitatibus  $a$  &  $\zeta$ , si reales esse debeant, eliminari semper poterunt imaginariarum quantitates (art. 79).

## PROPOS. XVII. PROBLEMA.

89. Sint quantitates . . . . .

$$a ds + \zeta du$$

&

$qadu + p\zeta du + \gamma\zeta ds + mads + du\Delta u$ ,  $s + ds\Gamma u$ ,  $s$  quæ debeant esse differentialia completa. Quærentur quantitates  $a$  &  $\zeta$ .

Solutio. Fiat  $ku + rs = gy$ ,  $fu + ds = ht$ , ( $k, r, f, \delta, g, h$ , sunt constantes indeterminatæ); eritque  $u = \frac{g\delta y - hvt}{k\delta - rf}$ ;  $s = \frac{gfy - hkt}{rf - \delta k}$ . Substituatur hi valores, facien-

do prius  $\mu = \frac{g\delta}{k\delta - rf}$ ;  $\nu = \frac{-hr}{k\delta - rf}$ ;  $\lambda = \frac{gf}{rf - \delta k}$ ;  $\phi =$

$\frac{-hk}{rf - \delta k}$ ; eritque . . . . .

$$1^a. \text{ diff.} = a\lambda dy + a\phi dt \\ + \zeta\mu dy + \zeta\nu dt$$

$$2^{\text{a}}. \text{ verò per } \left. \begin{array}{l} \text{coeffic. inde-} \\ \text{termin. } n \text{ multi-} \\ \text{plicata evadet} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \left. \begin{array}{l} \rho a \mu \\ + p \epsilon \mu \\ + \gamma \epsilon \lambda \\ + m a \lambda \end{array} \right\} n dy \\ \left. \begin{array}{l} + \rho a \nu \\ + p \epsilon \nu \\ + \gamma \epsilon \phi \\ + m a \phi \end{array} \right\} n dt \\ + n dy \Delta y, t + n dt \Psi y, t \end{array}$$

In solutione autem Problematis præcedentis, ideò per-  
ventum est ad determinationem quantitatum  $a$  &  $\epsilon$ , quia

factis  $\frac{n}{v_n} + s = t$ , &  $\frac{n}{v_n} - s = y$ , additisque simul post

transformationem ambabus quantitativibus differentialibus

datis, quarum secunda fuit multiplicata per  $\frac{1}{v_n}$  &  $-\frac{1}{v_n}$

successivè, transformatae prodierunt, in quibus unaquæ-

que differentialium  $dy$  &  $dt$  successivè à coefficientibus

indeterminatis  $a$  &  $\epsilon$  liberata fuit. Ergo facilè patebit in

præsentè casu obtineri posse valores ipsarum  $a$  &  $\epsilon$ , si

additis simul ambabus transformatis modò inventis, sit

$a\lambda + \epsilon\mu + \rho a \mu n + p \epsilon \mu n + \gamma \epsilon \lambda n + m a \lambda n = 0$ ,

& (assumpto alio valore indeterminatæ  $n$ )  $a\phi + \epsilon\nu +$

$\rho a \nu n + p \epsilon \nu n + \gamma \epsilon \phi n + m a \phi n = 0$ . Porro ut ha-

rum æquationum prima obtineat locum, (quicumque sint

ipsarum  $a$  &  $\epsilon$  valores) debet esse  $\lambda + \rho \mu n + m \lambda n = 0$ ,

&  $\mu + p \mu n + \gamma \lambda n = 0$ : unde  $\frac{\lambda}{\mu} = \frac{-\rho n}{1 + m n} = \frac{1 + p n}{-\gamma n}$ .

Quare inde eruetur valor ipsius  $n$  talis, ut sit  $a\lambda +$

$\epsilon\mu + \delta c. = 0$ . Pariter ut sit  $a\phi + \epsilon\nu + \rho a \nu n +$

$p \epsilon \nu n + \gamma \epsilon \phi n + m a \phi n = 0$ , debet esse  $\phi + \rho \nu n +$

$m\phi n = 0$  &  $v + p\gamma n + \gamma\phi n = 0$ : unde  $\frac{\phi}{\gamma} = \frac{-\epsilon n}{m n + 1} = \frac{1+p n}{-\gamma n}$ ; proinde habebitur eadem æquatio præ invenien-  
 dâ  $n$ , ac ante. Solvatur igitur æquatio  $\frac{-\epsilon n}{1+m n} = \frac{1+p n}{-\gamma n}$ ;  
 quæ duos suppeditabit ipsius  $n$  valores; multiplicetur quan-  
 titas differentialis secunda transformata, per unum ex duo-  
 bus ipsius  $n$  valoribus, deinde per alterum: postea addatur  
 successivè cum primâ quantitate differentiali, faciendo  
 $\frac{\lambda}{\mu} = \frac{-\epsilon n}{1+m n}$  &  $\frac{\phi}{\gamma} = \frac{-\epsilon n}{1+m n}$ , & prodibunt duo differen-  
 tialia nova quæ integratu facilia erunt.

Notandum, in determinandis valoribus ipsarum  $\frac{\lambda}{\mu}$  &  $\frac{\phi}{\gamma}$ ,  
 non debere assumi eundem ipsius  $n$  valorem, sed duos  
 valores diverfos; secus enim foret  $\frac{\lambda}{\mu} = \frac{\phi}{\gamma}$ ; proinde ef-  
 fet  $n$  in ratione constante ad  $s$ . Unde nimis limitaretur  
 Problematis solutio.

(\*) In eo solo casu difficultas nasci poterit, in quo æqua-  
 tio  $\frac{-\epsilon n}{1+m n} = \frac{1+p n}{-\gamma n}$ , quæ mutatur in . . . . .

$$\left. \begin{array}{l} \epsilon \gamma \\ -m p \end{array} \right\} n^2 - \left. \begin{array}{l} m n \\ p n \end{array} \right\} - 1 = 0$$

ad secundum gradum non ascendet, aut etiam solutu  
 impossibilis erit: horum primum eveniet, si  $\epsilon \gamma -$   
 $m p = 0$ , quo in casu, quantitas  $n$  unicum tantum habe-  
 bit valorem; secundum si sit  $\epsilon \gamma - m p = 0$ , &  $m = -p$ ,  
 quo

quo in casu esset  $1 = 0$ , quod est impossibile. At

1°. Si sit  $\epsilon\gamma - mp = 0$ , fiat  $p = \epsilon K$ , eritque  $\gamma = Km$ ; quare ambo differentialia data erunt . . .

$$ads + \epsilon du$$

&  $(\epsilon du + mds) \times (a + K\epsilon) + du\Delta u, s + ds\Gamma u, s.$

Porro si fiat  $\epsilon u + ms = t$ , &  $a + K\epsilon = \mu$ , secundum differentiale mutabitur in  $\mu dt + ds\Psi u, s + ds\Xi u, s$ ; unde per methodum Problematis faciliè eruetur valor ipsius  $\mu$ , hoc est, habebitur valor ipsius  $a + K\epsilon$  in  $u$  &  $s$ . Jam verò loco quantitatis  $ads + \epsilon du$ , habebitur

$$ads + \frac{\mu - a}{K} \times \left( \frac{dt - mds}{\epsilon} \right) \text{ seu}$$

$$a \left( \frac{+ ds}{+ mds} - \frac{dt}{K\epsilon} \right) + \frac{\mu dt}{K\epsilon} - \frac{m\mu ds}{K\epsilon}.$$

Porro si fiat  $s \left( 1 + \frac{m}{K\epsilon} \right) - \frac{t}{K\epsilon} = y$ , & transformetur differentiale præcedens, determinabitur  $a$  per quantitatem datam  $\mu$ , eodem modo, quo jam quantitas  $\mu$  definita fuit.

2°. Si sit  $p = -m$ , &  $\epsilon\gamma - mp = 0$ , nihil obstabit quominùs adhiberi possit methodus modò exposita pro casu in quo est solùm  $\epsilon\gamma - mp = 0$ : quare casus iste nullam habebit novam difficultatem (\*).

(\*) Ultimus est casus in quo æquatio in  $x$  duos habet valores æquales, quod eveniret, si foret  $-x = \frac{(m+p)^2}{4(\epsilon\gamma - mp)}$ ; hoc est, si  $-4\epsilon\gamma = (m-p)^2$ . Per temporis autem residui angustias non licuit integrationem hoc in casu determinare, qui quidem ad sequentia planè inutilis est.

Q

## De motu aëris intra montes.

## I.

90. Sit primùm sub Æquatore series montium parallelorum, qui, Athmosphærâ altiores, totum globum ità circumveniant, ut inter eos nonnisi satis arcta Zona jaceat, sitque aër Fluidum homogeneous Terræ contiguum: manifestum est aërem montes inter istos contentum, moveri quasi in plano circulari: quare iisdem retentis nominibus ac in *art.* 47 & 50, erit . . . . .

$q = \frac{1^S}{\lambda, \rho \times \lambda, d^1} \times (z^1 \pm mm)$ , quæ quantitas exprimit partium Fluidi velocitatem & directionem, unde hîc applicanda sunt quæ jam in *art.* 50, 51, &c. fuere animadvertenda.

## II.

Si moveatur Astrum in parallelo quovis *SG*, (Fig. 25) & intereà aër moveatur intra seriem montium parallelorum sub parallelo quovis sitorum, Terram undequaque circumvenientium, eâdem methodo ac in *n. I.* solvi potest Problema. Sint enim *KAk*, *KSk* duo Meridiani, *RE*, Æquator, constans *GE = B*; actio corporis *S* in *A* secundùm *AP* exprimetur per functionem ipsius *AP = u*, & constantium *AG (A)* & *EG (B)*. Unde (retentis iisdem nominibus ac in *articulo* 47.), si fiat

$$q = \frac{1^S}{d^1} \times [(\text{Sin. } SA)^1 \pm mm] \times M, \text{ \& } k = \frac{1^S}{d^1}$$

[(Sin. SA)<sup>2</sup> - (Sin. SP)<sup>2</sup>] × N (M & N sunt constantes indeterminatæ) habebitur . . . . .

$$\frac{dk}{s} = \frac{dq}{d(SA)} \times nd(SA); (*) \&$$

$$\frac{p dk}{d(SA)} \times n \times \frac{d(SA)}{d(SG)} = \frac{3S}{d^3} \left( \frac{e^{2SA\sqrt{-1}} - e^{-2SA\sqrt{-1}}}{4\sqrt{-1}} \right) \times$$

$$\frac{d(SA)}{d(SG)} \times n + \frac{2pb^2M}{2a} \times \frac{3S}{d^3} \times \frac{d(SA)}{d(SG)} \cdot \frac{e^{2SA\sqrt{-1}} - e^{-2SA\sqrt{-1}}}{4\sqrt{-1}};$$

unde  $\frac{N}{s} = nM$ , &  $2pnN = n + \frac{2pb^2M}{2a}$ ; quare  $M =$

$$\frac{n}{(2n^2s - \frac{b^2}{a}) \times p}.$$

III.

Si linea PA incidere in Meridianum KAG, tunc facienda foret SG = u, foretque . . . . .

$$\frac{dk}{du} du = \frac{dq}{dA} du, \&$$

$$\frac{p dk}{dA} du = \frac{3S}{d^3} \phi u \times A \times du + \frac{dq}{du} du \times \frac{pb^2}{2a};$$

unde si supponatur dk = a du + c dA, erit dq =

$$\frac{a dA}{s} + \frac{2ad u}{bb} \left( c - \frac{3S}{pd^3} du \phi u, A \right):$$

proinde inveniuntur a & c per methodum in art. 89 expositam.

(\*) Intelligo per n rationem radii circuli SG ad circulum AP.

## I V.

Nec multum noceret solutionibus præcedentibus, si altitudo montium foret altitudine Atmosphæræ minor: nam velocitas particularum aëris superiorum & liberarum eadem esse debet cum velocitate aëris intrà montes contenti, aut saltem hanc velocitatem superare velocitate constante, & darâ, quia nempe partes inferiores aëris liberi, cum sint homogeneæ partibus superioribus aëris non liberi, eâdem vi sollicitari debent, ut in æquilibrio permaneant. Proinde eandem habere debent vim acceleratricem. Ergò eadem ferè debet esse solutio, siue montes sint Atmosphærâ altiores, siue non: id solum evenire poterit, ut velocitas aëris superioris & liberi excedat velocitatem aëris inferioris & non liberi, quantitate constante.

## V.

Jam si series montium parallelorum, quam sub Æquatore jacere supposuimus, duobus in locis includeretur à duobus montibus à se invicem distantibus, ita ut usque ad Atmosphæræ superficiem protenderetur series montium, quorum basis (Fig. 26) foret  $RSTQ$  ( $RS$  ac  $TQ$  arcus circulares sunt); tunc velocitas puncti  $A$ , non posset esse nisi functio ipsarum  $AT$  &  $PA$ . Sit ergò  $PA = u$ ,  $AT = s$ ; foret . . . . .

$$\frac{dk}{du} = \frac{dq}{ds} + \frac{dq}{du}, \&$$

$$p \left( \frac{dk}{ds} + \frac{dk}{du} \right) = \frac{3s}{d^1} \times \frac{(e^{2uv-1} - e^{-2uv-1})}{4v-1} + \frac{pb^b}{2a} \times \frac{dq}{du}$$

Unde si fiat

$$dk = \mathcal{C} du + a ds$$

$$\text{erit . . . } dq = (\mathcal{C} + a) du \cdot \frac{2a}{bb} - \frac{2a du}{bb} \times \frac{3s}{p d^1} \times$$

$$\left( \frac{e^{2uv-1} - e^{-2uv-1}}{4v-1} \right) + \frac{\mathcal{C} ds}{s} - [\mathcal{C} + a - \frac{3s}{p d^1} \phi u] \frac{2a ds}{bb} :$$

Quare determinabuntur  $a$  &  $\mathcal{C}$  per methodum in *art.* 89 expositam. Valor autem ipsius  $q$  talis esse debet ut sit = 0 cùm  $s = 0$ , & cùm  $s = TQ$ , quicumque sit valor ipsius  $u$ ; si huic conditioni satisfieri non possit assumendo expressionem ipsius  $q$  generalissimam, indicium est non posse exprimi  $q$  per functionem ipsarum  $u$  &  $s$ , proinde Problema, saltem hoc in sensu sumptum, esse impossibile.

## V I.

Multò difficiliora evadunt Problemata præcedentia, saltem quoad æquationum integrationem, si montes paralleli inter se non sint.

Inquiramus primùm quænam esse deberet velocitas venti, in canali inæqualis latitudinis, posito quòd ejus velocitas uniformis foret, si paralleli essent montes.

Eò igitur redit Problema, ut determinetur velocitas annis intrà alveum latitudine inæqualem fluentis. Quod ut inveniatur, sit  $CA = x$  (Fig. 27);  $AB = y = \phi x$ ; altitudo Fluidi in  $A = z$ ;  $q dt$  spatium ab  $A$  tempore

Q iij.

$dt$  percursum, erit  $\frac{dz}{z dx} \cdot q dt + \frac{dq}{dx} dt + \frac{d\varphi x}{dx} \times \frac{q dt}{dx} = 0,$

$$\& -pdz = \frac{p\theta\theta}{2ad^2} \times \frac{dq dt}{dx} \times dx \times q dt.$$

Supponatur canalis latitudo parùm inæqualis, erit  $z = \epsilon + \alpha$ ;  $\varphi x = \epsilon' + X$ ;  $q = \zeta + \delta$ , existentibus  $\epsilon, \epsilon', \zeta$  constantibus, &  $\alpha, X, \delta$ , quantitatibus harumce respectu maximè parvis. Unde . . . . .

$$\frac{-dz}{z dx} \times \zeta dt = \frac{dX}{\epsilon dx} \times \zeta dt + \frac{d\delta}{dx} dt; \& -pd\alpha = \frac{p\theta\theta}{2ad^2} \times \frac{d\delta}{dx} \cdot dx \cdot \zeta dt^2. \text{ Quare erit } \frac{\epsilon dX}{\epsilon'} + \frac{\epsilon d\delta}{\zeta} = \frac{\epsilon\theta\theta d\delta}{2a}; \& d\delta = \frac{\epsilon dX}{\epsilon' \left( \frac{\theta\theta}{2a} - \frac{1}{\zeta} \right)}.$$

Igitur crescente  $X$ , crescere potest  $\delta$ , si  $\theta^2 \zeta^2 > 2a\epsilon$ . Sit  $g$  velocitas Fluidi ferè uniformis, &  $M$  spatium quod percurrit tempore  $\theta$ , erit  $\frac{M d\epsilon}{\epsilon} = \zeta dt$ ; ergò  $\theta^2 \zeta^2 > 2a\epsilon$  fiet  $M^2 > 2a\epsilon$ .

Pariter erit  $d\alpha = -\frac{\theta^2 \zeta}{2a} \times \frac{\epsilon dX}{\epsilon' \left( \frac{\theta\theta}{2a} - \frac{1}{\zeta} \right)}$ . Unde patet

1<sup>o</sup>. quòd crescente velocitate decreseat altitudo Fluidi:  
2<sup>o</sup>. quòd coarctato alveo necesse semper non sit ut Fluidum extollatur; imò subsidere debere si  $M^2 < 2a\epsilon$ .

Jam verò si investigetur velocitas venti in canale inæquali, ex actione Solis & Lunæ oriunda, factâ distantia Astrî à loco quovis  $u$  & viâ venti per tempus  $dt = q du$ ,

manifestum est quantitates  $q$  &  $z$ , non posse esse nisi functiones ipsarum  $u$  &  $x$ , è duabus æquationibus eliciendas, quæ ex principiis suprâ positis facilè erui possunt. Satis autem propè ad veram venti velocitatem perveniri posse arbitror, si quæratur primùm in loco dato velocitas venti ab Astrorum actione oriunda, tùm velocitate hâc ut constante assumptâ, quæratur ea auctio vel diminutio quam pati debet in eâ parte canalis coarctati, quæ loco dato respondet.

## VII.

Iisdem positis ac in *art. huj. n. I*, supponatur partes omnes in datâ aëris columnâ, horizontaliter tendere ad motum velocitate datâ; supponatur præterea quàmlibet esse aëris figuram, modò à circulari parùm differat; denique corpus  $S$  (Fig. 5) à dato puncto  $D$  proficisci: quæratur, post elapsum  $t$ , ex eo momento quo profectum est corpus  $S$ , quænam esse debeat, in loco quovis, aëris velocitas & altitudo.

Sit  $MP = s$ , complementum distantiae loci  $M$  ab Astro, eo momento quò proficiscitur,  $q$  spatium à puncto  $M$  oscillando descriptum tempore  $t$ ,  $a$  altitudo quâ decrescit aut crescit tempore  $t$ , columna aëris quæ puncto  $M$  imminet, manifestum est non posse esse quantitates  $a$  &  $q$  nisi functiones ipsarum  $t$  &  $s$ .

$$\text{Sit ergò } dq = kds + rds \\ da = vdt + gds$$

&c, sumptâ s pro altitudine columnæ  $NM$  in 1<sup>o</sup>. instanti, liquet ex præcedentibus fore  $\frac{v dt}{s} = \frac{dk}{ds} \times dt$  seu  $v = \frac{s dk}{ds}$  vel  $\frac{s dr}{ds}$ , proinde  $\frac{da}{ds} = \frac{s dr}{ds}$ ; unde  $a = sr + S'$ , existente  $S'$  functione indeterminatâ ipsius  $s$ .

Jam verò, describente Astro arcum  $\frac{bt}{\theta}$  in sensu  $GN$  tempore  $t$ , erit  $s - \frac{bt}{\theta}$  complementum distantie loci  $M$  ab Astro; &c actio Astri in locum  $M$  erit æqualis quan-

titati  $\frac{3S}{ds} \times \left( \frac{(1s - \frac{2b}{\theta})\sqrt{-1} - (1s - \frac{2b}{\theta})\sqrt{-1}}{4\sqrt{-1}} \right)$ , quæ, si

ab eâ detrahatur vis acceleratrix  $\frac{Pdt}{2a} \times \frac{dk}{ds}$ , talis esse debet, ut nullum in Fluido motum producat, seu ut sit proportionalis sinui complementi anguli quem facit columnâ  $NM$  cum superficie aëris externâ. Porò si sit  $\Sigma$  Sinus complementi in 1<sup>o</sup>. instanti, erit  $\Sigma - \frac{da}{ds}$  Sinus

complementi post tempus  $t$ ; unde  $\Sigma - \frac{da}{ds} = \frac{3S}{4Pds\sqrt{-1}} \times$

$$\left[ \frac{2\sqrt{-1}(1 - \frac{bt}{\theta})}{1 - c} - \frac{2\sqrt{-1}(1 - \frac{bt}{\theta})}{-c} \right] - \frac{11}{2a} \times \frac{dk}{ds}.$$

Quare, si fiat  $dk = v dt + C ds$ ;

erit  $dr = C dt + \frac{111}{2a1} ds - \frac{ds'}{s} + \frac{\Sigma ds}{s} - \frac{ds}{s} \times \frac{3S}{4Pds\sqrt{-1}} \times$

(c

$(c^{2(s-\frac{b}{t})V-1} - c^{-2(s-\frac{b}{t})V-1})$ . Oportet ergò ut hæc ambo differentialia completa sint. Quod quidem per methodum art. 87 effici potest. Ut autem paulò facilius reddatur solutio, fiat  $\theta^t = 2as$ , quod licet, eritque

$$\frac{\theta\theta}{2at} = 1; \text{ jam sit } r + \theta = m, r - \theta = \mu, r + s = u, r - s = y, 1 + \frac{b}{t} = k, 1 - \frac{b}{t} = h; \text{ erit . . .}$$

$$k = \varphi u + \Delta y + \frac{1S}{p d^1} \times [c^{2(s-\frac{b}{t})V-1} + c^{-2(s-\frac{b}{t})V-1}] \times$$

$$(\frac{1}{2.8k} - \frac{1}{2.8h}); \& \dots \dots \dots$$

$$\alpha = \varphi u - \Delta y + \frac{3S}{p d^1} \times [c^{2(s-\frac{b}{t})V-1} + c^{-2(s-\frac{b}{t})V-1}] \times$$

$$(\frac{1}{2.8k} + \frac{1}{2.8h}) + \int \Sigma d s$$

Sit autem  $k = G$ , quando  $t = 0$ , hoc est, sit  $G$  expressio velocitatis quâ Fluidum moveri conatur in 1<sup>o</sup> instanti; oportet ergò, ut factâ  $t = 0$ , sit  $G = \varphi s + \Delta - s$

$$+ \frac{3S}{p d^1} \times (c^{2sV-1} + c^{-2sV-1}) \times (\frac{1}{2.8k} - \frac{1}{2.8h}).$$

Præterea debet esse  $\alpha = 0$ , quando  $t = 0$ : ergò debet esse

$$\varphi s - \Delta - s + \frac{3S}{p d^1} \times (\frac{1}{2.8k} + \frac{1}{2.8h}) \times (c^{2sV-1} + c^{-2sV-1})$$

$$+ \int \frac{\Sigma d s}{1} = 0.$$

R

Additis simul hisce æquationibus, erit  $G = 2\phi s + \frac{3S}{p d^3 s} \times \frac{1}{8k} (e^{2sV-1} + e^{-2sV-1}) + \int \frac{\Sigma ds}{s}$ ; unde  $\phi s =$

$$\frac{G}{2} - \frac{3S}{p d^3 s} \times \frac{1}{16k} \times (e^{2sV-1} + e^{-2sV-1}) - \int \frac{\Sigma ds}{2s}$$

Quare cum dari debeat  $G$  in  $s$ , si in 2<sup>o</sup> membro hujus æquationis scribatur  $t + s$  ubique pro  $s$ , habebitur  $\phi(t + s)$ . Pariter subtrahendo ab invicem ambas æquationes datas, invenietur  $G = 2\Delta - s - \frac{3S}{p d^3 s} \times \frac{1}{8b} \times$

$$(e^{2sV-1} + e^{-2sV-1}) - \int \frac{\Sigma ds}{s}, \text{ unde habebitur } \Delta - s$$

$$= \frac{G}{2} + \frac{3S}{p d^3 s} \times \frac{1}{16b} \times (e^{2sV-1} + e^{-2sV-1}) - \int \frac{\Sigma ds}{2s}$$

Secundum hujus æquationis membrum est functio ipsius  $s$ . Porro functio quælibet ipsius  $s$  potest semper mutari in functionem ipsius  $-s$ ; nam functio ipsius  $s$  non potest componi nisi ex terminis qui contineant potestates ipsius  $s$ ; est autem  $a \times s^n = -s^n \times a$  quando  $n$  est numerus par, &  $= -a \times -s^n$  quando  $n$  est impar. Quare tractetur secundum æquationis membrum ut functio ipsius  $-s$ , deinde pro  $s$  substituatur  $t - s$ , & habebitur valor ipsius  $\Delta(t - s)$ .

### VIII.

Si motui aëris obstant montes perpendiculariter ad horizontem erecti, quorum distantia à puncto  $P$  sint  $a$ ,  $a'$ ,  $a''$ , &c. manifestum est valorem ipsius  $k$  debere esse

talem, ut nullus sit, factâ  $t = a$ , aut  $= a'$  aut  $= a''$ ; & c,  $t$  existente cujuslibet valoris. Hoc autem fieri non potest nisi in quibusdam valoribus ipsius  $G$ ; secus impossibile erit Problema. Unde non mirum si plures occurrere queant casus in quibus impossibile sit definire motum aëris intrâ verticales montes oscillantis.

IX.

Ex definito ipsius  $k$  valore qui exprimit velocitatem venti pro instanti quovis  $dt$ , manifestum est velocitatem illam non solum fore functionem ipsius  $s - \frac{bt}{g}$ , distantiae nempe loci ab Astro, sed præterea, ipsius  $t + s$  ac  $t - s$ , seu quod idem est, ipsius  $s$  ac  $s - \frac{bt}{g}$ , siquidem  $t + s = -\frac{g}{b} \times (s - \frac{bt}{g}) + s(1 + \frac{g}{b})$ , &  $t - s = -\frac{g}{b} \times (s - \frac{bt}{g}) + s(\frac{g}{b} - 1)$ . Quare velocitas venti erit functio distantiae loci ab Astro pro tempore dato, & complementi distantiae loci ab eodem Astro, tempore quo Astrum moveri incepit.

Unde patet velocitatem venti in hâc hypothesi nunquam ferè pendere à solâ distantia Zenith loci ab Astro, ut in toto hujus Dissertationis cursu supposuimus. Norandum tamen est talem suppositionem jure ac merito à nobis esse factam. 1°. Quod nulla sit ratio cur ab uno puncto potius quàm ab altero, Astrum proficisci concipiatur.

R ij

2°. Quòd aliquis sit casus (nempe quòd est  $\phi s$  &  $\Delta - s = 0$ ) in quo velocitas  $k$  datur per solam functionem ipsius distantiae actualis loci ab Astro. Id autem evenire debet quòd est . . . . .

$$\int \Sigma ds = - \frac{3S}{p d^3} \times \left( \frac{r}{z.8k} + \frac{r}{z.8b} \right) \times$$

$$(e^{2s\sqrt{-1}} + e^{-2s\sqrt{-1}}); \& G = \frac{3S}{p d^3} \times \left( \frac{r}{z.8k} - \frac{r}{z.8b} \right) \times$$

$$(e^{2s\sqrt{-1}} + e^{-2s\sqrt{-1}}).$$

### PROBLEMA GENERALE.

91. *Determinare prò quovis tempore & loco venti directionem ac velocitatem, in hypothefi quòd Terra profundo Oceano undique cooperiatur.*

Supponatur 1°. Astrum unicum in aërem agere; solvi potest Problema, ponendo partes aëris sibi mutuò in motibus suis, aut nihil, aut parùm nocere, quo in casa habebitur ex *art. 39 & 45* venti velocitas & directio.

Vel si ponatur partes aëris sibi mutuò nocere, & directionem venti semper esse in plano verticali Astri quàm proximè, habebitur solutio generalis ex *art. 77*; vel, assumpto aëre homogeneo, determinabuntur prò quovis loco ejus velocitas & directio, *art. 75*.

Vel tandem possunt considerari separatim duo venti motus, alter in parallelo, alter in Meridiano, qui si ex *art. 90. n. III.* separatim determinentur, & deindè inter

se componantur, satis accuratè haberi poterit venti velocitas ac directio pro instanti quovis.

2°. Inventâ jam velocitate venti, ex actione unius Astri, determinetur eodem modo velocitas ipsius ab actione alterius Astri oriunda, compositisque inter se invicem his velocitatibus, exurget motus venti quæsius.

S C O L I U M I.

92. Inutile ferè est admonere quantitates  $b$  ac  $d$ , quæ proportionales sunt velocitati & distantia luminarium, non esse absolutè invariabiles, licet in toto hujus operis cursu fuerint pro constantibus adhibitæ. Multùm autem à verò non aberrabitur, si prò quantitatibus illis  $d$  &  $b$ , aut assumanrur earum valores medii, aut prò quovis tempore adhibeantur valores earum actuales, qui quidem ex tabulis satis accuratè habebuntur.

S C O L I U M II.

93. Nullam hæctenus mentionem fecimus motûs æris, ex calore orti, qui ob incognitam caloris causam & actionem ad calculum revocari omninò non potest. Tamen ut hanc causam non omninò prætermittamus, advertemus duo loca quævis versùs Ortum & Occasum hinc inde à Sole æqualiter distantia, æqualem quoque experiri calorem, nisi fortassè paululùm majorem in eo loco, qui versùs Ortum jacet, cum à diurniori tempore So-

R iij.

lem videat; quare vi  $\frac{1}{p} \frac{ds}{dt} \times \frac{(e^{2\mu V - t} - e^{-2\mu V - t})}{4V - 1}$  addenda est vis quæcumque quæ sit functio ipsius  $\mu$ , & calorem in duobus locis suprâ dictis serè æqualem exprimat: v. g. potest fieri hæc vis proportionalis ipsi  $\frac{(e^{2\mu V - t} - e^{-2\mu V - t})^2}{-4}$  quadrato nempè Sinûs arcûs  $\mu$ ; quod quidem satis aptè congruit cum Physices principiis quibus constat calorem solarem supponi posse, in ratione quadrati Sinûs distantie Solis à Zenith. Prò excessu verò caloris Hemisphærii Orientalis suprâ Occidentale, supponi potest ærem ab Ortu in Occasum moveri velocitate constante, sed omninò indeterminabili: quibus hypothesibus difficiliore non reddentur calculi Problematum præcedentium, ut ex articulo 58 facillè constabit. Frustrâ, meo quidem iudicio, desudaret, qui accuratiorem de hâc quæstione calculum inire vellet.



---



---

# ADDITAMENTUM

*Aliquot post Dissertationem diebus missum.*

## I.

**I**N articulo 39 invenimus  $q = \frac{3S \cdot 2a}{2d^3 p b^2} \times (z^2 \pm mm)$  pro expressione velocitatis venti, sub Æquatore, dum Sol aut Astrum aliud Æquatorem percurrit; methodumque simul dedimus quâ possit exhiberi velocitas venti in quovis alio loco, dum Sol parallelum quemvis describit. Hanc velocitatem inutile non erit hic paulò extensius determinare.

Sit  $AP$  (Fig. 15) parallelus à Sole descriptus, & quæatur velocitas puncti  $a$  in parallelo  $QR$ ; fiat  $AP = u$ ; sitque  $\frac{n}{r}$  ratio quam habet radius paralleli  $AP$  ad radium paralleli  $QR$ : dico fore juxtà nomina in art. 39 imposta  $\lambda = \frac{3S \cdot 2an}{2d^3 \cdot p b^2} \times [(\text{Sin. } \alpha P)^2 \pm mm]$ . Nam debet esse  $d\lambda du = \frac{3S \cdot (e^{2\alpha P \cdot \sqrt{-1}} - e^{-2\alpha P \cdot \sqrt{-1}})}{4d^3 \sqrt{-1}} \times \text{Cof. } R\alpha P \times$

$\frac{2an}{p b^2}$ . Porrò quæcumque sit æquatio inter  $\alpha P$ ,  $AP$ ,  $Aa$ , inveniatur Cofinus anguli  $R\alpha P$ , assumendo in hâc æquatione  $AP$  &  $\alpha P$  ut variables, tùm inde eruendo valorem ipsius  $\frac{d(\alpha P)}{d(AP)}$ , & hunc valorem multiplicando per  $n$ .

scu dividendo per  $\frac{1}{n}$ ; unde  $\text{Cofinus } R\alpha P = \frac{rN}{rP} \times n =$   
 $\frac{d(\alpha P)}{dn} \times n$ . Ergò  $d\lambda = \frac{3S \cdot 2a}{pb^2 d^2} \times n \left( \frac{c^{2\alpha P \cdot \sqrt{-1}} - c^{-2\alpha P \cdot \sqrt{-1}}}{4\sqrt{-1}} \right) \times$   
 $d(\alpha P)$ ; &  $\lambda = \frac{3Sn \cdot a}{a^2 p b^2} \times [(\text{Sin. } \alpha P)^2 \pm mm]$ .

## I I.

Quod autem attinet ad velocitatem venti in sensu  
 Meridiani  $\alpha A$ , supponatur facilitatis causâ, circulum  
 $\alpha P$  esse Æquatorem; & factâ  $\alpha P = X$ , &  $\alpha A = x$ , vis  
 acceleratrix secundum  $\alpha A$  erit  $\frac{3S}{dt} \times \frac{c^{2X\sqrt{-1}} - c^{-2X\sqrt{-1}}}{4\sqrt{-1}} \times$   
 $\frac{dX}{dx} = \frac{3S}{d^2} \times \frac{c^{x\sqrt{-1}} - c^{-x\sqrt{-1}}}{\sqrt{-1}(c^{x\sqrt{-1}} + c^{-x\sqrt{-1}})} \times \frac{(c^{X\sqrt{-1}} + c^{-X\sqrt{-1}})^2}{4}$ .

Unde patet vim illam acceleratricem in uno eodemque  
 Hemisphærio semper versùs easdem partes dirigi; proinde  
 cum ex hypothèsi effectum suum totum producat, massa  
 tota aëris, agente illâ vi, paulatim ad Æquatorem  
 accedere deberet, & in plano Æquatoris accumulata  
 subsistere.

Primo autem aspectu constat, illud legitimè supponi  
 non posse, sed materiam Fluidi, quatenùs in sensu Meri-  
 diani movetur, debere necessariò oscillando moveri, &  
 nunc affluere, nunc defluere; quare non debet supponi  
 eam vim, quæ secundum Meridianum agit, totum suum  
 effectum producere: cœterùm facilè patet hanc vim esse  
 nullam quandò  $x = 0$  & quandò  $X = 90^\circ$ , proinde tam  
 propè

propè *Æquator*em quàm versùs *Polos* esse quàm minimam. Unde modò adsit aliqua in partibus *Fluidi* tenacitas & frictio, & aliqua in *terrestri* superficie asperitas, nullus ex illâ vi effectus orietur, tam propè *Æquator*em quàm versùs *Polos*: maximum suum in *Zonis* temperatis edet effectum, qui quidem, quantum sentio, permagnus esse non debet, quia aër, ex hypothesi, propè *Æquator*em & versùs *Polos* sensibilibiter non movetur, sive ab *Austro* ad *Boream*, sive à *Boreâ* ad *Austrum*. Proinde aër intermedius isti contiguus & adhærens parùm sortassis movebitur.

Igitur si juxtà *art.* 39 methodum investigetur venti velocitas, is solùm motus videtur posse considerari, & ad calculum revocari, qui fit in sensu paralleli *QaR*.

### III.

Præter methodum quam in *art.* 42 dedimus pro inveniendâ æquatione inter arcus trianguli Sphærici, cujus non omnia latera sunt arcus circuli maximi, potest etiam adhiberi methodus sequens, quæ quidem adhuc facillior videtur. Ducatur corda arcus *aP*, & ex punctis *a*, *P*, agentur perpendiculares ad plana *AP*, *aA*, & ad radium circuli *AP* per *A* transeuntem. Fiet triangulum rectangulum cujus latera, per arcus *aP*, *aA*, *AP*, facillè exprimentur: proinde æquatio inter latera hujus trianguli, quæ oritur ex æqualitate hypotenusæ cum summâ quadratorum laterum, dabit æquationem inter *aP*, *aA*, & *AP*.

S

## I V.

In *articulo* 84 docuimus quomodò, habitâ ratione Attractionis partium, possit, circumcircâ, obtineri Fluidi motus. Ad hanc inquisitionem videtur etiam posse adhiberi methodus sequens.

In *articulo* 28 invenimus, stantibus Luminaribus, vim  $\phi$  seu  $\frac{3S \pm \sqrt{rrr - r \pm}}{rrr}$  esse augendam in ratione 1 ad

$1 - \frac{3\delta}{5\Delta}$  ubi agitur de Attractione partium : quare, posito quòd Luminaria moveantur, fortasse non multùm à vero aberrabitur, si queratur primùm motus Fluidi, abstrahendo ab Attractione partium, tùm in expressione hujus motus ponatur  $\frac{3S}{1 - \frac{3\delta}{5\Delta}}$  loco 3 S. Nihil accuratius videtur exigi posse in tam arduo, tamque abstruso Problemate.

FINIS.

2  
11. 2. 1. ?

005659 519





MC

